

Division of Mollusks
National Library

gQL
D426
J3D919i
Moll.
Dunker, Wilhelm Bernhard Rudolph Hadrian, 1802-1885,
164

INDEX

MOLLUSCORUM MARIS JAPONICI

CONSCRIPTUS ET TABULIS ICONUM XVI ILLUSTRATUS

Division of Mollusks
Sectional Library

A

GUILIELMO DUNKER

PHIL. DRE, MINERALOGIAE ET GEOLOGIAE IN UNIVERSITATE LITERARUM MARBURGENSI
PROFESSORE PUBLICO ORDINARIO ETC.

~~~~~

CASELLIS CATTORUM.

SUMPTIBUS THEODORI FISCHER.

1882.

Non fingendum aut excogitandum, sed inveniendum  
quid natura faciat aut ferat.

FR. BACO DE VERULAM  
de dignitate et augmentis scientiarum.



NOTICE

ER CAREFUL EXAMINATION OF THE  
ER MARGIN AND TYPE OF MATERIAL  
HAVE SEWN THIS VOLUME BY HAND  
T CAN BE MORE EASILY OPENED  
READ.

V I R O A M I C I S S I M O

GUILLIELMO BURCHARD

PROFESSORI, GYMNASII QUOD FLORET BUECKEBURGI DIRECTORI QUONDAM  
MERITISSIMO,

RERUM NATURALIUM CUM AMANTISSIMO TUM IMPRIMIS COLEOPTERORUM  
STUDIOSISSIMO ET PERITISSIMO

HUNC LIBRUM GRATO ANIMO

D E D I C A T

AUCTOR.

Jam ex multis abhinc annis, per quos artissimis amicitiae vinculis conjuncti sumus, studiorum meorum historiae naturali deditorum, praesertim ad Petrificata et Conchyilia spectantium, semper benevolentissimus fuisti adjutor. Et denuo haud exiguum Molluscorum Japonicorum copiam, quae hoc libro tractata est, benignitati Tuae debeo. Ob tantam tam diu amicitiam mihi comprobata gratias maximas Tibi publice testari volui. Utinam hunc librum, quem grato animo ad Te mitto, benigne ac clementer recipias.

Vale et fave!

Guil. Dunker.

## Lector benevole!

Libellus meus de Molluscis Japonicis anno 1861 editus primam Molluscorum Japoniae enumerationem complectitur exiguam quidem, sed multas species faunae Japonicae proprias exhibentem.

Intervallo octo annorum praeterlapso opus egregium amici Lischke in lucem prodiit, cui titulum „*Japanische Meeres-Conchylien*“ inscripsit. Multa Mollusca in eo tractata sunt plurimam partem iconibus optimis illustrata.

Magnam novorum generum ac specierum seriem Molluscorum Japonicorum in *Annals and Magazine of Natural History*, in *Journal of the Linnean Society* et in *Proceedings of the Zoological Society* descriptam invenies, quam A. Adams studio indefesso in aquis Japonicis detexit; sane quidem dolendum est diagnoses huius scrutatoris sagacis nimis breves esse et mensuris prorsus carere; qua de causa multae species viris doctis dubiae manebunt, donec iconibus accuratis eas cognoscere contigerit.

Praeterea clar. A. Gould in *Proceedings of the Boston Society of Natural History* haud exiguam Molluscorum Japonicorum copiam descripsit.

Pariter clar. E. A. Smith in *Proceedings of the Zoological Society of London* species novas quinquaginta sex adjunctis iconibus idoneis nuperrime promulgavit ad collectionem pertinentes, quam clar. J. G. Jeffreys Museo Britannico largitus est.

Clar. T. Davidson, Brachiopodum peritissimus, omnes huius classis species Japonicas hucusque detectas in iisdem commentariis zoologicis tractavit.

Inter viros doctos, qui de fauna Molluscorum maris Japonici septentrionalis uberius scripserunt, praesertim ratione habita distributionis geographicae multarum specierum, imprimis clarissimi de Middendorff et de Schrenck laudandi sunt. Nomina eorum, qui singula Mollusca Japonica variis temporibus descripserunt, hic non commemorabo.

Equidem, lector benevole, hoc libro indicem criticum et, quantum fieri poterat, absolutum omnium, quae hucusque ex Japonia innotuerunt Molluscorum Tibi offero sperans fore ut Tibi satisfecerim eo magis cum multae species novae iconibus illustratae uberius in eo tractatae sint. Ex his disquisitionibus patet faunam Molluscorum Japonicam marinam magnam et multiplicem esse sine dubio quod mare Japonicum a regionibus septentrionalibus usque ad insulas Philippinas longissime extensum est, ita ut ratione habita Molluscorum distingui possint fauna pacifica septentrionalis, fauna Japonica propria et fauna Indica vel potius Malaiana, quae quidem faunae, ut ex ipsa rei natura sequitur, per transitus sensim conjunctae sunt.

In conscribendo hoc indice meo privata potissimum Molluscorum collectio haud exigua per longum temporis spatium quinquaginta paene annorum studiose aucta, maximam partem subtilitate critica determinata, nec non bibliotheca copiosa mihi praesto erant. In locis allatis plerumque opera ipsa auctorum comparare licuit veteres quoque respicienti, ceterum vero opus Lischkeanum laudavi, cum in eo tam scriptores quam loci natales accurate indicati esse soleant.

Ad ordinem specierum systematicum quod attinet, methodum fratrum H. et A. Adams in „*genera of recent Mollusca*“ oblata secutus sum, quamvis multa genera in hac dispositione nimis sejuncta esse mihi videantur. Multas quoque species Adamsianas enumeravi, quas examinare haud licuit; multae adhuc dubiae tempore, ut spero, futuro patebunt.

Sed restat ut viris clarissimis gratias agam maximas ob subsidia in elaborando hoc libro ab iis mihi oblata:

Guilielmo Burchard, qui Conchylia potissimum exoptata liberalitate solita dono mihi dedit: Joanni Rein, collegae conjunctissimo, qui omnia Mollusca marina, quae ex itinere bienni in Japoniam facto reportavit, in usum meum tradidit; clar. Ernesto Satow, phil. Dri, in urbe Tokio legationi Anglicae adscripto, qui conchylia pretiosa ad me misit adjunctis nominibus apud Japonos usitatis; Theodoro Loebbecke Dusseldorpio, qui plura Molluscorum specimina mihi commisit ut compararentur nec non opera quaedam rariora; Guilielmo Kobelt med. Dri., qui collectionem Molluscorum Japonicorum parvam mihi commendavit species praesertim Adamsianas continentem: denique Davidi Brauns Professori, qui Mollusca nonnulla misit prope Tokio lecta. Omnibus his amicis gratias repetitas hic refero.



Praeterea non minus laudandus est clar. Theodorus Fischer ob curam et diligentiam in edendis operibus iconographicis, quae hoc libro optime confirmantur.

Vale, lector benevole! Spero fore ut hic index Molluscorum Tibi gratus sit et placeat.  
Vale mihiq̃ue fave.

Dabam **Marburgi Cattorum** mense Septembri anni 1881.

Guilielmus Dunker.

---



## Cephalopoda.

### Genus *Argonauta* Lin. (Nautilus Arist. et Plin.)

#### *Argonauta Argo* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 708 (ex parte). Nautilus tenuis Rumphii Mus. Tab. 18, fig. A. Martini  
Conch. Cab. vol. 1. Tab. 17. fig. 157. Ceterum conferantur opera a Lamarckio citata in anim. sans  
vert. vol. 11, pag. 355.

Inter mollusca nostra Japonica duo specimina exstant statura mediocri. Exemplar majus  
ad Tokio captum nuperrime clar. Satow Dr. misit.

Haec species bene cognita late dispersa invenitur. Ut mea fert opinio disquisitione omnium  
testarum, quae huc referuntur exacta certe elucebit, plures species separandas esse, praesertim cum  
apertura diversimodo formata sit et linea sic dicta spiralis in speciminibus quibusdam differre  
videatur, ne dicam de sculptura. Ut omnes conchyliologi sciunt, foemina tantum Argonautae testa  
instructa est, inde facile intelligitur, differentias testarum minime a sexu diverso derivari posse.  
Mas Argonautae est Hectocotylus Cuvieri, ut inter omnes constat.

#### *Argonauta gondola* Dillwyn.

Descr. Cat. of Shells vol. 1, pag. 335.

Specimen minus exstat.

Animal huius speciei natans testam velamentis suis amplectens, in Zool. of the Voy.  
Samarang Moll. Tab. 1. fig. 2. optime delineatum est.

Unum specimen exstat prope Tokio captum.

#### *Argonauta Owenii* Adams et Reeve.

Voy. Samar. Moll. pag. 4. Tab. 3. fig. 1. a—d.

Specimen haud adultum adest, quod huc pertinere videtur.

### Genus *Sepiola* Rondelet.

#### *Sepiola Japonica* Orbigny et Férussac.

H. et A. Adams rec. Moll. vol. 1. pag. 40.

### Genus *Sepia* Aristoteles.

Scutum minus Sepiae cuiusdam Hamburgi quondam adeptus sum, quod e mari Japonico  
proventum esse mercator affirmavit. Statura multo minore, forma angustiore, lateribus subsinuatis,  
Dunker, Moll. Jap. mar.

sculptura, granulis scilicet minimis quasi arenaceis, nec non mucrone pro exiguitate testae magno resupinato a Sepia officinali pervulgata differt.

### **Genus Nautilus Breyn.**

#### **Nautilus Pompilius Lin.**

S. Nat. ed. 12. pag. 1161. Mus. Lud. Ulr. pag. 549. Rumphii Mus. Tab. 17. Fig. A. B. C. Nautilus major, Mart. Conch. vol. 1. pag. 222 etc.

Specimen statura modica inter Mollusca Japonica exstat.

Testa juvenis umbilicum semper ostendit pervium.

## **Pteropoda.**

### **Genus Cavolina Güeni. (Hyalaea Lam.)**

#### **Cavolina limbata d'Orb.**

Voy. Amér. mér. Moll. pag. 101. Tab. 6. fig. 11—15. = Hyalaea longirostris Q. et G. Zool. de l'astr. pag. 380. Tab. 27. fig. 20—24.

Plura specimina magnitudinis variae in mari Japoniae alto capta exstant.

#### **Cavolina gibbosa Rang.**

Hyalaea gibbosa Rang apud Orb. Voy. Tab. 8. fig. 16—20. Eydoux et Souleyet Bonite vol. 2. pag. 144. Tab. 4. fig. 13—19. cfr. Dunker, Moll. Guin. pag. 1. Hyalaea flava d'Orb. species eadem esse videtur.

Huius speciei late dispersae duo specimina exstant.

### **Genus Cleodora Péron et Lesueur.**

#### **Cleodora lanceolata Lesueur.**

Nouv. Bullet. des Sciences 1813. vol. 3. no. 60. Tab. 5. fig. 3. Cleodora pyramidata Péron et Lesueur Ann. du Mus. vol. 15. Tab. 2. fig. 14. Eyd. et Soul. Bonite Zool. vol. 2. pag. 179. Tab. 6. fig. 17—25.

Unum tantummodo exemplar laesum exstat.

### **Genus Stiliola Lesueur.**

#### **Stiliola subulata d'Orb.**

Voy. Amér. mérid. Moll. pag. 119. Tab. 8. fig. 15—19. H. et A. Adams Gen. of Rec. Moll. pag. 53. Tab. 6. fig. 5.

Plura specimina capta sunt.

### **Genus Triptera Quoy et Gaimard.**

#### **Triptera columella Rang. (Cuvieria).**

Ann. des sc. nat. vol. 12. Tab. 45. Cuvieria columella d'Orb. Voy. Amér. mérid. pag. 125. Moll. Tab. 8. fig. 35—39. Triptera columella H. et A. Adams Gen. of Rec. Moll. vol. 1. pag. 55. Tab. 6. fig. 6 et 6a

Plura specimina capta sunt.



*Embolus rostralis* Eydoux et Souleyet.

*Spirialis rostralis* Eyd. et Soul. Rev. Zool. 1840 pag. 236. Soul. Voy. Bonite 2, pag. 216. Tab. 13. figg. 1–10. cfr. J. G. Jeffreys not. of some Shells dredged by Capt. St. John, R. N. in Corea Strait, in Linnean Society's Journ. Zool. vol. 14. pag. 423.

Certe sumere licet alias quoque *Pteropodum* species in mari Japonico alto gregatim vivere.

**Muricina.**

**Genus Murex Lin.**

Clar. A. Adams in Proc. of the Zool. Soc. anni 1862 pag. 370. Murices (sensu Lamarckiano) in mari Japonico obvios a se repertos promulgavit. Inter eas species ex Japonia certe notas in nostra Molluscorum collectione nunc nonnullae exstant, quae in indice illo Adamsiano desiderantur, at contra plures et novas quidem Adamsius descripsit, quae mihi prorsus sunt ignotae. Quod attinet ad subgenera sic dicta notandum mihi est nonnulla certis finibus haud terminanda esse, ita ut species quaedam, quamvis non sint variabiles neque ambiguae, pari jure cum hic tum illic collocari possint. Praeterea haec subgenera plurimam partem in testas solummodo fundata, minime certa sunt. Nihilo minus tamen *Muricum* species Japonicas secundum ordinem Adamsianum digestas hic enumero.

*Murex duplicatus* Chemn.

*M. tribulus* nobilior varietas spinis longissimis integris parallelis pectinata. Linnaei Syst. Nat. ed. 12. pag. 1214 = *M. tenuispina* Lam. an. s. vert. vol. 9. pag. 566. A. Adams l. c. pag. 370. Lischke Jap. M. C. vol. 1. pag. 42.

O-shima, Nagasaki.

*Murex tribulus* Lin.

S. N. ed. 12. pag. 1214. Reeve Conch. icon. *Murex* sp. 82 = *M. crassispina* Lam. = *tenuispina* Kien. A. Adams l. c. pag. 370.

Simidzu.

*Murex aduncospinosus* Reeve (Beck).

Conch. icon. vol. 3. Mur. sp. 93 = *M. ternispina* var. Sow. Conch. Ill. fig. 68.

Tria specimina juniora exstant. Specimen pulcherrimum adultum jam antea a clar. Poehl. navarcho ad Jokohama captum accepi.

*Murex Martinianus* Reeve.

Proc. Zool. Soc. 1845. Conch. icon. vol. 3. spec. 72. Martini Conch. Cab. vol. 3. Tab. 113. fig. 1056 = *M. rarispina* Sow. nec Lam.

Mörchio teste hanc speciem Boltzenus jam antea *Muricem* trapam nominavit.

Specimen unicum exstat cum insidente Balano tintinnabulo minore.

In indice Adamsiano haec species deest.

*Murex Troscheli* Lischke.

Jap. M. C. vol. 1. pag. 41. Tab. 1. fig. 12. vol. 2. pag. 29.

Prope Nagasaki.

Specimen magnificum clar. Rein ex itinere Japonico retulit. Praeterea exemplaria nonnulla minora exstant. In indice Adamsiano haec species deest.

**Murex sobrinus A. Adams.**

Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 370. E. A. Smith. Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 199. Tab. 20. fig. 30.

Testa clavata, acute spirata, trivariosa, anfractibus septenis vel octonis convexis per longitudinem nodoso-costatis transversimque liratis instructa: suprema varicum pars spina unica subuncinata munita: rostrum longum rectum vel antice aliquantulum curvatum, spinis brevissimis nonnullis postice ornatum: canalis paene clausus; apertura rotunda, subovata: labrum crenulatum: color fundi flavescens: anfractus ultimus fasciis duabus fascis signatus. Long. 50, diam. max. 18 mill.

Satanomo-saki, Goto, Kuro-shima (A. Adams).

Duo exemplaria congruentia exstant cum descriptione Adamsiana quidem non satis convenientia. Cum vero icon supra citata, excepto habitu minore nostris plane respondeat, determinationem rectam habeo, suspicor enim clarissimum Smith specimina Adamsiana Musei Britannici ante oculos habuisse.

**Murex pliciferus Sowerby.**

Tab. nostra 4. fig. 1. 2.

Conch. Ill. Murex fig. 101. Reeve Conch. icon. vol. 3. Murex spec. 80.

Nagasaki.

Cum icones supra citatae paululum differant a speciminibus nostris, exemplar integerrimum hic depinxi.

Ad hoc usque tempus patria huius speciei rarae haud innotuit.

**Haustellum Klein (Brontes Montf. Haustellaria Swains.)**

**Murex haustellum Lin.**

Syst. Nat. ed. 10. pag. 746.

Specimen Japonicum pergrande exstat. Philippinae insulae, insula Ceylon, Mare rubrum etc). In indice Adamsiano deest.

**Chicoreus Montfort.**

**Murex Sinensis Reeve.**

Proc. Zool. Soc. 1845. pag. 55. Conch. icon. vol. 3. Murex spec. 25. Murex elongatus var. Sow.  
Conch. Ill. fig. 88. A. Adams l. c. pag. 371. Lischke Jap. M. C. vol. 1. pag. 43.

Tokio, Nagasaki etc. (China). Specimina minora lecta sunt.

**Murex Penchinati Crosse.**

Journ. de Conch. vol. 9. pag. 351. Tab. 16. fig. 6.

Nagasaki.

Specimen pulcherrimum exstat in Museo Loebbeckei Dusseldorpino.

**Murex adustus Lamarck.**

Anim. s. vert. vol. 9. pag. 573. Reeve Conch. icon. vol. 3. Murex spec. 29. A. Adams l. c. pag. 371.

Tatiyama, Tsu-shima. A. Adams.

Clar. Murex hanc cochleam pro Murice ramoso Linnaei habet, qui mihi dubiosus videtur, cum icones a Linnaeo citatae certo ad varias Muricum species spectent.

**Homalocantha Mörch.**

**Murex rota Sowerby.**

Tab. nostra 2. fig. 3. var.

Conch. Ill. no. 73. fig. 119. Reeve Conch. syst. vol. 2. pag. 194. Tab. 139. fig. 119. Conch. icon. vol. 3 spec. 105.

Testa crassiuscula tota lactea vel inter varices et in faucibus coerulescens, spira acuta, sutura cavernosa sex- vel septifariam varicosa, varicibus frondosis planis, antice dilatatis, subdigittatis vel palmatis instructa.

Insulae Moluccenses et Philippinae Cumingio teste.

Duo specimina Japonica exstant. Specimina quae clar. Jickeli in mari rubro prope Dahlak legit et mecum benevole communicavit, varicum digitis differunt, qui sunt longiores, angustiores, antice magis curvati nec dilatati neque palmati ut in speciminibus nostris Japonicis intelligi licet. (cfr. icon.)

Operculum tenue, superne inferneque cavatum, dense striatum, rufo-corneum peculiariter formatum est. A nucleo enim laterali tumulus sulco mediano divisus, ad labium testae producit, in latere opposito striae in lamellas subimbricatas transeunt. Talem operculi formationem in ceteris Muricibus nunquam observavi. Sane haec species ob operculi structuram singularem digna est, quae pro subgenere certo habeatur.

Haec cochlea Murici scorpionis Lin. affinis, sed satis diversa, cum raro inveniatur integra, a latere inferiore depicta est.

In indice Adamsiano desideratur.

**Pteronotus Swainson.**

**Murex eurypteron Reeve.**

Conch. icon. vol. 3. Murex spec. 176. Zool. Voy. Samarang. Moll. pag. 38. Tab. 8. fig. 1.

Mare Japonicum.

Duplex exstat varietas, altera paene tota alba, altera fusco fasciata.

**Murex plorator Adams et Reeve.**

Samar. Moll. pag. 33. Tab. 8. fig. 3.

Archipelagus Coreanus.

**Murex pinnatus Wood.**

Ind. test. Suppl. Tab. 5 fig. 20. Swains. Zool. Ill. vol. 3. Tab. 122. Kien. Coq. viv. pag. 114. Tab. 5. fig. 3. Reeve conch. icon. Murex spec. 57. Mart. Conch. Cab. vol. 3. pag. 350. fig. 1036. 1037. Lam. anim. sans vert. vol. 9. pag. 605. Murex Martinianus Pfr. Krit. Reg. pag. VII.

Inter Mollusca Japonica specimen minus exstat. Haec cochlea singularis e mari Sinensi satis nota est.

In indice Adamsiano desideratur.

**Murex acanthopterus Lam.**

Lamarck Anim. sans vert. vol. 9. pag. 577. Schroeter Einl. vol. 1. pag. 550. Tab. 3. fig. 8. Mörch Cat. Conch. Yoldi pag. 96.

Mare Japonicum?

**Murex brachypteron A. Adams.**

l. c. pag. 371.

Clar. Adams hanc speciem his verbis designat:

„Testa ovato-fusiformi, tenui, pallide fusca, castaneo sparsim maculata, linea albida transversa in anfractu ultimo ornata, trifariam varicosa; anfractibus senis convexis longitudinaliter crebre laciniatis, transversim liris, liris inaequalibus crenulatis; apertura ovata; labro margine fimbriato; canali mediocri clauso recurvato“.

Uraga.

Hanc cochleam non vidi.

**Murex Gouldii A. Adams. (Pteronotus).**

ibid. pag. 371.

„Testa ovato-fusiformi, fusca, maculis castaneis sparsim ornata, trifariam varicosa; spira acuta; anfractibus senis planis, postice subangulatis, transversim liris, liris inaequalibus confertis, varicibus breviter foliaceis, marginibus denticulatis, postice spina valida dentiformi instructis; apertura ovata integra; labro margine late fimbriato; canali recto, clauso, producto.“

Tsu-shima.

Clar. Adams annotat canalem clausum longiorem esse quam in Pteronotis solet.

Species mihi pariter ignota.

**Murex Stimpsoni A. Adams. (Pteronotus).**

ibid. pag. 371.

„Testa ovato-fusiformi, pallide fusca, trifariam varicosa; spira acuta; anfractibus septenis planis, postice angulatis, transversim valde liris, liris aequalibus laevibus, interstitiis clathratis, varicibus late foliaceis, postice dilatatis et rotundatis; apertura ovata antice acuminata; labro margine late fimbriato; canali brevi, clauso, recto.“

Uraga.

„Species concinne sculpta, varicibus foliaceis postice rotundatis insignis.“

**Phyllonotus Swains.**

**Murex falcatus Sowerby.**

Proc. Zool. Soc. 1840. pag. 145. Conch. Ill. fig. 31. Reeve Conch. icon. vol. 3. spec. 61. a. var. fusca, b. luteo alba. Lischke M. Jap. vol. 2. pag. 30. A. Adams l. c. pag. 372.

Tria specimina exstant et colore et habitu variantia, unum pallide fuscum. Icon Reeveana 61. a. varietatem refert pallide fuscam fascia lata castanea cinctam. Rostrum canaliculo ob-  
tecto instructum, in imagine Reeveana valde incurvatum est, in speciminibus nostris vero rectum. In uno specimine varicis ultimi lamina alata intrinsecus convoluta.

**Murex Yoldii Mörch.**

Cat. Conch. Yoldi pag. 95.

Mare Japonicum?



**Murex coronatus** A. Adams. (Phyllonotus).

l. c. pag. 372.

„Testa ovato trigonali, fusca, spira conica; anfractibus senis planis postice angulatis, liris quatuor validis transversis, interstitiis lirulis squamulosis confertis ornatis, varicibus septenis laciniatis fimbriatis, postice late uncinatis; apertura oblonga antice acuminata; labro margine postico, angulato, extus fimbriato; canali aperto brevi vix recurvato.“

Tsu-saki.

**Murex acanthophorus** A. Adams. (Phyllonotus).

l. c. pag. 372.

„Testa ovato-fusiformi quinquefariam varicosa, solida, albida; anfractibus quin in medio angulatis, superne planatis, transversim liratis, varicibus crassis, postice spina squamiformi triangulari armatis; apertura oblonga, antice acuminata; labro extus varicoso crasso fimbriato, intus valde crenato; canali clauso, antice recurvato, aperto.“

Tsu-saki.

Operculum Purpurarum instar.

**Murex unifasciatus** A. Adams. (Phyllonotus).

l. c. pag. 372.

„Testa ovato-fusiformi, subtrigonalis, quinquefariam varicosa serotina, fascia transversa lata rufo-fusca in anfractu ultimo ornata; anfractibus 7 planis, postice angulatis, longitudinaliter crebre plicatis, plicis laciniatis crispatis, transversim valde liratis, liris inaequalibus, majoribus cum minoribus alternantibus; varicibus foliatis brevibus, marginibus crenulatis, postice spina uncinata producta squamata instructis; apertura elongata subtriangulari; canali aperto, subrecto.“

Uraga.

**Cerastoma** Conrad.

**Murex foliatus** Martyn. (Purpura).

Tab. nostra 4. fig. 10. 11. var.

Hujus speciei insignis unum tantum specimen exstat Japonicum varicibus angustioribus minus foliatis costisque transversis obsoletis a forma usitata et typica paullo recedens, sed habitu, anfractuum numero, aperturae formatione, canali recurvo oblecto cum illa plane conveniens.

Clar. Deshayes in Lamarckii animantium evertetorum editione altera (vol. 9. pag. 605) synonyma Muricis foliati hoc modo emendavit:

Murex foliatus Gmel. S. N. pag. 3529. Murex purpura foliata Chemn. Conch. Cab. vol. 10. pag. 250. Tab. 161. figg. 1538. 1539. (specimen pergrande). Purpura foliata Martyni Conch. univ. Tab. 66. Murex foliatus Dillwyni Cat. vol. 2. pag. 687. Wood ind. test. Tab. 25. fig. 13. Murex tripterus Kieneri Coq. viv. pag. 108 Tab. 26. fig. 2. (non M. tripterus Bornii).

Haec species a Japonis „Yeiraku-gahi“ dicta, pariter in regionibus septentrionalibus, ex gr. in mari Kamschatkano, obvenit.

**Murex Burnettii Adams et Reeve.**

l. c. pag. 373.

Voy. Samar. Moll. pag. 38. Tab. 8. fig. 4.

Hakodate, Archipelagus Koreanus. Exstat specimen minus et detritum.

**Murex emarginatus Sow.**

l. c. pag. 373.

Proc. Zool. Soc. 1840. Conch. Ill. fig. 98. 100. Reeve Conch. icon. vol. 3. spec. 1.

Mare Japonicum (Sowerby). Kiushiu, fretum Coreanum.

**Murex rorifluus Adams et Reeve.**

Voy. Samar. Moll. pag. 38 Tab. 8. fig. 2 a b. Reeve Conch. icon. vol. 3. spec. 190.

Corea Belger. Portus De-shimae. Dkr. Moll. Jap. pag. 4 etc.

Plura specimina exstant.

Species variabilis, quacum pro mea opinione *Murex monachus* Crosse (Journ. de Conch. vol. 10. pag. 55. Tab. 1. fig. 8) jungendus est, nam nullum inter utramque cochleam invenire possum discrimen gravius.

**Murex Fournieri Crosse.**

Journ. de Conch. vol. 9. pag. 352. Tab. 16. fig. 7. A. Adams l. c. pag. 373.

Specimina adsunt integerrima epidermide lamellosa obducta ad Nagasaki lecta, 52 mill. longa, inde specimine Crosseano multo majora.

**Ocinebra Leach.**

**Murex Japonicus Dkr.**

Malac. Bl. 1860. pag. 230. Moll. Japon. pag. 4. Tab. 1. fig. 14. (specimen pergrande) = *Murex Talienwhanensis* Crosse Journ. de Conch. vol. 10. pag. 56. Tab. 1. fig. 9. A. Adams l. c. pag. 373.

Portus De-shimae, Nagasaki.

Specimina tantum minora nunc exstant. Cochlea plerumque unicolor subfusca vel cinerascens. Inter specimina nuperrime lecta unum exstat detritum album in anfractu ultimo fascia fusca cinctum. Inter speciem nostram et *Muricem Talienwhanensem* Crossei nullum constat discrimen gravius. Pariter non longe absum quin credam *Muricem inornatum* Recluzii (Journ. de Conch. 1851. pag. 207. Tab. 6. fig. 7. 8. huc pertinere.

**Murex fimbriatulus A. Adams (Trophon.)**

Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 375. 1879 pag. 201. Tab. 20. fig. 31.

Goto, Kuro-shima.

**Murex calcarius Dkr.**

Mal. Bl. vol. 6. pag. 230. Moll. Jap. pag. 5. Tab. 1. fig. 2. *Urosalpinx innotabilis* E. A. Smith

Proc. Zool. Soc. 1879 pag. 201. Tab. 20. fig. 32.

Specimen nunc exstat 30. mill. longum multo majus quam icon citata exhibet.

### **Muricidea Swains.**

**Murex diadema** A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1853 pag. 70. A. Adams l. c. pag. 373.

Satanomosaki. Insulae Philippinae (H. Cuming).

**Murex cirrosus** var. Hinds.

Proc. Zool. Soc. 1843. pag. 128. Voy. Sulph. 3. pag. 9. Tab. 3. fig. 17. 18. Reeve Conch. icon. sp. 133.

E. A. Smith. Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 200.

Fretum Coreanum.

**Murex puteolus** A. Adams (Muricidea).

l. c. pag. 373.

„Testa ovato-fusiformis, conica, pallide fusca, anfractibus quinque in medio angulatis, transversim liratis, squamoso-asperis instructa; lirae validae subdistantes; varices septem transversim costato-spinosi et postice in spinas squamatas producti; apertura ovata, postice integra; canalis brevis apertus recurvatus.“

Tsusaki.

Hae tres Muricideae species in collectione nostra desiderantur.

### **Genus Typhis Montf.**

**Typhis Montforti** A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1862 pag. 374. Sow. Thes. Conch. vol. 3. pag. 320. Tab. 284. fig. 18. 19.

Mare Japonicum, Okino-shima.

**Typhis arcuatus** Hinds.

Sulphur Moll. pag. 10. Tab. 3. fig. 1. 2. Typhis Japonica A. Adams Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 374.

Mare Japonicum, Caput bonae spei.

Utraque species in collectione nostra desideratur.

### **Genus Trophon Montf.**

**Trophon clathratus** Lin. (Murex).

Conferantur synonyma in indice Adamsiano l. c. pag. 374.

Ad insulam Saghalin etc. invenitur.

**Trophon luculentus** Reeve (Murex).

Tab. nostra 1. fig. 3. 4.

Conch. icon. vol. 3. spec. 127. Trophon fimbriatus Hinds. Moll. Voy. H. M. 5. Sulphur pag. 14.

Tab. 1. fig. 18. 19. (Fretum Macassarense).

Specimen quod exstat unicum integerrimum iconibus supra citatis satis respondet. —  
37 mill. longum, 22 latum est.

Dunker, Moll. Jap. mar.

Testa ovato-fusiformis paene biconica, spira porrecta gradata, anfractibus octonis superne angulatis, transversim costatis varicibusque imbricatis ornata; anfractus ultimus spira duplo longior, varicibus novenis lamelloso-fimbriatis instructus, varicum interstitia pariter lamellosa; apertura oblonga; canalis rectus apertus; color griseo-lutescens; labrum in sulcis fuscum.

Cochlea nostra pro toto habitu et varicibus lamellosis Trophonum generi adnumeranda est. H. et A. Adams eam cum Ocinebris Leachii junxerunt.

Murex fimbriatus Lamarckii est species valde dubia, Murex fimbriatus Defrancei est species quaedam fossilis telluris tertiariae.

#### Trophon pachyrhapse Smith (Fusus).

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 205. Tab. 20. fig. 37. 37 a.

Goto, Kiushiu.

Opinatus sum hanc cochleam pro habitu melius cum Trophonum genere jungendam esse.

#### Trophon Birileffi Lischke.

Malak. Bl. 1871. pag. 39. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 32.

Mare Japonicum prope Nagasaki etc.

Tria huius speciei exemplaria in collectione exstant exceptis iis, quae jam antea ab amico Lischke accepi. Clar. auctor hanc cochleam cum Trophone vel Fusu cinereo Sayi comparavit, sed Trophon Hanleyi Angasii e portu Jacksoniano nostrae cochleae tam affinis est, ut vix pro varietate haberi possit, nam discrimen unicum inter utramque testam constat forma paullulum graciliore speciei Angasianae, quod nullam in partem valet.

Annotandum hic est clar. Menke Fusum cinereum Sayi Buccinum plicosum nominasse (Synopsis Moll. pag. 59) secundum specimina ab ipso quondam ad me missa. Buccinum meum plicosum (Zeitschr. für Malak. 1846 pag. 111) plurimum differt, est enim Nassarum capensium species, quam clar. A. Adams nonnullis annis post Nassam speciosam nominavit. (Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 100).

Praeterea clar. A. Adams in Proc. Zool. Soc. 1862 pag. 375 has Trophonum species Mare Japonicum praesertim septentrionale habitantes enumeravit.

#### Trophonem crassum A. Adams.

Murex crassus Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 269.

Hakodate.

#### Trophonem incomptum Gould.

Trophon incomptus Gould Otia Conch. pag. 125.

Hakodate.

Monente Adams fortasse eadem species.

#### Trophonem liratum Couth.

Fusus liratus Couth. Gould Otia conch. pag. 64. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 1849.

Manchuria.

*Trophonem crispum* Gould (*Fusus*).

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 1849, pag. 141. Expl. Exped. pag. 229, fig. 279.

*Trophonem Orpheum* Gould (*Fusus*).

Proc. Boston. Zool. Soc. Nat. Hist. 1849, pag. 142. Exped. Shells pag. 65. Expl. Exped. pag. 234, fig. 285.

Okosiri.

*Trophonem candelabrum* Reeve.

Reeve Conch. icon. *Fusus* spec. 79.

Tsusaki.

*Trophonem concinnum* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1862, pag. 375.

Refunsiri.

*Trophonem tantillum* A. Adams.

ibid.

Satanomosaki.

Hae species ab Augusto Gould inter *Fusos* accuratius descriptae ac depictae in United States Expl. Exped. inveniuntur.

Nescio qua de causa A. Adamsius nomine *Trophonis* pro neutro usus sit. Clar. Hermannsen hoc genus Montfortianum a nom. propr. *Troqáwtos* derivavit.

## Fusina.

### Genus *Fusus* Lamarek.

*Fusus nodoso-plicatus* Dkr.

Nov. conch. pag. 99. Tab. 33, fig. 3, 4.

Plura specimina adsunt, minus a clar. J. Rein prope Nagasaki lectum, epidermide setigera vestitum est.

*Fusus Nicobaricus* Chemn. (*Murex*).

Lischke Jap. M. Conch. vol. 1, pag. 34.

Nagasaki, Philippinae insulae.

*Fusus inconstans* Lischke.

Jap. M. Conch. vol. 1, pag. 34. Tab. 2, fig. 1—6.

Plura specimina juniora et adulta exstant integerrima epidermide fusca setigera obducta. Nucleus laevis et subpapillaris est. Haec species prope Tokio, Nagasaki aliisque locis Japoniae haud rara, interdum magnitudinem eximiam 180 mill. attingit. In opusculo meo de Molluscis Japonicis pag. 3 hanc cochleam pro *Fuso* crebrilrato Reevei (Conch. icon. *Fusus* spec. 20) enumeravi cum aliqua quidem dubitatione. Certe huic speciei Novae Hollandiae peraffinis est, quae habitu magis

ventroso differre videtur. Clar. E. A. Smith Fusum perplexum A. Ad. Journ. Linn. Soc. 1864 vol. 7. pag. 106 speciem eandem esse opinatur. Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 202.

*Fusus longicauda* Bory.

Enc. méth. Tab. 423. fig. 2. Reeve Conch. icon. vol. 4. *Fusus* spec. 13.

Duo specimina adsunt, alterum epidermide fusca et lamellosa obductum. Testa eorum gracilis, anfractibus 11—12 rotundatis, transversim inaequaliterque liratis, acute costatis instructa; anfractus superiores per longitudinem plicati; color albus apicem versus fuscescens; cauda vel potius rostrum \*) rectum longum ac tenue. In determinanda hac specie Reeveum ducem habui; icon 13 aliquo modo saltem quadrat in nostra specimina. In Lamarekii systemate animantium evertebratorum, quod attinet ad opera citata et icones saepius tristissima est specierum confusio.

*Fusus tuberosus* Reeve.

Conch. icon. vol. 4. *Fusus* spec. 7.

Nagasaki.

Duo specimina lecta sunt colore albo fuscoque vivide marmorata et strigata cum icone supra citata convenientia, sed minora. Haec species singularis canali brevi leviter flexo, late aperto, apice mamillari, faucibus fortiter liratis coeruleo-albis insignis est. Specimina integra epidermide cornea lamellosa obducuntur.

*Fusus nigrirostratus* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 202. Tab. 20. fig. 33.

Fretum Coreanum.

Haec species primo obtutu antecedenti simillima est, quae quidem statura majore et latiore differt.

*Fusus Japonicus* Gray.

Zool. of Cap. Beechey's Voy. pag. 115.

Mare Japonicum.

Species dubia.

*Fusus spectrum* Adams et Reeve.

Zool. of the Voy. etc. Samar. Moll. pag. 41. Tab. 7. fig. 2. *Tritonium spectrum* Schrenck Amurl. Moll. pag. 417.

Num Fusi nodoso-plicati vel Fusi inconstantis varietas sit, certe dicere nequeo.

*Fusus lacteus* Dkr.

Tab. nostra 3. fig. 11. 12.

Testa crassa fusiformis lactea, anfractibus novenis convexis, infra suturam cavatis, per longitudinem plicato-costatis transversimque liratis instructa, ultimo  $\frac{3}{5}$  totius longitudinis adae-

---

\*) Male scriptores nonnulli hanc anticam Fusorum partem caudam appellant, pari modo perperam et vitiose pediculus vel petiolus nominatur.

quante; apertura ovata; columella parum arcuata; labrum incrassatum intus sulcatum; rostrum rectum; anfractus ultimus a tergo visus spira brevior; canalis latiusculus.

Hanc speciem 107 mill. longam, 40 latam liris transversis costisque longitudinalibus crassis subaequalibus insignem inter Fusos huiusque descriptos invenire non potui. Habitat mare Japonicum. Exstat in Museo Theodori Loebbecke Dusseldorpi.

*Fusus Niponicus* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 203. Tab. 20. fig. 34.

*Niponia australis*.

*Fusus simplex* Smith.

Proc. Zool. Soc. pag. 204. Tab. 20. fig. 35.

*Fretum Coreanum*.

*Fusus Coreanicus* Smith.

l. c. pag. 204. Tab. 20. fig. 36.

*Corea australis*.

*Fusus pagoda* Lesson.

Tab. nostra 1. fig. 8. 9. fig. 10, nucleus (vel papilla) magnitudine aucta delineatus.

Illustrations de Zool. vol. 14. Tab. 40. Müller Synopsis nov. test. pag. 108. Kiener spec. des Coq. viv. pag. 7. Tab. 5. fig. 2. Lamarck anim. sans vert. vol. 9. pag. 464. Reeve Conch. icon. vol. 4. Fusus spec. 32.

Testa fusiformis, gracilis, unicolor fuscescens, spira gradata turrita, anfractibus, incluso nucleo, octonis convexis, medio carinatis et apice vel nucleo papillaeformi instructa; carina squamis subdistantibus compressis spinaeformibus plus minusve erectis coronata; anfractus ultimus costa inferne subimbricata cinctus; rostrum longissimum spinulosum leviter incurvatum; canalis angustus apertus; apertura subrotunda parva; labrum tenue intus laeve luteo-albidum. — Long. 75—80. diam. 21 mill.

Operculum tenue corneum, oblique ovatum, superne acuminatum, dense striatum, canaliculo levi ab acumine decurrente signatum. Sanè forma Fusorum valde singularis praesertim respectu habito nuclei, qui est papillaeformis, quam formationem inter Fusos hodiernos tali perspicuitate nullibi invenimus. Anfractus rotundati carina mediana spinis distantibus compressis ornata insignes; carina altera, vel potius costa angusta obsolete imbricata aut serrata partem anfractus ultimi inferiorem tenet. Praeterea tota testa striis incrementi tenuibus oblecta est, excepto quidem nucleo laevigato.

Cum haec cochlea rara singulis partibus variare videatur, hic denuo depicta est. — Apud Japanos Kiri-gahi nominatur.

Inter Fusos telluris tertiariae *Fusus serratus Deshayesii* (Coq. foss. de Paris vol. 2. pag. 513. Tab. 74, fig. 12. 13.) comparandus est.

### Genus Neptunea Bolten.

#### Neptunea arthritica Valenciennes (Fusus).

Comptes rendus 1858. vol. 46. pag. 761. Bernardi Journ. de Conch. vol. 6. pag. 386. Tab. 12. fig. 33a.  
Tritonium arthriticum Schrenck Amurl. Moll. pag. 421.

Clar. de Schrenck Fusum bulbaceum Valenciennesii (Bernardi Journ. de Conch. vol. 7, pag. 183. Tab. 7, fig. 1) pro varietate cum nostra specie conjunxit, at contra clar. A. Adams Fusum bulbaceum pro varietate Neptuneae antiquae (Muricis) Linnaei habet et Neptuneam arthriticam cum Neptunea Cumingii Crosse et Fusio fornicato Gray jungendam esse affirmat. Cum speciminum copia nimis exigua mihi praesto sit ad varias formas rite comparandas, de his sententiis discrepantibus certe judicare non ausus sim. Ceterum conferantur quae clar. Lischke de Neptunea arthritica jam disseruit (Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 37).

#### Neptunea despecta Lin. (Murex).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 754. Chemn. Conch. Cab. vol. 4. fig. 1293. 1296. Tritonium despectum.  
Müll. Zool. Dan. Prodr. pag. 243. Fusus despectus Lam. anim. sans vert. vol. 9. pag. 448 etc.  
Conferantur synonyma in operis Lischkeani vol. 3. pag. 24.

Mare Japonicum septentrionale.

#### Neptunea antiqua Lin. (Murex.)

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1222.

Clar. de Middendorff ad hanc speciem Muricem fornicatum Gmel. = Tritonium fornicatum O. Fabr. refert, at contra Gmelinus in dubio est an sit distincta a Fusio despecto species.

Mare Japonicum septentrionale.

#### Neptunea Kelletti Forbes (Fusus).

Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 274. Tab. 9. fig. 10.

Clar. Carpenter Rep. 2. pag. 663. hanc cochleam cum Siphonaliis conjunxit, quae vero habitum prae se ferunt longe alienum.

Specimina nostra Japonica testa paullulo graciliore ab icone supra citata differunt.

Clar. Kellett navarchus hanc cochleam primus e litore Californiano reportavit.

#### Neptunea lurida A. Adams.

Tab. nostra 3. fig. 3. 4.

Proc. Linnean Soc. vol. 7. pag. 105.

Specimen originale hic depinxi a varietatibus quibusdam Neptuneae arthriticae vix separabile.

#### Neptunea plicata A. Adams (Sipho.)

Tab. nostra 3. fig. 1. 2.

Kobelt in Mart. Chemn. Conch. Cab. ed. alt. Tab. 12. fig. 4. 5. Fusus arcticus. Phil. Abb. vol. 3. pag. 119. Tab. 5. fig. 5. si non eadem species, certe valde affinis. *both = Kroyeri Møller*

Icon nostra secundum specimen a clar. Adams Museo Senckenbergiano Frankofurtano missum desumpta est.

Nomen Siphonis Kleinius (Meth. Ostrac. pag. 53) variis Cochlidum generibus valde diversis imposuit.



**Neptunea pericochlion Schrenck (Tritonium, Bucc.).**

Bull. de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersb. vol. 5. pag. 513. Reisen im Amurl. vol. 2. Moll. pag. 433.  
Tab. 17. fig. 11. 12.

Sinus prope Hakodate.

Haec species insignis et singularis ad sectionem Fusi Islandici pertinet.

**Genus Hemifusus Swains.**

**Hemifusus tuba Gmelin. (Murex).**

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3554. *Pyrula tuba* Lam. anim. sans vert. ed. 2. vol. 9. pag. 507. Reeve  
Conch. icon. vol. 4. Tab. 9. fig. 22. Dkr. Moll. Jap. pag. 4. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 36.

Specimen minus lectum est.

Duplex huius cochleae varietas invenitur, altera rostro lato medio tumente tuberibus vel potius cornibus magnis, interdum resupinatis, in anfractu ultimo senis vel septenis, altera gracilior tuberibus multo minoribus, in anfractu ultimo octonis vel undenis, illa, quantum scio, praesertim Sinensis, haec Japonica. Specimina integra apicem ostendunt papillarem et epidermidem fuscam lamellosam setis densis erectis instructam.

Icon Chemnitziana (Conch. Cab. vol. 4. fig. 1333) a Gmelino citata nimis rudis est.

**Genus Thatcheria Angas.**

**Thatcheria mirabilis Angas.**

Proc. Zool. Soc. 1877. Tab. 54. fig. 1. a. b.

Cochlea sane mirabilis, a clar. C. Thatcher nuper ex Japonia allata, pro toto habitu Fusinis inserenda est, *Hemifusus Swainsoni* proxima. Incola testae haud innotuit.

**Genus Siphonalia A. Adams.**

Species hujus generis a clar. Reeve plurimam partem inter *Buccina* enumerantur, sed toto habitu propius ad *Neptuneas* accedunt. Operculum, quod nunquam vidi, teste Adamsio illi *Fusorum* respondet. *Siphonaliae* sectionem *Fusorum* bene terminatam formare mihi videntur praesertim in mari Japonico viventem. Cfr. On the Japanese species of *Siphonalia*, a proposed new genus of Gastropodous Mollusca in Ann. and. Mag. of Nat. Hist. 1863. pag. 202.

**Siphonalia signum Reeve (Buccinum).**

Tab. nostra 3. fig. 9. 10. var.

Conch. icon. vol. 3. *Buccinum* spec. 6.

Specimen jam antea ex Japonia (Nagasaki) acceptum exstat, pariter et varietas, quam clar. J. Rein. ex itinere in Japoniam facto nuperrime reportavit.

Icones nostrae varietatem exhibent colore livido cinerascete maculisque grandibus sparsis nigro-fuscis signatam, intus hepaticam. Specimen a Reeveo depictum in aperturae margine laesum vel imperfectum fuisse videtur. Specimina plane adulta in labro interno semper sunt sulcata. Haec species forma sua *Siphonariae* *cassidariaeformis* varietates quasdam in mentem revocans, spira brevior nec non testa lineis undulatis sub vitro tantum conspicuis undique cincta, paene glabra facile distinguitur.

Ad rariores Japoniae cochleas sine dubio pertinet, cum rarissime inveniatur in Molluscorum collectionibus.

*Siphonalia cassidariaeformis* Reeve (Buccinum).

Conch. icon. vol. 3. Buccinum spec. 11. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 38. Tab. 4. exceptis iconibus 3. 4. 5.

Cochlea colore et pictura pervariabilis. Specimina quae exstant pleraque minora sunt neque adulta. Clar. Lischke varietates nonnullas optime depinxit, sed notandum est, icones 3, 4 et 5 ad speciem, quae sequitur, pertinere. Icon Reeveana desumpta est a specimine giganteo habitu paullo discrepante.

*Siphonalia ornata* A. Adams.

l. 1. pag. 204. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. Tab. 4. fig. 3. 4. 5.

Plures testae juveniles et adultae exstant.

*Siphonalia hinnulus* A. Adams et Reeve (Buccinum).

Zool. of the Voy. of H. M. S. Samarang Moll. pag. 32. Tab. 7. fig. 10. a. b.

Plura specimina juniora et unum adultum, satis convenientia cum iconibus supra laudatis.

Haec species sculptura subtiliore et picturae indole a *Siphonalia cassidariaeformi* facile distingui potest. Fortasse fig. 1 in Lischkei Tab. 4 huc pertinet.

*Siphonalia spadicea* Reeve (Buccinum).

Buccinum fusoides Reeve Conch. icon. vol. 3. Tab. 9. fig. 64. *Siphonalia spadicea* A. Ad. Ann. et Mag. Nat. Hist. 1863. vol. 11. pag. 203. Smith Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 205. Tab. 20. fig. 38.

Haec species a *Siphonalia cassidariaeformi* statura graciliore, costis transversis subtilioribus plicisque tuberculatis vix indicatis praesertim differt. Specimen adest decoloratum, quod rostro tantum paulo curvior ab icone Reeveana discrepat. Fusorum quorundam habitum refert.

*Siphonalia longirostris* Dkr.

Tab. nostra 1. fig. 13. 14.

Testa solidula fusiformis, flavida, anfractibus octonis rotundatis transversim inaequaliterque costatis, per longitudinem striatis obsoleteque plicatis instructa; apex submamillaris; apertura oblonga; labrum subincrassatum intus sulcatum; rostrum longum recurvum; canalis profundus apertus.

Specimen quod exstat unicum 60 mill. longum, in medio anfractu ultimo 28 mill. latum, inter omnes *Siphonalias* ad hoc tempus notas rostro resupinato perlongo excellit. Testa ejus solida unicolor flavida costisque angustis inaequalibus, ex parte filiformibus cincta est, quae striis incrementi longitudinalibus decussantur. Vestigia epidermidis corneae in hoc specimine passim conspici possunt.

Mare Japonicum. Certus locus natalis ignotus est.

*Siphonalia trochulus* Reeve (Buccinum).

Conch. icon. vol. 3. Buccinum spec. 7.

Plura specimina adulta exstant.

Testa oblongo-ovata, crassa, anfractibus rotundatis transversim denseque costulatis, apicem versus longitudine plicatis instructa; color fundi cinereo fuscus, costulis albis distantibus varie-

gatus; apertura oblonga; labrum incrassatum, intus sulcatum; rostrum recurvum; canalis apertus; fauces fuscae vel hepaticae.

Species singularis nec forma, neque pictura variabilis. Apud Japanos „Janagi no ito gai“ nominatur.

Praeterea clar. A. Adams l. c. has Siphonaliae species ut cochleas Japonicas enumeravit.

*Siphonalia fuscolineata* H. Pease (Neptuneam).

Proc. Zool. Soc. 1860 pag. 189. Tab. 51. fig. 3.

Mino-shima.

*Siphonalia modificata* Reeve (Buccinum).

Conch. icon. spec. 67.

Kuro-shima.

*Siphonalia commodam* A. Adams.

l. c. pag. 203.

*Siphonalia corrugata* A. Adams.

l. c. pag. 204.

Oki-no-shima.

*Siphonalia conspersam* A. Adams.

ibid.

Mare Japonicum. Exstat in Museo Britannico.

Siphonariae cassidariaeformi similis esse, sed colore et sculptura differre dicitur.

*Siphonalia concinnam* A. Adams.

ibid.

Kuro-shima.

*Siphonalia filosam* A. Adams.

ibid. pag. 205.

Mare Japonicum et Sinense.

*Siphonalia ligatam* A. Adams.

l. c. pag. 205.

Mare Japoniae. Exstat in Museo Britannico. (Coll. Cumingiana.)

*Siphonalia griseam* A. Adams.

ibid.

Simidzu.

*Siphonalia colum* A. Adams.

ibid.

Mino-shima.

Dunker, Moll. Jap. mar.

*Siphonalia acuminata* A. Adams.

ibid. pag. 206.  
Goto.

*Siphonalia pyramidem* A. Adams.

ibid.  
Satanomi-saki.

*Siphonalia mundam* A. Adams.

ibid.  
Kuro-shima.

*Siphonalia nodulosam* A. Adams.

ibid.  
Mino-shima.

Dè his omnibus speciebus certe dijudicare nequeo, cum eas examinandi mihi non data fuerit occasio.

*Buccinum imperiale Reevei* in *Conchyliologia iconica* spec. 8 sine indicatione loci natalis descriptum, certe ad *Siphonalias* pertinens, pariter Mare Japonicum habitare videtur. Specimen huius cochleae mirabilis et rarissimae, quantum scio ad hoc tempus unicum, in Museo Britannico asservatur.

**Genus Pollia Gray.**

*Pollia Proteus* Reeve (*Buccinum*).

Conch. icon. *Buccinum* spec. 51. Lischke Jap. M. C. vol. 1. pag. 59.  
Patria Japonia, insulae Philippinae etc.  
Specimen minus exstat.

*Pollia Cumingiana* Dkr. (*Buccinum*).

Ztschr. für Mal. m. Julii 1846. pag. 111. = *Buccinum ligneum* Reeve Conch. icon. *Buccinum* spec. 57. Dec. 1846.

Seto-uchi A. Adams. Nagasaki Lischke.

Species variabilis. *Buccinum balteatum Reevei* Conch. icon. spec. 59. varietas esse mihi videtur.

*Pollia contracta* Reeve (*Buccinum*).

Conch. icon. *Buccinum* spec. 53.  
Nagasaki, Philippinae insulae. Cfr. Lischke Jap. M. C. vol. 2. pag. 50.

*Pollia Menkeana* Dkr. (*Cantharus*).

Malak. Bl. 1860 pag. 222. Moll. Jap. pag. 7. Tab. 1. fig. 7.  
De-shima, Nagasaki.

Clar. A. Adams hanc speciem (Ann. Mag. Nat. Hist. 1870. pag. 424) cum *Ricinula concinna Reevei* (Conch. icon. *Ricinula* spec. 35) conjunxit, quae vero toto habitu, sculptura picturaque valde discedit a nostra cochleola.

*Pollia subrubiginosa* Smith (Tritonidea).

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 206. Tab. 20. fig. 40.

Fretum Coreanum, Uku-shima.

Species *Buccino rubiginoso* Reevei aliqua ex parte similis, sed satis diversa. Conferatur descriptio auctoris exacta.

*Pollia* (Tritonidea) *marmorata* Reeve (*Buccinum*).

Conch. icon. vol. 3. Bucc. spec. 95. Tritonium marmoratum Schrenck Amurl. Moll. pag. 427.

Hakodate (Lindholm), insula Capul Philippinarum (H. Cuming). Haec species desideratur.

*Pollia lineolata* Dkr. (*Fusus*).

Phil. Abb. vol. 1. pag. 4. (110) Tab. 1. fig. 10. (1844). Krauss Südafr. Moll. pag. 180. (1848). *Buccinum Dunkeri* Küster Conch. Cab. ed. nova vol. 3. 1858. pag. 86. Tab. 15. fig. 9—11. Tritonium (*Buccinum*) *Dunkeri* Schrenck Amurland pag. 428.

Prope Hakodate lecta.

Beatus Küster cum hanc cochleolam *Buccinis* aggregaverit, nomen mutare adductus est, quamvis *Buccinum lineolatum* Lamarckii multo melius *Cominellis* adjungatur. Cochlea nostra certe ad *Fusos* pertinet sensu quidem Lamarckiano. Sin autem formationem et totum testae habitum accuratius respicimus, *Pollis* vel *Tritonideis* Swainsoni adnumerari debet sicut et species, quae sequitur. Attamen cum incola testae hucusque haud innotuerit, in determinatione generica aliqua remanet dubitatio, nam pariter ad *Euthrias* pertinere potest. Sane dolendum est multas testas valde ambiguas esse ob deficientem animantium cognitionem.

Hanc speciem concinnam primus inter Mollusca promontorii bonae spei enumeravi; pariter in sinu Algoensi ni fallor, invenitur. Nunc specimina quoque in Molluscorum collectione Japonica exstant Africanis plane respondentia.

*Pollia Capensis* Dkr. (*Fusus*).

Phil. Abb. vol. 1. pag. 4. (110) Tab. 1. fig. 7.

Specimen quod exstat Japonicum sine certa indicatione loci natalis cum testis *Capensibus* plane convenit. Adsunt quoque in Molluscorum collectione nostra duo exemplaria in mari Kam-schatkano orta nec non tres testae a beato Joanne Zelebor in insula Pauli collecta; inde patet et hoc molluscum late dispersum esse.

**Genus *Euthria* Gray.**

*Euthria viridula* Dkr. (*Fusus*).

Tab. nostra 3. fig. 5. 6. fig. 7 et 8 varietates fasciatam et lineatam repraesentant.

Dunker Moll. Jap. pag. 3. Tab. 1. fig. 16. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 39. Tab. 5. fig. 5. 6.

Magnum huius cochleae copiam observavi. Singula specimina fasciis tribus latis lineisque tenuibus atro-fuscis ex parte interruptis cincta, plurima vero coeruleo-viridescencia maculis strigisve undulatis fuscis picta sunt. Sin autem epidermis cornea laborando calce chlorata et adhibendo acido muriatico sublata vel detracta est, ut exemplar a Lischkeo depictum, color apparet coeruleus, si penitus detrita sunt specimina vel erosa, stratum nigro-fuscum in iis conspicitur.

Amicus Lischke opinatus est specimen a me depictum non plane adultum fuisse, quod vero in errore nititur, nam labrum ejus interne incrassatum et sulcatum est; costae enim internae in

hac specie aetate tantum nascuntur. Specimina plerumque minora sunt quam icon Lischkeana testam permagnam exhibens. Omnia anfractibus rotundatis instructa sunt excepto uno permagno, quod anfractus ostendit subangulatos.

Inter Euthrias mihi notas *Fusus plumbeus* Philippii e freto Maghellani nostrae speciei quidem similis, sed satis diversus est tam colore et pictura, quam anfractibus supremis perspicue costatis, quae costulae in nostra specie rarissime vix indicatae sunt.

Clar. H. et A. Adams fratres *Fusum plumbeum* male inter *Trophones* enumeraverunt (Gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 77). Clar. A. Adams (Proc. Lin. Soc. vol. 7. pag. 108). *Euthriam viridulam* non solum atque adeo *Buccinum ferreum* Reevei cum *Fuso plumbeo* conjunxit. Ceterum conferantur quae l. c. de *Euthria viridula* jam dicta sunt.

## Pleurotomacea.

### Genus *Pleurotoma* Lam. (Turris Humph. \*)

#### *Pleurotoma grandis* Gray.

Griff. Cuv. Anim. Kingd. Tab. 23. fig. 1. = *Pleurotoma crispa* Kien. non Lam.

Inter Mollusca nostra Japonica specimen mutilatum exstat sine certa indicatione loci natalis. Specimina Sinensia haud differunt.

#### *Pleurotoma marmorata* Lam.

Anim. sans vert. ed 2. vol. 7. pag. 95. Martini Conch. Cab. vol. 4. pag. 186. fig. 1345. 1346. *Turris babylonica* maculis rufescentibus distincta. Beechey's Voy. pag. 119. Tab. 34. fig. 9. *Pleurotoma hastula* Reeve Conch. icon. vol. 1. Pleur. spec. 139.

Plura specimina haud adulta ex Japonia retulit clar. Rein.  
Species tam forma quam pictura aliquantulum variabilis.

#### *Pleurotoma variegata* Kien.

Coq. viv. Tab. 9. fig. 1. non Reeve.

Specimen minus, decoloratum. (Ad *Surculus* H. et A. Adams pertinet.)

#### *Pleurotoma tuberculata* Gray (*Surcula*).

Beechey's Voy. pag. 120. Reeve Conch. icon. Pleurot. Spec. 72. (Patria non est indicata.)

Duo specimina juniora et unum adultum exstant in sinu Jedoënsi capta. Praeterea testa integra ex insula Java ad collectionem Molluscorum meam pertinet speciminibus Japonicis plane respondens, sed unicolor alba.

---

\*) Cum nomen „Turris“ variis conchyliorum generibus, quin etiam Acalepharum generi cuidam jam impositum sit, denominatio Lamarckii apta et idonea, quae labri incisuram bene exprimit, pro his cochleis longe praefenda est. Conferantur synonyma in J. G. Gray „a list of the genera of rec. Moll. their synonym. and types“ in Proc. Zool. Soc. 1847. pag. 134. et A. N. Herrmannsen Ind. gen. Mal. primordia vol. 2. pag. 657.

*Pleurotoma Coreanica* Adams et Reeve.

Voy. Samarang Moll. pag. 40. Tab. 10. fig. 8.

Corea.

*Pleurotoma albicarinata* Sow. (Surcula).

Proc. Zool. Soc. 1833. Weinkauff, Mart. et Chemn. Conch. Cab. ed. 2. Tab. 6. fig. 1. = *Pl. oxytropis*  
Sow. var. Reeve Conch. syst. vol. 2. pag. 187. Tab. 233. fig. 2.

Mare Japonicum et Chinense. (Sinus Panamensis teste Reeve, quod ego non confirmaverim.)

*Pleurotoma declivis* Martens.

Conch. Mitthl. vol. 1. pag. 39. Tab. 9. fig. 2.

Hakodate Japoniae borealis. Legit Hilgendorf Dr.

*Pleurotoma unedo* Valenc.

M. S. Mus. Par. Kien. Icon. Coq. viv. pag. 19. Tab. 14. fig. 1. Reeve Conch. icon. Pleurot. spec. 12.

Specimen magnum integerrimum exstat in sinu Jedoënsi captum statura paulo graciliore  
quam icon Kieneriana refert.

*Pleurotoma Kaderleyi* Lischke (Surcula).

Malak. Bl. vol. 19. pag. 100. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 21. Tab. 1. fig. 1.

Sinus Jedoënsis.

*Pleurotoma Lühdorfi* Lischke.

Malak. Bl. vol. 19. pag. 100. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 23. Tab. 1. fig. 2. 3. 4.

Ad Genotas H. et A. Adams pertinet.

Sinus Jedoënsis.

*Pleurotoma fusca* Hombron et Jacquinot var.

Voy. au Pol. Sud. Zool. vol. 5. pag. 111. Tab. 25. figg. 19. 20. Smith Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 186.

Fretum Coreanum.

Species mihi incognita.

*Pleurotoma vertebrata* Smith.

Ann. Mag. etc. 1875. vol. 15. pag. 416. Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 186. Tab. 19. fig. 6. 6a.

Shikoku, Kiushiu.

*Pleurotoma Niponica* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 187. Tab. 19. fig. 7.

In iisdem locis.

*Pleurotoma difficilis* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 187. Tab. 19. fig. 8.

Species parvula 7 mill. longa.

Ins. Shikoku et Kiushiu.

**Pleurotoma triporeata Smith.**

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 188. Tab. 19. fig. 9.

Fretum Coreanum.

**Pleurotoma patruelis Smith.**

Ann. Mag. Nat. Hist. 1875. vol. 15. pag. 419. Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 188. Tab. 19. fig. 10.

Sinus Jedoënsis.

**Pleurotoma consimilis Smith.**

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 188. Tab. 19. fig. 11.

Species 18 mill. longa Pleurotomae Metcalfei Ang. cognata est.

Fretum Coreanum (et mare Sinense).

**Genus Drillia Gray.**

**Drillia flavidula Lam. (Pleurotoma).**

Anim. sans vert. ed. alt. vol. 10. pag. 346. Murex gibbosus Born Test. Mus. Caes. Vind. pag. 321. Tab. 11. figg. 12. 13. Chemn. Conch. Cab. vol. 11. pag. 112. Tab. 190. fig. 1829. 1830. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 25.

Specimina nostra Japonica minora sunt quamvis plane adulta. Specimina collectionis nostrae Sinensia aliarumque regionum duplo circiter maiora, ex parte colore vividiore excellunt.

**Drillia Sinensis Hinds.**

Proc. Zool. Soc. 1843. Pleurotoma Sinensis Reeve Conch. icon. Pleur. spec. 153.

Exemplar unicum adest zona albida notatum.

**Drillia Japonica Lischke.**

Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 32. Smith Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 191. Tab. 19. fig. 15.

Nagasaki.

**Drillia vidua Reeve (Pleurotoma).**

Proc. Zool. Soc. 1845. pag. 112. Conch. icon. Pleurotoma spec. 192. Clavus viduus H. et A. Adams Gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 91.

Specimina nostra Japonica ab icone Reeveana forma graciliore differunt; alterum est rubiginosum, alterum obscure fuscum.

**Drillia lanceolata Reeve (Pleurotoma).**

Conch. icon. spec. 182.

Specimen detritum adest.

**Drillia interrupta Lam. var. (Pleurotoma).**

Anim. sans vert. ed. 2. vol. 7. pag. 92. Reeve Conch. icon. Pleurotoma spec. 51. Dunker Moll. Jap. pag. 1.

Portus De-shimae.



*Drillia (Crassispira) striata* Kiener (*Pleurotoma*).

Iconogr. pag. 36. Tab. 14. fig. 2. Reeve Conch. icon. vol. 1. *Pleurotoma* spec. 144. *Pleurotoma* (*Clavatula*) *striata* Schrenck Amur. Moll. pag. 404.

Sinus de Castries (Nordmann).

*Drillia peradmirabilis* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 189. Tab. 19. fig. 2.

Fretum Coreanum.

*Drillia Nagasakiensis* Smith.

l. c. pag. 190. Tab. 19. fig. 13.

Species 17 mill. longa *Drilliae* (*Pleurotomae*) *pyramidulae* cognata est, sed peristomatis formatione praesertim differt. Conf. Conch. icon. vol. 1. spec. 260.

Nagasaki.

*Drillia longispira* Smith.

l. c. pag. 190. Tab. 19. fig. 14.

Species parva, angusta 16 mill. longa, oblique costata, fasciis fuscis interruptis cincta.

Fretum Coreanum.

*Drillia obliquata* Reeve (*Pleurotoma*).

Conch. icon. vol. 1. sp. 262. Smith l. c. pag. 191.

Shikoku, (litus Cylonicum, Singapore).

Clar. H. et Adams hanc testam *Belis* injunxerunt.

*Drillia subobliquata* Smith.

l. c. pag. 191. Tab. 19. fig. 16.

Antecedenti cognata, sed habitu minore, graciliore, costulis confertioribus inprimis differt.

Fretum Coreanum.

*Drillia candens* Smith.

l. c. pag. 192. Tab. 19. fig. 17.

Fretum Coreanum.

*Drillia raricostata* Smith.

l. c. pag. 192. Tab. 19. fig. 18.

Nagasaki.

*Drillia intermaculata* Smith.

l. c. pag. 193. Tab. 19. fig. 19.

Corea.

*Drillia humilis* Smith.

l. c. pag. 193. Tab. 19. fig. 20.

Fretum Coreanum.

*Drillia flavo-nodulosa* Smith.

l. c. pag. 194. Tab. 19. fig. 21.

Shikoku.

*Drillia inconstans* Smith.

Ann. et Mag. Nat. Hist. 1875.

Species mihi prorsus incognita, quantum scio nondum delineata est.

*Drillia fortilirata* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 194. Tab. 19. fig. 22.

Goto et Shikoku.

*Drillia subauriformis* Smith.

Tab. nostr. 4. fig. 5. 6. fig. 7 anfractus ultimus magn. aucta visus.

Testa gracilis subflava, ad suturam et basin fusco-fasciata, anfractibus 10—12 convexis sutura distincta divisis suboblique costatis et transversim striatis, inde plus minusve granosis instructa; nucleus corneus laevis et nitidus, costulae in anfractu ultimo 18—19; apertura subauriformis fusco-marginata; labrum ad suturam profunde sinuatum, externe incrassatum, interne obsolete sulcatum; columella transversim tenuiterque lirata. — Long. speciminum quae sunt adulta, 17 mill. eorumque diam. max. 5 mill.

Mare Japoniae.

Quamvis specimina nostra cum descriptione Smithiana (cfr. Proc. Zool. Soc. 1879 pag. 195 Tab. 19. fig. 23) non plane convenient, praesertim respectu habito staturae majoris et gracilioris, speciem tamen recte determinatam esse puto.

*Drillia texta* Dkr. (Defrancia).

Malak. Bl. 1859. vol. 6. pag. 225. Moll. Jap. pag. 2. Tab. 1. fig. 19. magn. aucta. E. A. Smith Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 195.

Portus De-shimae.

*Drillia gracilenta* Reeve var.

Pleurotoma gracilenta Conch. icon. spec. 114. var. = Pl. contracta Reeve l. c. spec. 116. var. = Pl. fusoides Reeve l. c. fig. 349. cfr. E. A. Smith Moll. from Japan in Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 195. Tab. 19. fig. 24.

Mare Japonicum.

Genus *Clathurella* Carpenter.

*Clathurella octangulata* Dkr. (Pleurotoma).

Malak. Bl. vol. 6. pag. 234. Moll. Jap. pag. 1. Tab. 1. fig. 8. (magn. aucta).

Portus De-shimae.

*Clathurella Leuckarti* Dkr. (*Mangilia*).

Malak. Bl. vol. 6. pag. 228. Moll. Jap. pag. 2. Tab. 1. fig. 1. (magn. aucta).

*Portus De-shimae*.

*Clathurella crassilabrum* Reeve (*Pleurotoma*).

Conch. icon. Pleurot. spec. 118.

Hakodate (Albrecht), Insulae Philippinae (H. Cuming).

**Genus Lachesis Risso.**

*Lachesis Japonica* A. Adams.

Ann. et Mag. Nat. Hist. 1860. pag. 411. E. A. Smith Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 198. Tab. 20. fig. 29.

Mino-shima Adams, fretum Coreanum Smith.

Species elegantissima regulariter cancellata genus Monfortianum Phos in mentem reducit.

Ad hoc tempus maxima sui generis est.

**Genus Clavatula Lam.**

*Clavatula virginea* Valenc.

Kiener Iconogr. pag. 55. Tab. 21. fig. 3. non Pl. viriginea Beck M. S. apud Reeve Conch. icon. sp. 32. Schrenck Amurl. Moll. pag. 408.

Hakodate (Lindholm).

*Clavatula erosa* Schrenck (*Pleurotoma*).

Amurl. Moll. pag. 405. Tab. 17. fig. 5—7.

Sinus de Castries (Schrenck), fretum Tataricum (Lindholm).

**Genus Daphnella Hinds.**

*Daphnella fuscolineata* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 196. Tab. 19. fig. 26.

Insula Shikoku.

*Daphnella subzonata* Smith.

l. c. pag. 197. Tab. 19. fig. 27.

Cum specie antecedente invenitur.

Hanc et speciem antecedentem clar. Smith. Daphnellis adnumeravit cum signo quidem interrogationis; mea opinione sunt species Daphnellarum typicae. Ceteroquin vero species Pleurotomaceorum singulae ob earum naturam ambiguam in sectiones suas aptas difficile distribuuntur.

Dunker, Moll. Jap. mar.

**?Daphnella saturata** Reeve (Pleurotoma).

Conch. icon. vol. 1. spec. 213.

Kiushiu. Ins. Philippinae (H. Cuming.)

**Daphnella fragilis** Reeve var. (Pleurotoma).

Conch. icon. spec. 179. var. = *Pleur. lymnaeaeformis* Reeve non Kiener. Smith l. c. pag. 198.

**Daphnella lactea** Reeve (Pleurotoma).

Conch. icon. vol. 1. Pleurotoma spec. 123. Pleurotoma (*Clavatula*) *lactea* Schrenck Amurl.  
Moll. pag. 405.

Fretum Tataricum (Lindholm), Insulae Philippinae (H. Cuming).

**Genus Mangilia** Risso.

**Mangilia pygmaea** Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 228. Moll. Jap. pag. 2. Tab. 1. fig. 8. (magn. aucta).

Portus De-shimae.

**Mangilia costulata** Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 227. Moll. Jap. pag. 3. Tab. 1. fig. 20. (magn. aucta).

Portus De-shimae.

**Mangilia Deshayesii** Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 228. Moll. Jap. pag. 3. Tab. 1. fig. 3. (magn. aucta).

Portus De-shimae.

**Mangilia robusticostata** Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 198. Tab. 19. fig. 28.

Mare Japonicum.

Hanc speciem pro habitu *Belis* adnumeraverim, pariter ac *Drilliam* candentem antea commemoratam.

**Mangilia splendida** A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1867 pag. 309. Tab. 19. fig. 24.

Insula Goto.

„Maxima et pulcherrima generis species.“

**Genus Zafra** A. Adams.

**Zafra mitraeformis** A. Ad.

Ann. et Mag. Nat. Hist. Nov. 1869 pag. 332.

Mino-shima.

Hoc genus Adamsianum in Pleurotomam Guarani d'Orbigny (Voy. dans l'Amér. mér. pag. 445. Tab. 77. fig. 13. 14.) aliasque formas similes in Conch. icon. Tab. 39. depictas fundatum est. Testae huc pertinentes parvulae valde singulares a clar. d'Orbigny in profundo maris Indiae occidentalis captae sunt. Mangiliis cognatae esse videntur.

## Tritoniacea.

In disponendis Tritoniaceorum aliorumque Molluscorum testis multa nomina obsoleta, ex parte ridenda, jam diu oblivioni tradita — ex. gr. illa, quae Kleinius in Tentamine suo variis cochleis imposuit — recentiore tempore a scriptoribus nonnullis e tenebris protracta sunt, minime quidem in usum disciplinae nostrae. Nomina ista plerumque nullius sunt momenti ad studium conchyliologicum, cum haec genera sic dicta saepius sint ambigua vel pervaria genera uno eodemque nomine generico conjuncta reperiantur. Saepissime quoque contra regulas nomenclaturae formata sunt, ne dicam de multis nominibus ineptis, quibus jus prioritatis vindicari nequit. Hanc ob causam Tritoniacea sensu Lamarckiano sumpsî Ranellas adjungens.

Numerus specierum quae hic sequuntur, haud exiguus e Mari Japonico hodie innotuit.

### Genus Tritonium Link \*).

*Tritonium nodiferum* Lam. var.

Ad hanc speciem variabilem lateque dispersam, sed pristino tempore e mari Mediterraneo tantum notam, sine dubio Triton Sauliae Reevei pertinet. Specimen minus a clar. J. Rein. lectum exstat vivide picturatum cum icone Reeveana spec. 17 omnino conveniens.

Clar. Lischke (Moll. Jap. vol. 1. pag. 45 et vol. 2 pag. 33. Tab. 1. et 2) de hac cochlea uberrime jam disseruit.

Novissimo tempore clar. E. Satow specimina plura pulcherrima epidermide membranacea obducta cum operculis misit. Minora ex parte valde sunt ponderosa. Pulli rosei vel carnosi, costulis transversis subgranosis sculpti. Apex anfractibus constat 4—5 embryonalibus laevissimis ac nitidis, spira regulari acutiuscula terminatus. In speciminibus adultis apex semper est truncatus vel erosus.

### *Tritonium Tritonis Rumphii* (Buccinum).

*Buccinum Tritonis Rumphii* Mus. Tab. 28. fig. B. (icon sinistrorsa). Lin. Syst. Nat. ed. 12. pag. 1222. „Testa ventricosa oblonga laevi, anfractibus rotundatis, apertura dentata, cauda brevi.“  
*Lampusia Tritonis* Schum. Nouv. syst. pag. 250. Triton variegatum Lam. anim. sans vert. vol. 9. pag. 623.

Linnaeus sine dubio hanc cochleam cum Tritonio magno Antillarum et cum T. nodifero Lamarckii commutavit ut ex his verbis elucet: Habitat in Archipelago, America. In Oriente et Africa etiam hodie pro cornu militari a pastoribus usurpatur vehementiori sono, quam tubae stentoreae vulgaris aut cornu capri. Buccina jam priscos cogebat ad arma Quirites. Pariter et

---

\*) *Tritonium* Link 1807 = *Triton* Montfort 1810. *Triton* Lin. 1767. Genus *Cirripedum*. *Triton* Laur. Genus *Amphibiorum*.

clar. Reeve in describenda hac cochlea Tritonium Antillarum magnum (Tritonium nobile Contr., quod Tritonium commutatum quondam nominaveram), pro varietate habet.

Duo specimina exstant Japonica alterum magnum adultum, alterum juvenile vix 115 mill. longum.

*Tritonium Parthenopes* Salis (Murex).

Reise ins Königr. Neapel pag. 370. Tab. 7. fig. 1. Tritonium olearium Lin. Murex ex parte = Murex costatus Born = Triton succinctus Lam. Trit. Americanum Orb. etc.

Species magnitudine et longitudinis et crassitudinis ratione variabilis. Specimen majusculum exstat Japonicum 93 mill. longum, sed multo majora usque ad 115 mill. longa inveniuntur, pari modo specimina parva et exigua quamvis sint perfecta et adulta.

Cum de cochlea nostra jam satis scripserint auctores, hic tamen imprimis laudanda sunt, quae clarissimi Weinkauff de Tritonio Parthenopeio (Conch. mediterr. vol. 2. pag. 77 et de Ranella gigantea Lam. ibid. pag. 70.) et Lischke de Tritonio oleario (Moll. Japon. vol. 1. pag. 48. vol. 2. pag. 34. et vol. 3. pag. 29.) dixerunt.

Sed restat, ut hoc loco pauca dicam de Tritonio meo Adansonii. Cum magnam huius cochleae copiam e remotissimis regionibus (Nova Hollandia, Brasilia, mari Siculo, e sinu Guineensi et ex Indiis) collocatam accuratius comparare et examinare mihi contigerit, Tritonium Adansonii (Muricem Argum fasciatum Chemnitzii, „Le Vojet“ Adansonii) pro varietate et quidem eximia nunc habeo, quae si formam pygmaeam non respicias, rostro tantummodo paululum brevius recto differt. Cfr. Dunker Mollusca Guineensia pag. 26 et 65.

*Tritonium pileare* Lin. (Murex).

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1217. Lampusia pilearis Schum. Triton pilearis Reeve Conch. icon. spec. 23.

Specimen minus exstat.

In insulis quoque Philippinis aliisque terris obvenit.

Apud Japanos haec cochlea „Mino hora“ vel „Kwan-u“ nominatur.

*Tritonium aquatile* Reeve.

Proc. Zool. Soc. 1844. pag. 114. Conch. icon. Triton. Tab. 7. fig. 24.

Prope Nagasaki (Lischke). Exstat in collectione Loebbeckeana Dusseldorpii.

Specimina nostra ex parte permagna e Philippinis insulis et Nova Caledonia originem ducunt.

*Tritonium lirostoma* A. Adams.

Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 4. vol. 5. pag. 419.

Simid-zu. A. Adams.

*Tritonium papillosum* A. Adams.

ibid. pag. 419.

Takano-shima. A. Adams.

*Tritonium nodiliratum* A. Adams.

ibid. pag. 419.

Mare Japonicum (Coll. Cumingiana).

*Tritonium tringa* A. Adams.

ibid. pag. 420.

Uraga.

*Tritonium labiosum* Wood.

Ind. Test. Suppl. Tab. 5. fig. 18. Reeve Conch. icon. Triton. spec. 52. = *Tritonium rutilum*  
Menke Moll. Novae Hollandiae pag. 25.

Uraga A. Adams.

Species parva late dispersa et in Antillis insulis obvia.

*Tritonium dorsuosum* A. Adams.

l. c. pag. 420.

Tatiyama.

*Tritonium lotorium* Lin. (*Murex*).

Mus. Lud. Ulr. pag. 301. Syst. Nat. ed. 10. pag. 631. ed. 12. pag. 1217. *Triton pyrum* Lam.  
(non Lin.)

Specimen Japonicum exstat pergrande 112 mill. longum.

Clar. Lamarck, Reeve, Lischke alique hanc speciem pro *Murice piro* Linnaei habent, sed Linnaeus ipse figuram B tabulae 26 in Rumphii Museo jam citavit, quae nostram speciem sine ullo dubio ostendit, si modo iconem in speculo inspicere volueris, nam haec tabula Rumphiana omnes figuras sinistrorsum pictas ostendit. Icon E in eadem tabula *Muricem pium* verum Linnaei exhibet. Clar. Mörch, vir ingenii acuti, jam antea (Cat. Conch. de Yoldi pag. 109.) speciem Linnaeanam recognovit.

*Tritonium Dunkeri* Lischke (*Triton*).

Jap. M. C. vol. 1. pag. 49. Tab. 3. fig. 1. 2.

Plura specimina ex Japonia nuperrime allata sunt notis praecipuis cum speciminibus Lischkeanis convenientia praesertim respectu habito aperturae. *Tritonio piro* Linnaei quidem peraffine, propria tamen species esse videtur. Specimina integra epidermide fusca foliacea obducta sunt. *Tritonium pium* semper est unicolorum obscure aurantium, *Tritonium* vero *Dunkeri* album castaneo-fasciatum ejusque apertura diversa.

*Tritonium exaratum* Reeve.

Conch. icon. vol. 2. spec. 50. a. b.

Prope Tokio et Nagasaki, nec non in litore Novae Hollandiae septentrionali.

Respectu habito sculpturae plane convenit cochlea nostra cum icone et descriptione Reeveanis, sed statura paullo gracilior est, canalis magis curvus. Conf. Lischke Jap. M. C. vol. 2. pag. 35. vol. 3. pag. 30. Tab. 2. fig. 15—17.

*Tritonium Loebbeckei* Lischke.

Mal. Bl. 1870. pag. 23. Jap. M. C. vol. 2. pag. 36. Tab. 4. fig. 13. 14.

Nagasaki.

Unum specimen adultum exstat in Museo Loebbeckeano Dusseldorpino, duo juvenilia in nostra collectione asservantur.

*Tritonium moritinctum* Reeve.

Proc. Zool. Soc. 1844. Conch. icon. Triton spec. 49.

Tatiyama. (A. Adams l. l. pag. 420.) Pariter in litore Africae occidentali et in Philippinis insulis obvenit.

*Tritonium reticosum* A. Adams.

Ann. Mag. Nat. Hist. 1870. pag. 420.

Testa ovato-fusiformis, fulva, maculis sparsis rufescentibus tincta, anfractibus septenis convexis transversim aequaliterque liratis, ultimo spira brevior instructa; plicae rotundatae distantes; apertura anguste ovata; labium transversim rugoso-plicatum; canalis brevis rectus oblique truncatus; labrum intus fortiter liratum, extus varice crasso instructum.

Mare Japonicum. Non exstat in collectione.

*Tritonium clandestinum* Chemn. (Murex).

Chemn. Conch. Cab. vol. 11. Tab. 193. fig. 1856. 1857. Reeve Conch. syst. vol. 2. pag. 197. Tab. 243. fig. 2. Conch. icon. Triton. spec. 13. Kiener Coq. viv. pag. 35. Tab. 11. fig. 2.

Haec species a clar. H. et A. Adams fratribus (gen. of rec. Moll.) cum *Lagenis juncta*, anfractibus costisque regularibus rotundatis et varice deficiente vel rarius unico excellit.

In insula Mauriti et in Philippinis obvenit fide H. Cuming. Specimina Japonica exstant duo pulcherrima, alterum evaricosum, alterum varice unico instructum.

Inter Tritoniorum permultas species fossiles e tellure tertiaria hucusque notas *Murex piraster Lamarckii*, qui ad Tritonia pertinet, proximus est.

*Tritonium Oregonense* Redfield.

Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York. 1846. vol. 4. pag. 165. Tab. 11. fig. 2. a. b. *Fusus cancellatus* Reeve Conch. icon. spec. 62. *Tritonium (Lagena) Oregonense* H. et A. Adams Gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 104.

Specimen adest unicum epidermide denudatum. Conferantur ea, quae de hac specie et de Tritonio cancellato vero fusius disseruit clar. Lischke in Moll. Jap. vol. 2. pag. 166. et vol. 3. pag. 31.

*Tritonium reticulare* Lin. (Murex).

Mus. Lud. Ulr. Reg. pag. 632. Martini Conch. Cab. vol. 2. pag. 85. Tab. 41. fig. 405. 406. *Triton clathratus* Lam. anim. sans vert. vol. 9. pag. 637.

Specimen minus exstat in collectione Moll. Jap. sine indicatione certa loci natalis.

In Museo quidem Lud. Ulr. pag. 632 ad cochleam nostram Rumphii Mus. Tab. 29. figura N. falso citata est, quae *Muricem senticosum* Linnaei repraesentare videtur, sed e descriptione satis elucet Linnaeum cochleam, de qua hic est sermo, denotare voluisse. Saepius commixta est cum speciebus cognatis, etiam cum ipso *Muriceano* Linnaei. Mirum mihi videtur quod Lamarckius alique scriptores hanc speciem Linnaeanam insignem et vulgatam plane omiserunt.

*Tritonium decipiens* Reeve.

Conch. icon. spec. 102.

Insulae Philippinae (Cuming).

Specimen adest Japonicum epidermide holoserica obductum Tritonio decipienti aliqua ex parte respondens, quod vero pro varietate tantum praecedentis declaraverim.



*Tritonium lampas* Lin. (*Murex*) var.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 748. *Lampas hians* Schum. Nouv. Syst. pag. 252. Reevei Conch. icon. vol. 2. Tab. 10. fig. 30. b.

Species magnitudine, sculptura et colore pervariabilis.

Specimina a clar. Rein lecta tuberculis cornutis, columella vix plicata paene laevi rubicunda, labro obsolete plicato pariter rubicundo et faucibus lacteis excellunt. In testis quibusdam tuberculi cavati et vesiculosi. Testae ejusmodi structurae et in Mari rubro obveniunt. Specimen maximum 155 mill. altum est. Forma typica tuberculis minoribus sed sculptura asperiore rugosa atque granosa multo major fit.

*Tritonium ranelloides* Reeve.

Proc. Zool. Soc. 1844. Conch. icon. Triton spec. 10.

Kiusiu Lischke, Philippinae insulae Cuming.

Species inter Tritonia et Ranellas intermedia.

**Genus *Ranella* Lam.**

*Ranella granifera* Lam.

Anim. sans vert. vol. 9. pag. 548. Mart. Conch. Cab. vol. 4. pag. 78. figg. 1224—1227.

Specimen minus vivide pictum in Japonia lectum est.

*Ranella subgranosa* Beck.

Sowerby Conch. Ill. *Ranella* fig. 18. Reeve Conch. icon. spec. 1. = *Ranella Beckii* Kien. Coq. viv.

Seto-uchi A. Adams.

Specimen minusculum exstat inter Mollusca Japonica. Haec species in insulis Philippinis haud rara est.

*Ranella bufo* Chemn. (*Murex*).

Tab. nostra 5. fig. 3. 4. var.

Conch. Cab. vol. 11. pag. 120. figg. 1845. 1846. *Murex bufonius* Gmel. Syst. Nat. pag. 3534.

Specimen ponderosum exstat. Specimen alterum ex insula Kiusiu depictum est, flavidum, zonis fuscis vividis signatum, sculptura minus aspera ceteroquin cum forma normali conveniens. Ad collectionem Loebbeckei Dusseldorpini pertinet.

*Ranella rana* Lin. (*Murex*).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 748. *Ranella albivaricosa* Reeve Conch. icon. vol. 2. spec. 2.

Specimina plane conveniunt cum sinensibus. *Ranella albivaricosa* vix pro varietate breviori haberi potest.

*Ranella tuberculata* Brod.

Proc. Zool. Soc. 1832. Reeve Conch. icon. spec. 36. = *olivator* Meuschen = *Gyrineum natator* (Trit.) Bolt. teste Mörch. Cat. Conch. Yoldi pag. 106. *Argobuccinum olivator* A. Adams l. c. pag. 421.

Plura specimina minora lecta sunt.

**Ranella lamellosa Dkr. (Bursa).**

Conf. Species nonnullae Bursarum collectionis Cumingianae in Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 240.

Nunc exstat in Museo Britannico.

**Ranella perca Perry (Biplex).**

Conch. Tab. 4. fig. 5. *Ranella pulchra* Gray in Sow. Conch. Ill. fig. 19. Kien Icon. coq. viv.

Tab. 6. fig. 1. Reeve Conch. icon. spec. 47. Desh. in Lam. anim. s. vert. vol. IX. pag. 556.

Plura huius cochleae specimina Japonica ante oculos habeo. H. Cumingio teste et in Philip-  
pinis insulis invenitur.

Quod attinet ad nodos, satis variat testa, cum ejus anfractus sutura profunda sejuncti  
duas tantummodo costas longitudinales nodosas striis costulisque transversis decussatas ferant, ex  
altera vero parte specimina inveniantur costis transversis majoribus granosis margaritarum lineis  
similibus cincta. Pariter varices, pinnarum instar extensi, variabiles sunt. In superiore aperturae  
parte tuberculi nonnulli irregulares conspiciuntur varicis penultimi particulam indicantes. — Oper-  
culum corneum ovatum superne acutum toto habitu Tritoniaceis respondet. Haec cochlea mirabilis ubi  
integra invenitur, epidermide tenui fusca vestita est. Japoni eam „Matsukasa-gahi“ vel „Momiji-  
gahi“ appellant. Ad Eupleuras fratrum H. et A. Adams pertinet.

Clar. Jousseaume Med. Dr. in „Le Naturaliste“ m. Apr. a. 1879. pag. 5 non solum genus  
*Biplex* Perry adoptavit, sed etiam *Ranellam* percam Perry et *Ranellam* pulchram Sow. pro speciebus  
diversis declaravit.

**Buccinea.**

**Genus Buccinum Lin.**

**Buccinum undatum Lin.**

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1204. A. Adams Ann. and Mag. Nat. Hist. m. Jun. 1870. pag. 421.

Sinus prope Aniwa, sinus Tataricus.

Haec species vulgatissima late dispersa pro loco natali maximopere variat tam forma quam  
sculptura, ita ut varietates quaedam nominibus propriis impositae sint, ex. gr. *Buccinum* Labra-  
dorensis Reeve (Conch. icon. spec. 5.), *B. pyramidale* Reeve (ibid. spec. 104.), *B. Schantaricum*  
Schrenck. Praeterea ad hanc speciem nomina antiquiora *B. vulgare* Da Costa, *B. striatum* Pennant  
et *B. solutum* Dillw. pertinent.

**Buccinum leucostoma Lischke.**

Malak. Bl. vol. 19. pag. 101. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 38. Tab. 1. fig. 7. 8.

Specimen originale prope Jedo lectum in collectione Molluscorum Loebbeckeana exstat.

**Buccinum Japonicum A. Adams.**

Ann. and. Mag. Nat. Hist. m. Aug. 1861. pag. 135.

Okosiri, mare Japonicum.

Species parva, sed exquisita, pollicem circiter longa, testa fragili instructa.

**Buccinum glaciale Lin.**

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1204. Tritonium glaciale Müll. Buccinum angulosum Gray Beech. Voy. pag. 127. Tab. 36. fig. 6. Ins. Saghalien, in sinu Aniwaë etc. A. Adams Ann. and Mag. Nat. Hist. 1870. pag. 421.

Collectio nostra unum specimien continet e mari Japonico sine certa quidem loci natalis indicatione.

**Buccinum Ochotense Middend.**

Reise in Sibir. vol. 1. pag. 235. Tab. 9. fig. 5. Tab. 10. fig. 1. 2.

Ins. (Saghalien).

**Genus Volutharpa Fischer.**

**Volutharpa Perryi Jay (Bullia).**

Report on the Shells coll. by the Japan Exped. under the command of Commodore Perry 1856. pag. 295. Tab. 5. figg. 13—15.

Plura specimina exstant in sinu Jedoënsi capta; maximum 43 mill. longum est.

Testa ovata, tenuis, inflata, anfractibus senis subito dilatatis instructa; spira quinquies gyrata transversim tenuiterque striata quintam tantum totius longitudinis partem tenens; color fundi sordide albus vel rubescens strigis pallide rufis variegatus; epidermis holoserica caduca.

Animal album capite, pede et siphone magno maculis nigris sparsis pictum, Buccino Linnaei (Tritonio Müll.) tam analogum et simile est, ut crediderim Volutharpam non pro genere proprio, sed potius pro divisione tantum generis Buccini habendam esse.

Species reliquae hucusque descriptae hae sunt:

**Volutharpa ampullacea Middend. (Bullia).**

Sib. Reise vol. 2. Wirbell. Thiere 1851. Tab. 17. fig. 3. 4.

**Volutharpa Deshayesiana Fischer.**

Journ. de Conch. vol. 5. 1856. pag. 85. Tab. 3. fig. 8. 9.

**Volutharpa Mörchiana Fischer.**

Journ. de Conch. vol. 7. 1858. pag. 299. Tab. 10. fig. 2.

Tota testa costis transversis insignis est.

**Volutharpa Linnaeana A. Adams (Bullia).**

Ann. and Mag. Nat. Hist. 1860. pag. 109.

**Volutharpa Fischeriana A. Adams.**

Ann. and Mag. Nat. Hist. 1870. pag. 422.

Omnes hae species mari Japonico propriae esse videntur. Cum vero harum testarum major copia mihi non fuerit in promptu, de omnibus certe dijudicare nequeo. Conferantur quae de Volutharpa in Journ. de Conch. 1858. pag. 40. exposuit clar. Mörch; pariter A. Adams in Ann. and Mag. Nat. Hist. 1860 pag. 109. ubi de incola testae disseruit. — Volutharpam Perryi Japoni „Seko-gai“ nominant.

Dunker, Moll. Jap. mar.

## Nassacea.

### Genus Eburna Lamarck.

#### Eburna Japonica Reeve.

Proc. Zool. Soc. 1842. pag. 20. Conch. icon. Eburna spec. 3. Dunker Moll. Jap. pag. 8.

De-shima, Nagasaki, Sado etc.

Plura specimina adulta et juvenilia huius cochleae vulgaris tegumento dense sericeo firmo obtectae clar. J. Rein reportavit. De incola testae conf. A. Adams in Ann. et Mag. Febr. 1864. pag. 142. „Chi-Kusa-gai“ Japonorum.

### Genus Phos Montfort.

#### Phos senticosus Lin. (Murex).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 751. ed. 12. pag. 1220. „Testa ecaudata subturrita longitudinaliter costata, transversim cancellata; apertura striata. Collumellae plica una alterave.“ Lamarck anim. sans vert. ed. alt. vol. 9. pag. 406. Sowerby Thes. Conch. fig. 8—11.

Specimen exstat sculptura quam solet minus aspera.

#### Phos varicosus Gould.

Proc. Boston Soc. Nat. Hist. vol. 3. pag. 143. Otia Conch. pag. 66. Exped. Sh. pag. 66. Un. States Expl. Exp. Moll. pag. 507. Tab. 20. fig. 360.

Tria specimina exstant alba, fusco-variegata vel fasciis rubiginosis cincta. Costae longitudinales sublamellosae ex parte crassiores sunt varicum instar.

### Genus Desmoulea Gray.

Duas huius generis species a Nassis separati ex Japonia quondam attulit clar. Siebold:

#### Desmouleam Japonicam A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 113. Reeve Conch. icon. spec. 192. et

#### Desmouleam crassam A. Adams.

ibid. vel ponderosam Reevei Conch. icon. spec. 196.,

in nostra quidem collectione utraque species deest. Species huius generis circiter octo hodie innotuerunt viventes, pariter nonnullae fossiles e tellure tertiaria.

Ad nomen genericum quod attinet, auctor antea scripserat Demoulia, certe vocabulum corruptum ut multa nomina Grayana Molluscorum testis imposita. Sine dubio Desmoulinsia scribendum est, cum hoc genus in honorem clar. Desmoulins nominatum sit.

### Genus Nassa Martini.

#### Nassa balteata Lischke.

Jap. M. C. vol. 1. pag. 61. Tab. 5. fig. 10. 11. nec N. balteata H. Pease.

Inter plura specimina decolorata et adesa unum exstat integerrimum.

Haec species, quod pertinet ad habitum ejus generalem, Nassae mutabili Linnaei e mari

Mediterraneo admodum affinis est, quam clar. A. Adams in indice suo (Ann. Mag. Nat. Hist. 1870. pag. 425.) protulit; itaque non multum abest quin credam auctorem hanc nostram cochleā ante oculos habuisse.

*Nassa Thersites* Bruguière (Buccinum).

Enc. méth. Tab. 394. fig. 8. *Nassa Thersites* Lamarck. anim. sans vert. vol. 10. pag. 180.  
Reeve Conch. *Nassa* spec. 65. *Arcularia Thersites* H. et A. Adams Gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 118.

Specimen minus Japonicum adest.

Haec species dorso valde gibbo insignis, in mari Asiatico late diffusa, magnitudine maximopere variat. Specimina nostrae collectionis maxima 22 mill. longa sunt, minima vix 10 mill. Nonnulla fascia fusca dorsali notata sunt.

*Nassa Glans* Lin. (Buccinum).

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1200. Rumphii Mus. Tab. 29. fig. P. (omnes huius Tabulae icones sinistrorsae).  
Kiener Coq. viv. Tab. 10. fig. 52. Reeve Conch. icon. *Nassa* spec. 5. *Alectryon Glans* H. et A. Adams Rec. Moll. vol. 1. pag. 118. (male scribitur *Alectryon*).

Fretum Coreanum. E. A. Smith.

In collectione nostra Molluscorum Japonicorum specimen integerrimum nitidum exstat varietatis minoris sutura canaliculata, spira subgradata magis exserta et aperturae formatione *Nassae* suturali Lam. affine, ita ut inter utramque speciem intermedium appareat.

*Nassa caelata* A. Adams (Niotha).

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 97. Reeve Conch. icon. spec. 133.

Specimen Japonicum unum exstat.

Philippinae insulae (H. Cuming).

*Nassa gemmulata* Lam. (Buccinum).

Anim. sans vert. vol. 10. pag. 169. *Buccinum arcularia papillosa* Chemn. Conch. Cab. vol. 10. pag. 201. fig. 1474. (specimen minus haud adultum). *Buccinum clathratum* Enc. méth. Reeve Conch. syst. vol. 2. pag. 237. Tab. 169. fig. 4. Conch. icon. *Nassa* spec. 29.

Specimina maris rubri haud differunt a nostris Japonicis. Plerumque testa costis crassis regulariter nodosis instructa est; nodi in speciminibus quibusdam subquadrati, interdum globosi, ita ut cochlea margaritis ornata videatur. Species magnitudine et habitu variabilis, ad *Niothas* Adamsii pertinet.

*Nassa Siquijorensis* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 97. Reeve Conch. icon. fig. 53. a. b. A. Adams Ann. and Mag. Nat. Hist. 1870. vol. 5. pag. 425. (Zeuxis). E. A. Smith Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 210. Tab. 20. fig. 45. 45 a.

Seto-uchi (Adams).

*Nassa livescens* Phil. (Buccinum).

Zeitschr. für Mal. 1848. pag. 135. Dunker Moll. Jap. pag. 7.

Portus De-shimae, Mare Sinense, litus Javanum, Philippinae insulae.

*Nassa marginulata* Lamarck (Buccinum).

\* Anim. sans vert. vol. 10. pag. 182. Reeve Conch. icon. *Nassa* spec. 43.

Haec cochlea plerumque fasciis duabus latis fuscis cincta est; tuberculorum series suprema ceteris magis prominere solet; columella in testis adultis valde callosa; labrum lacteum incrassatum, imo saepius varicosum, intus sulcatum fasciis translucetibus.

Reeveus Lamarckium secutus, mare Mediterraneum tanquam patriam notavit, errore captus, est enim cochleola species Indica. Specimina pleraque nostrae collectionis e Mari Sinensi allata sunt.

*Nassa stigmata* A. Adams (Niotha).

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 96. Reeve Conch. icon. spec. 42. E. A. Smith Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 211.

Fretum Coreanum. Insulae Philippinae.

Species habitu admodum variabilis. Clar. Smith affirmante etiam *N. dense granata* A. Ad. huc pertinet.

*Nassa gemmulifera* A. Adams (Niotha).

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 99. Ann. Mag. Nat. Hist. 1870. pag. 425.

Seto-uchi etc. Philippinae insulae (H. Cuming).

Inter Mollusca Japonica haec species non exstat.

*Nassa Cumingii* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 98. Ann. Mag. Nat. Hist. 1870. pag. 425. (Niotha). Reeve Conch. icon. spec. 30. (China).

Takano-shima etc.

In nostra collectione deest.

*Nassa luctuosa* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 105. Reeve Conch. icon. *Nassa* spec. 109. *Telasco luctuosa* H. et A. Adams gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 119.

Unicum specimen exstat.

Haec species plerumque unicolor purpureo-nigra vel fusca, rarius fasciis albo-punctulatis cincta, in insulis quoque Philippinis invenitur.

*Nassa Japonica* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 110. Cfr. Lischke Moll. Jap. vol. 3. pag. 37. Tab. 2. fig. 20—23.

Plura specimina exstant. Ad *Caesias* pertinet H. et A. Adams gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 120.

*Nassa acutidentata* (Hima) Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 212. Tab. 20. fig. 46.

Uku-shima, Fretum Coreanum.

Species *Nassae Japonicae* affinis, sed forma brevior, anfractuum numero minore nec non aperturae formatione satis diversa.

*Nassa luteola* (Hima) Smith.

l. c. Tab. 20. fig. 47.

Insula Goto.

Species mihi aliquantulum dubiosa.

*Nassa festiva* Powis.

Proc. Zool. Soc. 1835. pag. 95. *Nassa lirata* Dkr. Moll. Jap. pag. 7. Tab. 1. fig. 22. (non lineata, ut clar. Adams ait). *Tritia festiva* Adams l. c. pag. 426. Hima Gen. of rec. Mollusca vol. 1. pag. 121.

Hanc speciem nomine *Nassae liratae* quondam descripsi opinione ductus cochleolam Japonicam propter minorem ejus staturam et patriam valde remotam a *Nassa festiva* ex Isthmo Panamensi disjungendam esse, sed quo tempore specimina plura comparare licuit, non dubito quin cochleam Japonicam pro varietate tantum minore forma picturaque variabilem habeam.

*Nassa dermestina* Gould?

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 7. pag. 331.

Specimen minusculum *Nassae* cujusdam decoloratum et detritum inter Mollusca a clar. Rein ex Japonia reportata fortasse huc pertinet. Cfr. Lischke Jap. M. C. vol. 1. pag. 60.

*Nassa muricata* Quoy et Gaimard (Buccinum).

Voy. de l'Astr. Tab. 32. fig. 32. 33. A. Adams Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 101. *Hebra muricata* A. Adams Ann. Mag. Nat. Hist. 1870. pag. 426.

Oki-no-shima. A. Adams.

Specimen Japonicum jam prius mecum communicatum exstat, praeterea ex Philippinis insulis haec species venusta nota est.

*Nassa fraterculus* Dunker.

Moll. Jap. pag. 7. Tab. 1. fig. 15. magn. aucta. Lischke Jap. M. C. vol. 1. pag. 60. vol. 2. pag. 54. *Nassa plebecula* Gould Proc. Boston Soc. Nat. Hist. vol. 7. pag. 332. Hima fraterculus A. Adams Ann. Mag. Nat. Hist. 1870. pag. 426.

Plura specimina habitu et pictura paulum variantia denuo lecta sunt.

*Nassa succincta* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 107. Reeve Conch. icon. vol. 8. spec. 80. *Zeuxis succincta* H. et A. Adams Gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 119.

Unum specimen vix 12 mill. longum exstat paulum decoloratum.

Testa-ovato-turrita cinerascens, fasciis duabus fuscis succincta, anfractibus 8 planulatis sutura paene canaliculata sejunctis instructa, supremis dense plicatis transversimque striatis, ergo cancellatis, reliquis laevibus, ultimo spira paululum minore in fronte lirato; columella alba dentato-rugosa; labrum postice inflexum, antice dentatum et sinuatum, intus sulcatum extrinsecus varicosum.

Specimina reliqua collectionis meae multo majora e Philippinis insulis originem ducunt.

**Nassa gracilis Pease.**

Amer. Journ. of Conch. vol. 3. 1867. pag. 273. Tab. 23. fig. 4. Conf. Lischke Jap. M. C. vol. 2. pag. 52. Tab. 4. fig. 4. 5. 6.

Specimen in portu De-shimae quondam collectum, detritum et decoloratum; pro varietate Nassae globosae graciliore haud gibbosa habui (Conf. libellum meum de Molluscis Japonicis pag. 6). Plura specimina integerrima clar. Lischke posterius accepit, quae docent, cochleam nostram certe ad Nassam gracilem pertinere. Nuperrime hanc speciem etiam clar. J. Rein ex Japonia reportavit.

Praeterea A. Adamsius in indice suo saepius laudato hasce Nassarum species Japonicas enumeravit:

**Nassam variciferam A. Adams.**

(Zeuxin) pag. 425. Reeve Conch. icon. spec. 118.

**Nassam micantem A. Adams.**

(Zeuxin) ibid. pag. 426.

**Nassam clandestinam A. Adams.**

(Zeuxin) ibid. testam mihi adhuc dubiam.

**Genus Nassaria Link.**

**Nassaria magnifica Lischke.**

2/ Malak. Bl. vol. 18. pag. 147. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 38. Tab. 4. fig. 11. 12. vol. 3. pag. 32. Tab. 1. fig. 5. 6. (var.)

Species insignis in litore insulae Kiushiu lecta est.

**Genus Cyllene Gray.**

Nostra Molluscorum Japonicorum collectio ne unam quidem huius generis speciem continet. At vero clar. A. Adams in Ann. Mag. Nat. Hist. 1870. pag. 427. has quinque Cyllenes species Japonicas ab ipso observatas atque collectas annotavit:

**Cyllenen pulchellam Ad. et Reeve.**

Zool. Voy. Sam. Tab. 10. fig. 11. Sow. Thes. Conch. (Cyllene) fig. 24. 25.

Satanomi-saki.

**Cyllenen orientalem A. Adams.**

Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 205.

Goto, (Singapore, Malacca).

**Cyllenen glabrata A. Adams.**

ibid. pag. 206.

Satanomi-saki.

**Cyllenen fuscata A. Adams.**

ibid. pag. 205. Sow. Thes. Conch. fig. 16—18.

Kuro-shima.

**Cyllenen gibbam A. Adams.**

Ann. Mag. Nat. Hist. 1870. pag. 427.

Oki-no-shima.



## Purpuracea.

### Genus *Purpura* Lamarekii, non veterum scriptorum.

#### *Purpura Rudolphi* Chemn. (Buccinum).

Conch. Cab. vol. 10. pag. 196. Tab. 154. figg. 1467. 1468. Kien. Iconogr. pag. 95. Tab. 25. fig. 68.  
Reeve Conch. icon. Purp. sp. 10.

Specimen minus lectum est.

Haec cochlea in Philippinis et Amboinis insulis haud raro obvenit. In collectione mea Molluscorum varietas exstat paene enodis.

In indice Adamsiano (Ann. Mag. Nat. Hist. vol. 5. 1870.) haec species desideratur.

#### *Purpura luteostoma* Chemn. (Buccinum).

Conch. Cab. vol. 11. pag. 83. fig. 1800. 1801. Dunker Moll. Jap. pag. 5. Lischke Jap. M. C. vol. 1. pag. 54.

Specimina tantum juniora exstant.

Hanc cochleam e mari Sinensi et pacifico satis cognitam Chemnitzius bene designavit hisce verbis: Testa tuberculata, cingulis quatuor muricato-nodosis, in primo anfractu — qui nobis est ultimus — duobus in spirae gyrationibus armata, transversim dense sulcata, striata; apertura ovata, ore lutescente, labro intus striato, labio planiusculo.

#### *Purpura Bronni* Dkr.

Mal. Bl. vol. 6. pag. 235. Moll. Jap. pag. 5. Tab. 1. fig. 23. Lischke Jap. M. C. vol. 1. pag. 53. Tab. 5. fig. 17. vol. 2. pag. 39. Tab. 4. fig. 20.

Plura specimina exstant adulta et illaesa a clar. J. Rein lecta omnibus notis jam antea commemoratis respondentia. Cochlea nostra nodorum formatione et sculptura singulari facile distingui potest ab antecedente. Clar. A. Adams eam adeo sectioni *Purpurae tumulosae* Reevei adjunxit. Incola testae succo languido excellit, qui sensim in colorem vivide purpureum mutatur.

#### *Purpura marginata* Blainv.

Nouv. Ann. du Mus. vol. 1. pag. 218. Tab. 10. fig. 1. *P. atro-marginata* Blainv. Lam. anim. sans vert. ed. 2. vol. 10. pag. 91. = *Purp. cancellata* Kien. Iconogr. Tab. 7. fig. 16. cfr. Schrenk Amurl. Moll. pag. 394.

Hakodate.

#### *Purpura echinata* Blainville.

Nouv. Ann. du Mus. Tab. 11. fig. 2. Reeve Conch. icon. *Purpura spec.* 33. Dunker Moll. Jap. pag. 5. *Thalessa echinata* H. et A. Adams Gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 127.

Specimen denuo lectum exstat Serpulis, Vermiliis aliisque testis obductum.

De-shima, Nagasaki etc.

Praeterea Clar. A. Adams Ann. Mag. Nat. Hist. vol. 5. pag. 422. *Purpuram* (Stramonitam) haemastoma Linnaei aequae ac Schrenkio auctore *Purpuram undatam* Lamarekii inter cochleas Japonicas enumeravit, sed vix crediderim Buccinum haemastoma Linnaei verum aequae ac *Purpuram undatam* Maris Japonici incolas esse. Clar. auctor cum hac *Purpuram rusticam* Lam. conjunxit, quae vero plurimum differre mihi videtur.

*Purpura alveolata* Reeve.

Conch. icon. vol. 3. spec. 60.

Plura specimina prope Nagasaki aliisque Japoniae locis lecta exstant.

Purpuram clavigeram Küsteri, quam clar. Lischke (Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 54) uberrime tractavit, pro varietate tantum *Purpurae alveolatae* habeo multis exemplaribus iterum iterumque comparatis. In indice meo Moll. Jap. pag. 5. hanc cochleam pro *Purpura tumulosa* Reevei enumeravi. Non longe absum quin credam hanc speciem Reeveanam nil nisi varietatem eximiam repraesentare.

*Purpura Lapillus* Lin. (*Buccinum*) var.

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1202.

Clar. de Middendorff (Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens vol. 1. pag. 219.) cochleam nostram pro varietate frequentissima illius *Purpurae* declaravit, quae Deshayesio est *Purpura Freycineti*. Negari quidem nequit certas *Purpurarum* species, praesertim *Purpuram Lapillum* Linnaei tam habitu quam sculptura et colore admodum variabiles esse, sed descriptio et icones *Purpurae Freycineti* verae (Magas. de Zool. 1841. Mollusques Tab. 26.) tantopere discedunt ab indole nostrae cochleae, ut hanc sententiam comprobare non ausim. Inter specimina nostrae cochleae plura exstant a varietatibus quibusdam *Purpurae Lapilli* haud disjungenda, qua de causa omnia ad hanc speciem refero. Quamvis clarissimi de Middendorff, de Schrenk et Lischke de *Purpura Freycineti* uberius jam scripserint, etiam nunc mihi incerta est atque dubia. Clar. A. Adams (Ann. Mag. Nat. Hist. vol. 5. 1870. pag. 423.) cum *Purpura Lapillo* pro varietatibus conjunxit *Buccinum filiosum* Gmel. *Purp.* imbricatam, bizonalem, fimbriatam et squamosam Lamarckii, *Purp.* attenuatam Reevei — hanc quidem cum signo interrogationis — et analogam Forbesii. Omnes fere hae species sic dictae in magna *Purpurae Lapilli* serie facile cognoscuntur. *Purpuras* vero *Freycineti* et attenuatam ad hoc tempus sejunxerim.

Praeterea Clar. Adams l. l. *Purpuram* decemcostatam Middendorffii et crispatam Chemnitzii, quae nobis desunt, pro cochleis Japonicis enumeravit.

*Purpura Heyseana* Dkr.

Tab. nostr. 13. fig. 10. 11.

Testa ovata crassa, flavescens, anfractibus quinque subito crescentibus transversim costatis et imbricatis spiraque brevi instructa; anfractus ultimus dilatatus costis 8 crassis subaequalibus imbricatis cinctus; interstitia costarum lamellis erectis distantibus clathrata; apertura ovata alba; labrum incrassatum nodoso-plicatum. — Long. 25, lat. 17 mill.

Mare Japonicum.

Cochlea genuina et singularis, amico Gustavo Heyse Professore dicata, costis regularibus subimbricatis interstitiisque circiter duplo latioribus cancellatis insignis est.

Haec et quae antecedit species ad genus *Polytroparum* Swainsoni pertinent.

*Purpura sertum* Lamarck.

Anim. sans vert. vol. 10. pag. 77. Martini Conch. Cab. vol. 3. fig. 1115. 1116. *Dolium sertum* hederaceum. *Buccinum sertum* Brug. = *Stramonita hederacea* Schum. Nouv. Syst. pag. 227. *Buccinum sertum* Reeve Conch. icon. spec. 42.

Specimen minus lectum est.

Clar. H. et A. Adams fratres (Genera of recent Mollusca vol. 1. pag. 128.) in hanc speciem genus proprium fundarunt „Jopas“ dictum. Habitus testae Pisanias in mentem vacat, sed operculi structura Purpuraceis respondet. Animal ignotum est.

### Genus *Ricinula* Lamareck.

#### *Ricinula ricinus* Lin. (Murex).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 750. Testa ecaudata obovata spinis subulatis, apertura dentata, labro dentato. ed. 12. pag. 1219. Rumphii Mus. Tab. 24. fig. E. (icon rudis et perversa) = *Ricin. arachnoides* Lam. an. sans vert. vol. 10. pag. 49. *Ric. albolabris* Blainville Nouv. Ann. du Mus. vol. 1. pag. 208. Tab. 9. fig. 23.

Specimina integra et plus minus detrita et decolorata lecta sunt ex. gr. in litore insulae Hachijoshima aliisque locis.

Species late dispersa et in litore Africano etc. invenitur. Cfr. Dkr. Moll. Guin. pag. 23.

### Genus *Morula* Schumacher.

#### *Morula undata* Chemn. (Murex).

Conch. Cab. vol. 11. pag. 124. fig. 1851. 1852. *Purpura fiscella* Kien. = *Ricinula fiscellum* Reeve nec *Murex fiscella* Chemnitzii.

Plura specimina Japonica satis variantia exstant. Haec cochlea e variis et remotissimis quidem regionibus nota est.

Legantur quae de hac specie frequentissima cum *Murice fiscella* Chemnitzii saepius commixta clar. Lischke (Jap. M. C. vol. 2. pag. 44.) jam docuit.

#### *Morula tuberculata* Blainville (*Ricinula*).

Pourp. nouv. Ann. du Mus. vol. 1. pag. 204. Tab. 9. fig. 3. Reeve Conch. icon. *Purpura* spec. 11. = *Purpura granulata* Ducloux Ann. des Sc. nat. vol. 26. Tab. 2. fig. 9.

Specimina nonnulla exstant.

Cochlea pariter in remotissimis terris vulgata.

#### *Morula musiva* Kiener (*Purpura*).

Icon. coq. viv. *Purpura* pag. 38. Tab. 9. fig. 22. pariter Reeve Conch. icon. *Purpura* spec. 52.

Specimina minora exstant.

Haec species antecedenti cognata tam magnitudine quam habitu satis varians, primo obtutu tuberculorum seriebus alternatim nigris et rubris cognoscitur.

#### *Morula aspera* Lamareck (*Ricinula*).

Encycl. Tab. 395. fig. 4. Blainv. Pourp. nouv. Ann. du Mus. vol. 1. pag. 203. *Purpura morus* (melius *morum*) var. Kien. Coq. viv. pag. 21. Tab. 4. fig. 9. *Ricinula aspera* Reeve Conch. icon. *Ricinula* spec. 13.

Clar. Kiener hanc cochleolam pro varietate *Ricinulae* mori habet, quae vero tam forma quam sculptura differt.

Duo specimina in Japonia collecta exstant, certus quidem locus natalis desideratur. Praeterea in Philippinis insulis invenitur.

Dunker, Moll. Jap. mar.

*Morula siderea* Reeve (*Ricinula*).

Conch. icon. *Ricinula* spec. 14. *Sistrum sidereum* A. Adams. Ann. Mag. Nat. Hist. vol. 5. pag. 423.

Duo specimina exstant.

Takano-shima (Adams). Philippinae insulae (Cuming).

**Rapanacea.**

**Genus *Rapana* Schumacher.**

*Rapana bezoar* Lin. (*Buccinum*) var. *Japonica*.

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1204. *Rapana foliacea* Schumacher Nouv. Syst. pag. 214. *Pyrula bezoar* Lam. anim. sans vert. vol. 9. pag. 514. *Pyrula bezoar* var. *Japonica* Dkr. Moll. Jap. pag. 4. *Rapana Thomasiana* Crosse Journ. de Conch. vol. 9. pag. 176. 263. Tab. 9. 10. (specimen pergrande). Cetera synonyma conferantur in Lischke Jap. M. C. vol. 1. pag. 51.

Species sculptura picturaque pervariabilis. Operculum lamellosum rufo-corneum Purpurarum operculo respondet. In apertura speciminis gigantei 160 mill. longi maculae purpureae conspiciuntur vestigia scilicet succi purpurei.

Multa specimina exstant pulcherrima ex parte maxima et ponderosa colore et pictura variantia, alba, interne aurantia, flavida fasciis aurantiis cincta; cinerea, fusca vel fusco-cinerascentia, cingulis nigro-fuscis articulatis picta. Forma Chinensis typica foliacea (Martini Conch. Cab. vol. 3. fig. 754. 755. Voy. de la Bonite Moll. Tab. 40. fig. 7—12) in mari Japonico rarius obvenire videtur, nam unum tantum specimen juvenile in mari Japonico ortum exstat, quod integritatis ac pulchritudinis causa in Tabula nostra 12. fig. 10 et 11 depinxi. Testa ejus costulis minutim squamosis costisque majoribus nonnullis cincta est, quae costae majores squamis magnis compressis imbricatis occupantur. In speciminibus adultis haec sculptura subtilis oblitterata esse solet. Varietas Japonica squamulis semper carens a Japonis Oka-nishi nominatur.

*Rapana bulbosa* Solander (*Buccinum*).

Dillw. Cat. of Shells, vol. 2. pag. 631. Martini Conch. Cab. vol. 3. fig. 750—753. *Rapa crassa* costis imbricatis aspera = *Pyrula rapa* Lam.

Haec species in collectione Molluscorum Japonicorum desideratur, sed specimen, quod Hamburgi quondam adeptus sum ex Japonia allatum fuisse affirmabatur. Clar. Adams hanc cochleam pariter inter Mollusca Japonica enumeravit. Specimen illud a forma typica nodis simplicibus non imbricatis differt.

*Rapana Mawae* Gray.

Zool. of Beechey's voy. pag. 115. D'Argenville Tab. 34. fig. F. Griffith Cuv. animal Kingdom Tab. 25. fig. 3. 4. *Pyrula Mawae* Reeve Conch. syst. vol. 2. pag. 190. Tab. 236. fig. 1. 2. (specimen minus) Philippi Abb. vol. 1. *Pyrula* Tab. 1. fig. 1. 2. *Latiaxis Mawae* Swainson Treatise on Malacology pag. 306.

Unicum exstat specimen Japonicum 48 mill. altum, 38 latum.

Cochlea testa irregulari et distorta, late umbilicata, anfractibus carinatis, ultimo libero vel soluto nec non carina laciniata recurva valde singularis atque mirabilis. Anfractus in nostro

specimine septem numerantur, supremi tres, qui sunt embryonales, conulum formant ex anfractibus sequentibus planatis prosilientem, ultimus convexus prope carinam cavatus est. Superficies testae totius albae transversim tenuiterque striata, aperturam versus subimbricata.

Japani hanc cochleam „Midzu-sui gai“ nominant.

Ad Latiaxin Swainsoni pertinet.

#### *Rapana de Burghiae* Reeve (*Rhizochilus*).

Tab. nostra 1. fig. 5. 6., fig. 7 particula magnitudine aucta delineata.

*Pyrula* (*Rhizochilus*) de Burghiae Reeve Proc. Zool. Soc. 1857. pag. 208. Tab. 38. fig. 3.

China.

Unicum specimen in Japonia lectum adest.

Hanc cochleam mirabilem iterum depinximus ut ejus sculptura melius eluceat. Testa tota costulis densis aequalibus minutim imbricatis cincta est, quae vero costulae in laciniis carinae compressis et erectis flabelli instar digrediuntur.

Clar. Reeve hanc cochleam cum *Rhizochilo* conjunxit, mea quidem opinione melius cum *Rapanis* vel subgenere *Latiaxi* congregatur propter totius testae habitum et umbilici formationem.

Animal (incola testae) prorsus ignotum est.

*Murex* tectum Sinense *Deshayesii* (Journ. de Conch. vol. 5. pag. 78. Tab. 3. fig. 1. 2.) pariter *Rapanis* inserendus, nostrae cochleae ratione quadam analogus est.

#### *Rapana Lischkeana* Dkr.

Tab. nostr. 1. fig. 1. 2. Tab. 13. fig. 26. 27.

Testa plus minusve fusiformis, lactea, pellucens, anfractibus septenis vel octonis scalatis sutura incisa sejunctis. squamis magnis compressis erectis acutis costisque transversis dense imbricatis instructa; columella parum sinuata; apertura ovata; rostrum longiusculum subrectum; canalis apertus; umbilicus extrinsecus squamis majoribus terminatus. Labrum intus vix sulcatum, in speciminibus junioribus laevigatum. — Exemplaria adulta usque ad 45 mill. longa.

Species elegantissima habitu variabilis praesertim squamarum formatione insignis est. Squamae in superiore anfractu parte magnae erectae compressae laeves, spiniformes spiram gradatam reddunt, praeterea tota cochlea costulis transversis cincta est, quae squamulis erectis densis occupantur. Operculum fusco-corneum *Purpurarum* operculis respondet.

#### *Rapana Japonica* Dkr.

Tab. nostr. 13. fig. 24. 25.

Testa fusiformis lactea, anfractibus octonis costulis aequalibus densis angustis minutim imbricatis nec non serie squamarum magnarum duplici superiorem anfractuum partem tenente instructa; apertura ovata; labrum intus costatum; columella perparum sinuata; rostrum rectum; canalis apertus. — Long. 40 mill.

Haec cochlea respectu habitus costarum et squamarum antecedenti analoga est, sed satis differt, ut pro specie genuina habeatur. Discrepat enim non solum costulis aequalibus angustioribus altioribus ideoque melius expressis, sed etiam squamarum magnarum serie duplici nec unica superiorem anfractuum partem tenente. Praeterea hae squamae non sunt laeves, sed striatae et dextero latere, id est dorso, minutim serratae, quod quidem in iconibus nostris perspicere non potest.

Haec et cochlea antecedens e mari Japonico mediterraneo proveniunt.

**Genus Coralliophila H. et A. Adams.**

*Coralliophila monodonta* Quoy et Gaim. (Purpura).

Voy. de l'Astr. Moll. Tab. 37. fig. 9—11. Purp. madreporarum Sow. Gen. 42. Reeve Conch. icon. Purpura spec. 69. Gould Expl. Exped. pag. 378. fig. 483.

Specimen parvulum Japonicum adest sine certa loci natalis indicatione. In sinu ad Hakodate Schrenkio auctore occurrit.

Species forma plus minusve distorta ovata, depressa, tenuissime idque transversim striata, interdum scabriuscula, plerumque alba, raro lineis subfuscis transversis signata, intus lactea, columella plana semper violacea; spira brevissima obtusa trigyrata.

Animal in coralliis degens Gouldius l. l. descripsit.

Species singularis e variis regionibus nota est.

*Coralliophila costularis* Blainville (Purpura).

Pourp. Nouv. Anim. du Mus. vol. 1. pag. 232. Tab. 11. fig. 9. Murex costularis Lam. anim. sans vert. vol. 9. pag. 594. Reeve Conch. icon. Purpura spec. 63.

Specimen nostrum Japonicum ab icone Reeveana spira paulum brevioris plicisque in anfractu ultimo evanescentibus differt.

*Coralliophila Jeffreysii* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 213. Tab. 20. fig. 48.

Clar. auctor hanc speciem cum Murice vel Fusio lamellosa comparavit, incertus quidem num eam recte collocaverit in ordine systematis. Fusum lamellosum cum Trophonum genere junxerim. Certus nostrae cochleae locus tum demum assignabitur si forte animal ejusque ratio vivendi, etiamsi in Coralliis vel lapidibus, observandi data erit occasio.

Genus Coralliophilae a Rhizochilo Steenstrupii non satis diversum esse mihi videtur.

**Genus Separatista Gray.**

*Separatista Chemnitzii* A. Adams.

Tab. nostra 2. fig. 1. 2.

A. Adams Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 45. H. et A. Adams Rec. Moll. vol. 1. pag. 136. Tab. 14. fig. 6. Turbo Separatista Chemn. Conch. Cab. vol. 10. pag. 298. fig. 1589. 1590.

Testa discoidea heliciformis, subcornea, flavescens, anfractibus quinque subito crescentibus obsolete striatis instructa, ultimo carinulis tribus cincto; spira exserta; apertura rotundato-triangularis dilatata subreflexa, basi effusa in canaliculum levem producta; umbilicus latissimus pervius, costulis nonnullis circumdatus.

Mare Japonicum et litora Philippinarum insularum.

Unum tantum specimen huius testae rarae exstat paullum discrepans cum iconibus supra citatis, quapropter hic denuo delineata est. Separatista Blainvilleana Petit (Trichotropis) Journ. de Conch. vol. 2. pag. 22. Tab. 1. fig. 5. parum differre mihi videtur.

Animal et operculum ignota sunt. Quaeritur num haec testa singularis locum justum teneat in systemate Molluscorum.

### Genus *Bulbus* Humphreys.

*Bulbus Rapa* Lin. (*Murex*).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 752. ed. 12. pag. 1184. *Bulla Rapa*. Rumphii Mus. Tab. 27. fig. F. *Rapa*. Mart. Conch. Cab. vol. 3. pag. 25. fig. 747—749. *Rapa tenuis* vel *papyracea*. Lamarck anim. sans vert. vol. 9. pag. 516. *Pyrula papyracea* (cfr. quae cl. Deshayes ad *Pyrulam Rapam* annotavit ibid. pag. 515).

Specimen minus passim subroseum lectum est.

Animal et operculum pariter incognita sunt. Cfr. *Bulbus incurvus* Dkr. Nov. Conch. pag. 17.

### Genus *Leptoconchus* Rüppel.

*Leptoconchus Peronii* Lamarck (*Magilus*).

Anim. sans vert. vol. 5. pag. 639. *Leptoconchus striatus* Rüpp. Transact. Zool. Soc. vol. 1. pag. 259. Tab. 23. fig. 9. 10. Deshayes Conch. Pile Réunion pag. 124. una cum inquisitione anatomica. A. Adams Ann. Mag. Nat. Hist. 1870. pag. 424.

Kino-o-shima, in *Madreporis degens*. (A. Adams).

Specimina tria exstant.

*Leptoconchus Schrenckii* Lischke.

Malak. Bl. 1871. pag. 40. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 45. Tab. 4. fig. 9. 10.

Haec species testis cochleae antecedentis nondum perfectis tam similis est, ut eam pro pullis ejusdem declaraverim.

*Leptoconchus rostratus* A. Adams.

Tab. nostra 6. fig. 20. 21.

Ann. Mag. Nat. Hist. Apr. 1864. pag. 310.

Kino-o-shima in *Madreporis*. A. Adams.

Testa ovato-piriformis, tenuis, alba, lamellis minutis confertis undulatis instructa; spira obtusa; apertura ovato-trigona in rostrum acutum desinens; labium laeve; labrum antice sinuatum; anfractus ultimus liris transversis notatus.

Haec species a *Leptoconcho serrato* Rüppelii lamellis simplicibus non serratis, ab elliptico *Sowerbyi* habitu piriformi et apertura in rostrum acutum producta distinguitur.

### Olivacea.

#### Genus *Harpa* Rumphii.

*Harpa conoidalis* Lam.

Rumphii Mus. pag. 104. Tab. 32. lit. K. *Dolium harpa* seu *Cithara major* Martini Conch. Cab. vol. 3. fig. 1090. *Harpa conoidalis* Lam. Anim. sans vert. vol. 7. pag. 255. = *H. ventricosa* var. Desh. Reeve Conch. icon. spec. 7. Sowerby Thes. Conch. fig. 14. 17. „*Harpa nablum*“.

Duo specimina exstant, alterum permagnum.

**Genus Oliva Bruguière.**

**Oliva mustelina Lam.**

Anim. sans vert. ed. 2. vol. 10. pag. 616. Reeve Conch. icon. Oliva spec. 23. Sowerby Thes. Conch. Oliva 114. fig. 272. 273. Weink. Mart. Chemn. Tab. 24. fig. 10. 11.

Specimina nitidissima exstant.

**Oliva elegans Lam.**

Anim. sans vert. ed. 2. vol. 10. pag. 611. Reeve Conch. icon. Oliva spec. 20. Sowerby Thes. Conch. Oliva 72. fig. 158—160. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 61.

Nagasaki.

**Oliva irisans Lam.**

Anim. sans vert. ed. 2. vol. 10. pag. 610. Sowerby Thes. Conch. Oliva Tab. 9. fig. 123. Weink. in Mart. Chemn. ed. alt. Tab. 20. fig. 1—6.

Specimen splendidissimum exstat.

**Oliva carneola Lam.**

Anim. sans vert. ed. 2. vol. 10. pag. 621. Martini Conch. Cab. vol. 2. pag. 162. fig. 495. *Cylindrus parvus*, Mica, *Carneolus a colore dicta*. Reeve Conch. icon. Oliva spec. 60. exclusis figg. a. b. icones optimae. Sow. Thes. Conch. fig. 233—235.

Inter varietates una marmorata exstat. (Reeve 60. d. e.)

**Oliva tessellata Lam.**

Anim. sans vert. ed. 2. vol. 10. pag. 620. Martini Conch. Cab. vol. 2. fig. 493. 494. *Cylindrus tigrinus* Meusch. *Voluta tigrina* Schröt. Marr. in Thes. Conch. fig. 222—224.

Specimen vivide pictum adest.

**Oliva picta Reeve.**

Conch. icon. spec. 79. Sow. Thes. Conch. sp. 98. fig. 227. 228.

Duo specimina exstant.

**Genus Olivella Swains.**

**Olivella jaspidea Gmel. (Voluta).**

*Oliva conoidalis* Lam. = *exigua* (Mart.) Mörch.

Specimina nonnulla inter Mollusca Japonica exstant cum iis plane congruentia, quae ex Antillis insulis originem ducunt.

Clar. Mörch. in Cat. suo Conch. etc. Yoldi pag. 130. hanc speciem ut *Olivellam exiguam* Mart. enumeravit, sed hanc denominationem nullibi invenire potui. Verbum „*exiguus*“ in diagnosi tantum brevissima occurrit, nam cochleola his verbis designatur: *Cylindrus tenuis*, longus, *exiguus*, variis coloribus minute admodum punctatus. Conch. Cab. vol. 2. pag. 186. fig. 556. Martini Mollusca plerumque phrasi sic dicta diagnostica distinxit neque nominibus simplicibus enumeravit.

**Olivella anazora Duclos.**

Hist. nat. Coq. Oliva Tab. 6. fig. 3. 4. Reeve Conch. icon. Oliva spec. 74. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 61. Sowerby Thes. Conch. no. 189. fig. 419.

Mare Japonicum septentrionale.



*Olivella tergina* Duclós.

Hist. nat. Coq. Oliva Tab. 2. fig. 13—16. Reeve Conch. icon. Oliva spec. 80. Schrenck Reisen und Forsch. im Amurl. vol. 2. pag. 456. Ad subgenus „Lamprodoma“ Swainsonii pertinet.

Mare Japonicum septentrionale.

Speciminibus Mazatlanicis omnino respondet.

*Olivella zanoeta*.

Ducl. Tab. 1. fig. 9. 10. Reeve Conch. icon. sp. 76. a. b. Sow. Thes. Conch. fig. 404.

Specimina pallida exstant. Pariter cum *Lamprodoma jungenda*.

*Olivella signata* Lischke (Oliva).

Malak. Bl. 1873. pag. 20. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 44. Tab. 2. fig. 27.

Sinus Jedoënsis.

Species singularis, cuius duo exstant specimina in Museo Loebbeckeano Dusseldorpii.

*Olivella consobrina* Lischke (Oliva).

Malak. Bl. vol. 18. pag. 41. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 62. Tab. 5. fig. 10. 11. O. fabula Marr. Sow. Thes. Conch. fig. 420. 421.

Jedo, Nagasaki.

Conferantur quae de hac specie protulit clar. E. A. Smith in Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 216.

*Olivella spreta* Gould.

Otia pag. 127. Smith Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 216. Tab. 20. fig. 55.

Goto.

Praeterea clar. de Schrenck enumeravit:

*Olivellam gracilem* Brod. et Sow. (Olivam).

Sow. Thes. Conch. no. 156. fig. 370—372. Reisen und Forsch. im Amurl. pag. 423.

et *Olivellam damam* Mawe (Olivam).

ibid. pag. 454.

utramque speciem in sinu de Castries collectam.

**Genus Ancillaria Lam.**

*Ancillaria albo-callosa* Lischke.

Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 44. Tab. 2. fig. 24. 25.

Hanc speciem magnificam in libello meo de Molluscis Japonicis pag. 9. pro *Ancillaria rubiginosa* Swainsoni enumeravi incertus quidem, cum tunc descriptionem et iconem Swainsoni comparare non potuerim.

*Ancillaria Montrouzieri* Souverbie.

Journ. de Conch. vol. 8. pag. 207. ibid. pag. 324. Tab. 11. fig. 3. 3a.

Insula Pinorum Archip. Novae Caledoniae.

Duo specimina Japonica exstant sine certa loci natalis indicatione.

Haec specimina exceptis fasciarum colore vividiore et apice pallide fulvo perparum differunt a descriptione et iconibus supra citatis, ita ut pro varietate haberi possint. *Ancillaria mucronata* Sow., *A. rubiginosa* Swains. et haec nostra cochlea species sunt inter se simillimae.

*Ancillaria inornata* E. A. Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 217. Tab. 20. fig. 56.

Mare Japonicum.

Species acute ovata unicolor alba 8 tantum mill. longa.

## Fasciolariacea.

*Fasciolaria Audouini* Jonas.

Zeitsch. für Malak. 1846. pag. 63. Deser. de l'Egypte Tab. 4. fig. 17. Phil. Abb. Fasc. Tab. 3. fig. 1.

Dunker in Nov. Conch. pag. 28 et 95. Tab. 32. fig. 3. 4. var. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 40. vol. 2. pag. 28.

Specimina illaesa epidermide cornea nitente obducta ad Nagasaki lecta exstant. Pariter in Mari erythraeo obvenit.

*Fasciolaria filamentosa* Chemn. (*Fusus*).

Conch. Cab. vol. 4. Tab. 140. fig. 1310. 1311.

Unum specimen in collectione exstat.

Clar. A. Adamsio auctore ad Hakodate et Takano-shima obvenit. In mari erythraeo varietas enodis et laeviuscula invenitur; haec est *Fasc. inermis* Jonassii. Phil. Abb. vol. 3. pag. 122. Tab. 3. fig. 3.

*Fasciolaria glabra* Dkr.

Tab. nostra 12. fig. 15. 16.

Testa gracilis fusiformis glabra, anfractibus incluso nucleò laevigato submamillari denis, superne cavatis, nodorum serie media cinctis, supremis transversim sulcatis instructa; color luteus, maculis et strigis longitudinalibus lineisque fuscis transversis variegatus; columella inferne biplacata luteo-aurantia; peristoma sulcatum eodem modo tinctum; labrum crenatum; rostrum leviter costatum; epidermis cornea nitida laevis et tenuis, sed firma.

Duo specimina exstant, alterum adultum 75 mill., alterum juvenile vix 24 mill. longum.

Haec species quantum scio nullibi descripta, formam fere refert *Fasciolariae* praecedentis; a *Fasciolaria Audouini*, cui ratione quadam analogia est, praesertim forma multo minore et graciliore, nodis tenuioribus labrum versus evanescentibus nec non columella biplicata differt.

## Genus *Lathyrus* Montf.

*Lathyrus polygonus* Gmel. (*Murex*).

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3555. *Fusus polygonus* Encycl. Tab. 423. fig. 1. *Turbinella polygona*

Lam. anim. sans vert. ed. 2. vol. 9. pag. 385. Kien. Iconogr. pag. 22. Tab. 13. fig. 2. Reeve Conch. icon. *Turbinella* spec. 1.

Tatijama (A. Adams).

Specimen integrum exstat.

Ad Plicatellas Swainsoni pertinet.

**Lathyrus rhodostoma Dkr. (Turbinella).**

Malak. Bl. vol. 6. pag. 238. Moll. Jap. pag. 4. Tab. 1. fig. 21.

Portus De-shimae, Nagasaki.

Clar. E. de Martens auctore haec species, quam viventem observavit, melius cum Fasciolaris sensu strictiore jungitur. (Cfr. Nachrichtenblatt der deutsch. malak. Gesellsch. 1869. pag. 190. et v. d. Decken, Reisen in Ostafri. vol. 3. pag. 62). Si certe res ita se habet, haec cochleola divisionem Fasciolariarum valde singularem repraesentat.

**Cymbiacea.**

**Genus Melo Humphr.**

**Melo Broderipii Gray.**

Sow. Thes. Conch. Melo spec. 8. fig. 26. 27.

Haec species et mare Japonicum habitare dicitur. In nostra collectione deest.

**Volutacea.**

**Genus Voluta Lin.**

**Voluta megaspira Sow.**

Thes. Conch. Voluta pag. 298. spec. 38. fig. 31. 32. Voluta lyriformis Kien. (non Swainsoni neque Lamarekii). Lischke Jap. M. C. vol. 2. pag. 167. vol. 3. pag. 43. Cf. Voluta Prevostiana Crosse Journ. de Conch. vol. 18. pag. 165. quae pariter huc spectare videtur.

Specimen huius cochleae exstat haud adultum 56 mill. longum, 20 latum, fusiforme per longitudinem plicatum, anfractibus senis, superioribus transversim sulcatis instructum; apex ejus globoso-papillaris oblique tortus; apertura oblonga; columella obsolete biplicata; color rufescens. Pictura undulata vel fulgurata plane deest. Plicae longitudinales in anfractus ultimi parte antica sensim evanescent, quae vero sulculos transversos undulatos ostendit.

Quamvis columella binis tantummodo plicis, et quidem obsoletis instructa sit — in Thesauro Conch. columella quinque plicata dicitur — et testa pictura fulgurata plane careat, tamen determinationem rectam habeo, nam suspicor plicas columellares in hoc specimine juniore nondum perfectas vel numerum earum picturamque variabiles esse. Cum Paguri Molluscorum testas, quas tenent, plus minusve laedere soleant, praesertim earum columellam, fortasse sumere licet nostram cochleam a Paguro quodam occupatam fuisse.

**Voluta fulgura Martini (Murex).**

Conch. Cab. vol. 3. pag. 252. fig. 941. 942. Cochlis volutata plicato-muricata, striata, flammis ochraceis insignita, labro fimbriato, columella plicis copiosis armata rarissima Murex fulgura dictus. Voluta rupestris Gmel. Syst. Nat. pag. 3464. Voluta fulminata Lam. an. sans vert. vol. 10. pag. 399.

Dunker, Moll. Jap. mar.

*Fulguraria Chinensis* Schumacher Nouv. Syst. pag. 242. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 209. Tab. 50. fig. 51—53.

Specimen magnum exstat 95 mill. longum.

Haec et quae antecedit species ad *Fulgurarias Swainsoni* pertinent.

#### *Voluta Hamillei* Crosse.

Journ. de Conch. vol. 17. pag. 278 et vol. 18. pag. 97. Tab. 1. fig. 5 et Tab. 2 fig. 1.,

quae pariter in mari Japonico obvenit, *Voluta fulgura* multo major est. Fortasse nil repraesentat nisi varietatem ejusdem giganteam.

#### *Voluta vespertilio* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 733. ed. 12. pag. 1194. Rumphii Mus. Tab. 32. fig. H. Vespertilio. Mart. Conch. Cab. vol. 3. fig. 936—939. Reeve Conch. icon. *Voluta* sp. 11. a. Cfr. Lam. anim. sans vert. vol. 10. pag. 387.

Inter Mollusca Japonica specimen unum exstat forma typica. Cochlea admodum variabilis in Oceano indico frequentissima est. Ad *Aulicas Grayi* pertinet. Hanc cochleam Japoni „Hime hora“ nominant.

#### *Voluta concinna* Brod.

Proc. Zool. Soc. London 1836. pag. 43. Reeve Conch. icon. Tab. 21. fig. 53. (spec. juv.) Cfr. Distribution géographique et catalogue des espèces actuelles du genre *Voluta* par H. Crosse Journ. de Conch. 1871. pag. 302.

Mare Japonicum.

Cochlea rarissima!

Pertinet ad sectionem Crossei *decimam*, *Psephaeam* dictam.

#### Genus *Lyria* Gray.

##### *Lyria cassidula* Reeve (*Voluta*).

Tab. nostra 2. fig. 10, 11. var. 12, 13.

Conch. icon. vol. 6. *Voluta* spec. 60. a. b. Thes. Conch. vol. 3. *Voluta* spec. 63. fig. 130.

Duae varietates exstant in Tabula nostra depictae.

##### *Lyria nucleus* Lam. (*Voluta*).

Reeve Conch. icon. spec. 41. Sow. Thes. Conch. *Voluta* spec. 57. fig. 108.

Tatiyama et Oki-no-shima teste A. Adams.

#### Genus *Volutomitra* Gray.

##### *Volutomitra pusilla* Schrenck (*Voluta*).

Moll. d. Amurlandes etc. pag. 445. Tab. 17. fig. 13—15.

Hab. in sinu prope Hakodate.

## Mitracea.

### . Genus Mitra Lam.

#### Mitra Hanleyana Dkr.

Tab. nostra 2. fig. 6. 7.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 70. (1877.) Mitra Wrighti Crosse Journ. de Conch. 1878. pag. 57. Tab. 1. fig. 1.

Testa ovato-fusiformis, anfractibus denis perparum convexis sutura perspicua divisis, transversim tenuiterque sulcatis instructa, ultimo cum spira comparato paululo longiore; sulci transversim punctulis infixis stigmati; apertura angusta; columella quadriplicata; color fundi albus strigis fuscis irregularibus et interruptis, inde maculis subquadratis pictus; epidermis tenuis cornea caduca. — Long. 71 mill., diam. max. 20 mill.

Duo specimina e mari Japonico exstant, alterum adultum integerrimum, alterum junius paululum laesum.

Haec species singularis et eximia paene glabrata, striis tantummodo incrementi obsoletissimis sulcisque punctatis insignita est. Tales lineae punctatae in aliis quoque Mitris haud raro inveniuntur, sed picturae indoles et totus cochleae habitus ab omnibus Mitrarum speciebus mihi notis discrepat.

Haec cochlea in honorem Sylvani Hanley nominata est. Japoni eam „Kuya gai“ appellant.

#### Mitra rosacea Reeve.

Proc. Zool. Soc. 1845. pag. 59. Conch. icon. Mitra spec. 321.

Tria specimina exstant.

Testa recens et integra in anfractu ultimo fasciis duabus rosaceis ornata est. Quod attinet ad sculpturam et colorem Mitram (Cancillam) Antoniae H. Adams e mari rubro (Proc. Zool. Soc. 1870. pag. 788. Tab. 48. fig. 1.) in mentem revocat.

#### Mitra flammigera Reeve.

Proc. Zool. Soc. 1844. Conch. icon. spec. 173. a. b.

Specimen integrum exstat omni ratione in Mitram flammigeram optime quadrans.

Reeveo patria huius cochleae ignota erat.

Cum specie antecedente ad Cancillas Swainsoni pertinet. (A treatise on Mal. pag. 320.)

#### Mitra ferruginea Lam.

Anim. sans vert. ed. alt. vol. 10. pag. 305.

Clar. Lischke hanc speciem late dispersam ut Japonicam quoque enumeravit. In nostra Molluscorum Japonicorum collectione desideratur.

Ad Nebularias Swainsoni pertinet.

*Mitra amphorella* Lam.

Anim. sans vert. ed. 2. vol. 7. pag. 316. Dkr. Moll. Jap. pag. 8.

Specimina paululum detrita zona alba infra suturam cincta iconi Reeveanae Conch. icon. sp. 85. bene respondent excepto quidem habitu minore. Inter omnes satis constat Reeveum plerumque imagines speciminum maximorum delineavisse.

Ad *Strigatellas Swainsoni* pertinet.

*Mitra scutulata* Chemn. (*Voluta*) var.

Chemn. Conch. Cab. vol. 10 pag. 163. Tab. 151. fig. 1428. 1429. Lam. anim. sans vert. vol. 8. pag. 314.

Exstat varietas gracilior.

Pariter ad *Strigatellas* pertinet.

*Mitra cruentata* Chemn. (*Voluta*).

Conch. Cab. vol. 10. Tab. 151. fig. 1438. 1439. Reeve Conch. icon. *Mitra* spec. 126. Dkr. Moll. Jap. pag. 8.

Specimina minora adsunt.

*Mitra Bronnii* Dkr.

Tab. nostra 5. fig. 5. 6.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 229. Moll. Jap. pag. 8. *Mitra* (*Costellaria*) *Suluensis* Smith (non Ad. et Rve.) Ann. and Mag. Nat. Hist. 1875. 15. pag. 425. *Mitra* (*Costellaria*) *fusco-apicata* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 214. Tab. 20. fig. 49.

Haec species jam longo ex tempore a me descripta sed non depicta nunc prodit icone illustrata. Habitu et pictura vividiore vel languida variat et apex non semper fusco tinctus est; de cetero clar. Smith eam in Proc. Zool. Soc. 1879. nomine *Mitrae fusco-apicatae* optime descripsit ita ut huic descriptioni nil amplius adjiciendum esse mihi videatur.

Cum antecedente ad *Costellarias Swainsoni* pertinet.

*Mitra* (*Costellaria*) *subtruncata* Sowerby.

Thes. Conch. vol. 4. Tab. 360. fig. 405. spec. 463. E. A. Smith Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 214.

O-shima.

*Mitra* (*Costellaria*) *Collinsoni* A. Adams.

Journ. Linn. Soc. 1864. vol. 7. pag. 200. Sowerby Thes. Conch. fig. 621. 622. Smith Ann. et Mag. Nat. Hist. 1875. vol. 15. pag. 425. Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 215. Tab. 20. fig. 50.

Fretum Coreanum etc.

Species *Mitrae Bronnii* propinqua sed minor.

*Mitra* (*Costellaria*) *Gotoënsis* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 215. Tab. 20. fig. 51.

Insula Goto.

*Mitra* (*Costellaria*) *pyramidella* A. Adams.

Ann. and Mag. Nat. Hist. m. Apr. 1862. pag. 297.

Satanosaki.

Species mihi incognita.

**Mitra Kraussii Dkr.**

Tab. nostra 5. fig. 11. 12.

Moll. Jap. pag. 8.

Descriptioni meae l. c. olim promulgatae nunc icones adjeci. Haec species parum variabilis inter Costellarias et Pusias ambigua est. Clar. de Schrenck (Nordjap. Moll. pag. 451.) eam pro varietate Mitrae microzonias Lamarekii habet. Accurata utriusque speciei comparatio hunc errorem statim probabit.

**Mitra (Pusia) aemula E. A. Smith.**

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 215. Tab. 20. fig. 52.

Insula Goto.

Species Mitrae analogicae Reevei cognata.

**Mitra (Pusia) inermis Reeve.**

Conch. icon. vol. 2. spec. 279. E. A. Smith Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 216. Tab. 20. fig. 53. 53a.

Insula Goto.

Icones citatae Mitram Kraussii in mentem vocant, sed descriptio Smithiana exacta non quadrat.

**Mitra porphyretica Reeve.**

Proc. Zool. Soc. 1844. Conch. icon. spec. 195.

Specimina nonnulla exstant.

Haec species habitu variat, modo est ventrosior, modo gracilior. H. Cuming eam satis frequentem in Philippinis insulis invenit. Ad Pusias Swainsoni pertinet.

**Genus Cylindra Schum.**

**Cylindra crenulata Chemn. (Voluta).**

Conch. Cab. vol. 10. Tab. 150. figg. 1413. 1414. Lam. anim. sans vert. vol. 10. pag. 323.

Specimen unum exstat album fusco-strigatum 30 mill. longum.

Structura plicarum columellarium variabilis esse videtur; in specimine nostro Japonico plicae octo numerantur, clar. Reeve columellam decies plicatam nominavit.

Haec cochlea a Japonis „Tama-mushi gai“ appellatur.

Certae Mitracearum sectiones ut genera vel subgenera nominibus propriis disjunctae sunt. Nonnullae respiciendae mihi videntur, ex. gr. Cylindra et Imbricaria Schumacheri.

**Columbellacea.**

**Genus Columbella Lam.**

**Columbella haemastoma Sow.**

Proc. Zool. Soc. 1832. pag. 116. Thes. Conch. vol. 1. pag. 111. Tab. 36. fig. 5. Schrenck Amurl. Moll. pag. 446.

Haec species jam diu ex isthmo Panamensi et litore Californiano nota, posterius a clar. de Nordmann in sinu Tatarico detecta est.

*Columbella fuscata* Sow.

Proc. Zool. Soc. 1832. pag. 117. Thes. Conch. vol. 1. pag. 114. Tab. 36. fig. 21. 25. = Col. melegris Duclos.

Haec species in litore Panamensi, Peruano aliisque locis Americae australis satis frequens pariter in sinu Tatarico lecta esse dicitur.

*Columbella solidula* Reeve.

Conch. icon. *Columbella* spec. 149.

Sinus Tataricus (de Nordmann), cfr. de Schrenck Moll. des Amurlandes pag. 448.

*Columbella scripta* Lam.

Anim. sans vert. ed. 2. vol. 10. pag. 270. *Columbella variegata* Mke. Synopsis pag. 65. *Columbella versicolor* Sow. Thes. Conch. Tab. 37. fig. 41—46. Dkr. Moll. Jap. pag. 6.

*Columbella bidentata* Menke (Spec. Moll. Novae Holl. pag. 23), quam ab auctore quondam accepi, varietas est denticulis duobus in columella granosa perspicue prominentibus insignis. Hanc formationem clar. Sowerby in Thes. Conch. vol. 1. fig. 53. non satis expressit.

Portus De-shimae, Nagasaki, Philippinae insulae etc.

Plura specimina plus minusve detrita lecta sunt.

Clar. Menke *Columbellam* suam variegatam in nucleum olivae parvum undulatum Mart. Conch. Cab. vol. 2. fig. 462 fundavit, qui *Columbellam* nostram ante oculos ponit.

*Columbella sagena* Reeve.

Conch. icon. *Columbella* Tab. 26. fig. 162. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 58.

Nagasaki.

Plura specimina exstant.

*Columbella Martensii* Lischke.

Malak. Bl. vol. 18. pag. 40. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 47. Tab. 5. fig. 1—9.

Plura specimina lecta sunt. Ad *Mitrellas* pertinet.

*Columbella pumila* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 224. Moll. Jap. pag. 6. Tab. 1. fig. 4. (magn. paululum aucta.)

Species parvula unicolor fusca *Columbellae exili* Phil. affinis formam *Mitrarum* quarundam referens.

Portus De-shimae.

Ad *Atilias* H. et A. Adams pertinet.

*Columbella misera* Sow.

*Columbella misera* Sow. Thes. Conch. vol. 1. pag. 129. fig. 111. Reeve Conch. icon. *Columbella* spec. 68. *Anachis misera* H. et A. Adams.

Plura specimina lecta sunt.



*Columbella Lischkei* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 207. Tab. 20. fig. 41.

Kius-hiu.

Ad Atilias H. et A. Adams pertinet.

*Columbella niveomarginata* Smith (Atilia).

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 208. Tab. 20. fig. 42.

Ukushima.

*Columbella subvitrea* Smith (Zaphra).

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 209. Tab. 20. fig. 43.

Auctor clar. hanc cochleolam cum Zafra, genere Adamsiano, conjunxit, quod vero secundum descriptionem et icones citatas Pleurotomaceis melius inserendum esse mihi videtur.

**Genus Pyrene Bolten.**

*Pyrene discors* Gmel. (Voluta).

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3455. Mart. Conch. Cab. vol. 4. fig. 1400. excepta icone 1405. *Columbella semipunctata* Lam. anim. sans vert.

Tria specimina exstant prope Nagasaki lecta.

*Pyrene flava* Brug. (Buccinum).

Brug. Dict. no. 53. *Columbella flavida* Lam. Anim. sans vert. ed. 2. vol. 10. pag. 268. Mart. Conch. Cab. vol. 2. pag. 120. fig. 465. 466. Nucleus olivae aureus albo-maculatus et punctatus = *Pyrene aurea* Mörch pariter H. et A. Adams.

Exstat varietas flava maculis albis deficientibus epidermide lamellosa vestita.

*Pyrene undata* Duclos.

Monogr. Tab. 4. fig. 3. 4. Kien. Coq. viv. Tab. 9. fig. 1. Dkr. Moll. Jap. pag. 6.

Specimina detrita exstant in portu De-shimae collecta.

**Genus Amycla H. et A. Adams.**

*Amycla varians* Dkr.

Malak. Bl. 1860. pag. 231. Moll. Jap. pag. 6. Tab. 1. fig. 17. magn. aucta. Smith Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 210. Tab. 20. fig. 44. 44 a. 44 b.

Multa specimina plurimam partem detrita lecta sunt. Species colore picturaque admodum variabilis.

Clar. A. Adams Buccinum scriptum Linnaei huc refert, cum signo quidem interrogationis, sed haec cochleola est valde diversa.

*Amycla Burchardi* Dkr.

Tab. nostra 4. fig. 3. 4.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 67.

Testa ovato-conica striis subtilibus transversis frontem versus sensim crassioribus instructa; anfractus plano-convexi 8—9 sutura distincta sejuncti, ultimus spira paululum major; columella

glabrata; labrum incrassatum leviter sulcatum, externe turgidulum, subvaricosum; canalis brevis; apex acutiusculus laevigatus; color albidus strigis undulatis vel maculis irregularibus fuscis variegatus.

Specimina nonnulla exstant habitu et pictura congruentia 15—18 mill. longa.

Haec species ad *Amyclam* variantem Dkr. aliquo modo accedit, sed statura majore, spira graciliore, labro incrassato extrinsecus subvaricoso striisque spiralibus primo obtutu differt.

Praeterea A. Adams in Ann. Mag. Nat. Hist. 1870. pag. 426. has *Amyclarum* species ut Japonicas enumeravit:

*Amyclam fasciolatam* (Bucc.) Lam. (vel *B. corniculum* Olivi).

(Vix crediderim hanc cochleolam maris mediterranei frequentissimam etiam in mari Japonico obvenire.)

*Amyclam gausapatam* Gould.

Expl. Exped. pag. 267. fig. 337. Otia Conch. pag. 71.

*Amyclam achatinam* Sow.

Thes. Conch. Columbella Tab. 39. fig. 126.

### Genus *Engina* Gray.

*Engina acuminata* Reeve (*Ricinula*).

Conch. icon *Ricinula* spec. 52.

Tsus-shima. A. Adams.

*Engina mendicaria* Lin. (*Voluta*).

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1191. *Columbella mendicaria* Lam. anim. sans vert. vol. 10. pag. 272.

*Pusiostoma mendicarium* A. Adams l. c. pag. 424. *Ricinula mendicaria* Reeve. Conch. icon. *Ricinula* spec. 8.

Mare Japonicum.

Tria specimina exstant.

*Engina trifasciata* Reeve (*Ricinula*).

Conch. icon. spec. 41. *Pusiostoma trifasciatum* A. Adams l. c. pag. 424.

Oki-no-shima (A. Adams).

### Marginellacea.

#### Genus *Erato* Risso.

*Erato callosa* A. Adams et Reeve.

Zool. Voy. Samar. Moll. pag. 25. Tab. 10. fig. 32. a. b. Sow. Thes. Conch. vol. 3. pag. 82. Tab. 219. fig. 35—37. Dkr. Moll. Jap. pag. 9.

Mare Japonicum et Chinense.

Plura specimina adsunt magnitudine maximopere variantia.

### Genus *Marginella* Lam.

*Marginella sexplicata* Dkr. (Cryptospira).

*Marg. obtusa* Sow. Proc. Zool. Soc. 1870. pag. 254. non obtusa Sow. in Thes. pag. 374. = *Persicula grisea* Jouss. Monogr. pag. 105. cfr. Weinkauff Monogr. Mart. Chemn. ed. alt. 16. 6. 7.

*Mare Japonicum.* (California).

### Doliacea.

#### *Dolium* Lamarek.

*Dolium fasciatum* Martini (Buccinum).

Conch. Cab. vol. 3. pag. 406. fig. 1081. Bruguière Dict. Sc. Nat. no. 5. Lamarek anim. sans vert. vol. 10. pag. 142. Reeve Conch. icon. *Dolium* spec. 11. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 76. vol. 2. pag. 58.

*Mare Japonicum et Chinense, insulae Philippinae etc.*

Specimina tantum juniora lecta sunt. Specimen in collectione exstat in medio anfractu ultimo varice crasso instructum.

*Dolium zonatum* Green.

Transactions of the Albany Inst. vol. 1. pars 1. pag. 131. Testa nondum adulta = *Dolium crenulatum* Phil. Zeitschr. für Mal. 1845. pag. 148. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 66.

*Mare Japonicum et Chinense.*

Plura specimina pulla et adulta exstant ex parte magnitudine gigantea epidermide cornea laevi obducta. Ut in omnibus sui generis speciebus anfractus embryonales corneoli sunt. Variat testa adulta ore incrassato albo vel fusco. Intus haud raro varices conspiciuntur, signa certis temporibus intermissae accessionis.

*Dolium Lischkeanum* Küster.

Chemnitz Conch. Cab. ed. nova vol. 3. pag. 71. Tab. 62. fig. 1. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 57.

*Dolio maculato* Lamarckii admodum affine, sed diversum. Conferantur, quae clar. Lischke l. l. descriptioni Küsterianae jam adjunxit.

Specimen junius exstat.

*Mare Japonicum, insulae Philippinae.*

*Dolium tessellatum* Lamarek.

Enc. méth. Tab. 403. fig. 3. = *D. fimbriatum* Sowerby Gen. of Shells fig. 2. = *Le Minjac* Adans. Sénag. Tab. 7. fig. 6. *Dolium minjac* Deshayes.

Specimen minus maculis decoloratis e mari Japonico exstat.

*Dolium Chinense* Dillwyn. (Buccinum).

Cat. pag. 585. *Buccinum australe seu chinense* Chemn. Conch. Cab. vol. 11. pag. 85. fig. 1804. *Dolium Chinense* Desh. anim. sans vert. vol. 10. pag. 146. *Dolium variegatum* Phil. non Lam.

Specimen adultum integrum exstat.

Dunker, Moll. Jap. mar.

Hakodate, Yokohama, Simoda (A. Adams).

Haec species praesertim e mari Chinensi affertur.

**Dolium luteostoma Küster.**

Chemn. Conch. Cab. ed. alt. vol. 3. pag. 66. Tab. 58. Dolium Japonicum Dkr. Nov. Conch. pag. 104. Tabb. 35. et 36. (specimen pergrande). Dolium variegatum var. Küster ex parte non Lam. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 65. vol. 2. pag. 57.

Haec cochlea in mari Japonico satis frequens esse videtur. Plura specimina praesertim juniora exstant colore et pictura variabilia.

Specimina collectionis nostrae ex parte integerrima, epidermide tenuissima membranacea obducta sunt. Dolium luteostoma Küsteri in varietatem rariorem fundatum est. Exstat quoque varietas perparum maculata paene unicolor fusca.

**Dolium perdix Lin. (Buccinum).**

Syst. Nat. ed. 10. pag. 734. Testa ovata inflata, subsulcata et albo undulata, apertura edentula. Cochlea pennata Rumphii Mus. Tab. 27. fig. C. (icon rudis sinistrorsum picta ut omnes huius tabulae figurae, sed bene cognoscenda).

Species frequens et late dispersa.

Quae ex Antillis insulis adportantur specimina, multo minora esse solent, praeterea sulcis profundioribus differunt nec non maculis albis plus minusve quadratis aut tessellatis et pictura languida. Pictura vero speciminum, quae ex insulis Amboinis ceterisque insulis orientalibus originem ducunt, in anfractu ultimo semper est pennata et vividior. Clar. Mörch formam Dolii perdicis minorem denominatione Dolii pennati Martini in Cat. Conch. comitis de Yoldi pag. 110. enumeravit, sed Martini minorem et maiorem varietatem conjunxit (Conch. Cab. vol. 3. fig. 1078 et 1079), nomen Cochleae pennatae Rumphii adjungens, quae est Buccinum perdix Linnaei.

**Dolium (Cadium) pomum Lin. (Buccinum).**

Mus. Lud. Ulr. pag. 600. Syst. Nat. ed. 12. pag. 1197. Rumphii Mus. Tab. 27. fig. B. Martini Conch. Cab. vol. 2. pag. 58. fig. 370. 371. Cassis labrosa. Lamarck anim. sans vert. ed. 2. vol. 10. pag. 143.

Exemplar junius exstat ex Japonia allatum.

Cochlea in Oceano Indico, in insulis Philippinis aliisque terris haud rara.

**Genus Ringicula Deshayes.**

**Ringicula aretata Gould.**

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 7. 1860. pag. 325. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 78. Tab. 5. fig. 16. 17. magn. aucta.

Duo specimina ad Nagasaki lecta.

**Ringicula doliaris Gould.**

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 1860. pag. 324. Otia 1862. pag. 121.

Hakodate.

Haec species desideratur.

## Ficulacea.

### Genus *Ficula* Swains.

*Ficula reticulata* Lam. (Pirula).

Anim. sans vert. ed. alt. vol. 9. pag. 510. Rumphii Mus. pag. 91. Tab. 27. lit. K. A. Adams Ann. and Mag. Nat. Hist. 1870. vol. 5. pag. 430.

Specimen magnificum 83 mill. longum prope Tokio lectum exstat.

*Pirula ficoides* Lamarckii ab hac specie certis limitibus separari nequit.

*Ficula Dussumieri* Valenci.

Kien. Coq. viv. pag. 25. Tab. 2.

E mari Sinensi satis nota est; pariter in Japonia obvenire dicitur, quod quidem affirmare nequeo.

Praeterea clar. A. Adams inter Mollusca Japonica etiam *Ficulam* papyraceam Sayi enumeravit, quae mihi prorsus ignota est.

Nomen genericum *Sycotypus* Browne, si prioritatem respicimus, praeferendum est.

## Velutinacea.

### Genus *Velutina* Gray.

*Velutina cryptospira* Midd.

Reise etc. vol. 1. pars 1. pag. 216. Tab. 25. fig. 8—10.

Insulae Schantaricae.

*Velutina pusio* A. Adams.

Ann. Mag. 1860. pag. 411.

Fretum Coreanum.

## Lamellariacea.

### Genus *Lamellaria* Montagu.

*Lamellaria perspicua* Lin. (*Helix*).

S. N. ed. 12. pag. 1250. „Testa lactea, pellucida, in apicem usque perspicua, ut *Haliotis*, sed tragus non perforatus; inter *Helices* et *Bullas* media.“ Phil. Enum. Moll. vol. 1. pag. 165. Tab. 10. fig. 5. vol. 2. pag. 142. Conferantur ibidem synonyma.

Tria specimina exstant in mari Japoniae mediterraneo collecta nullo modo ab exemplaribus Europaeis discrepantia.

## Naticacea.

### Genus *Natica* Adanson.

#### *Natica taeniata* Mke.

Synopsis Moll. 1830. pag. 46. *Nerita ala papilionis minor* Chemn. Conch. Cab. vol. 5. fig. 1868—1871. *Nerita canrena* ♂ Gmel. Syst. Nat. ed. 13. pag. 3669. *Natica taeniata* Phil. *Natica* et *Amaura* in Conch. Cab. ed. alt. pag. 13. Tab. 1. fig. 12. 13.

Specimina nostra plane conveniunt cum Javanis et Chinensibus.

Haec species zonis quaternis albis fusco-tessellatis ac quidem semper eundem locum tenentibus cingitur, sed color, qui est fundamentum picturae, fulvus vel griseo-fulvus maculisve obscurioribus nebulosus est. *Natica articulata* Phil. Conch. Cab. ed. alt. pag. 119. Tab. 17. fig. 4. et 8. ex insula Zanzibar et Mari Rubro haud scio an sit pro varietate tantum cum *Natica taeniata* jungenda.

#### *Natica pellis tigrina* Chemn. (*Nerita*).

Conch. Cab. vol. 5. pag. 265. fig. 1892. 1893. exclusis plerisque synonymis. Dkr. Moll. Jap. pag. 14.

Haec species testa subglobosa colore albido-coerulescente punctisque numerosis lividis et rubro-violaceis facile cognosci potest. Puncta in speciminibus nonnullis confluunt, ita ut pictura strigata appareat.

Plura specimina exstant a clar. J. Rein lecta.

Conferatur Philippi Monographia Naticarum in Chemnitzii edit. altera pag. 20. Tab. 2. fig. 19. 20., quam pro forma typica habeo, et Tab. 15. fig. 1. et 2. varietates, quae Lamarckio sunt *Natica maculosa* et *Javanica*.

#### *Natica concinna* Dkr.

Malak. Bl. 1860. pag. 232. Moll. Jap. pag. 14. Tab. 2. fig. 21.

Portus De-shimae et Jedoënsis.

Nunc specimina majora adsunt usque ad 17 mill. alta.

#### *Natica bicincta* Schrenck.

Bullet. de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersb. vol. 5. pag. 513. Reisen und Forsch. im Amurl. vol. 2. Moll. pag. 377. Tab. 17. fig. 1—3. mag. nat. et aucta.

Haec species antecedenti affinis prope Hakodate inventa est.

### Genus *Lunatia* Gray.

#### *Lunatia clausa* Brod. et Sow. (*Natica*).

Zool. Journ. vol. 4. pag. 372. Gray Zool. of Beech. Voy. Tab. 34. fig. 3. Tab. 37. fig. 6. Middend. Reise etc. vol. 1. pars 1. pag. 208.

Insula Schantar major.

Clar. de Schrenk cum hac specie *Naticam janthostoma* jungendam esse putat, quam egomet ipse pro specie propria habeo.

*Lunatia aperta* Lovén. (Natica).

Oefvers. of Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandl., 1845. Andra Årgången, pag. 149. Cfr. Middendorff Reise etc. vol. 1. pars 1. pag. 206. Tab. 9. fig. 1—3.

*Litus insulae* Schantar majoris.

*Lunatia pallida* Brod. et Sow. (Lunatia).

Zool. Journ. vol. 4. pag. 372. 1829. Beechey's Voy. pag. 136. Tab. 34. fig. 15. = *N. borealis* Gray teste Midd. *Natica Gouldii* Phil. pariter huc pertinere videtur.

*Insula* Schantar major.

*Lunatia* (Natica) *Adamsiana* Dkr.

Tab. nostra 13. fig. 5. 6.

Malak. Bl. 1860. pag. 231. Moll. Jap. pag. 14. Tab. 2. fig. 20.

*Portus* De-shimae.

Cum icon supra citata non plane sufficiat et specimina nuperrime lecta sint multo majora fasciis fuscis binis latis in fundo cinereo lineisque obscurioribus undulatis longitudinalibus insignia, hanc cochleam iterum hic depinximus.

*Lunatia* (Natica) *janthostoma* Desh.

Rev. Zool. Soc. Cuv. 1839. pag. 361.

Clar. Lischke (Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 81.) hanc cochleam uberius tractavit.

Omnibus collectionis meae speciebus, quae affines sunt, diligenter comparatis, hanc Naticam pro specie propria declaraverim. Icon Reeveana (Conch. icon. Natica spec. 79.) satis sufficit.

In variis maris Japonici regionibus cum meridionalibus tum septentrionalibus occurrit.

**Genus *Neverita* Risso.**

*Neverita vesicalis* Phil. (Natica).

Zeitschr. für Malak. 1848. pag. 159. Chemn. Conch. Cab. ed. alt. Natica pag. 40. Tab. 6. fig. 1.

*Natica Lamarckiana* Recl. M. S. Musei Cumingiani, pariter Reeve Conch. icon. Natica spec. 6. 1855. *Natica robusta* Dkr. Moll. Jap. pag. 13. Tab. 2. fig. 24. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 80.

Cum magnam huius cochleae copiam comparare licuerit, praesertim specimina a clar. Pöhl navarcho ex Jokohama reportata, cum insuper omnes collectionis meae *Neveritas* cognatas accuratius perscrutaverim, mihi persuasum est non solum Naticam meam robustam pro varietate tantum minore et crassiore Naticae Lamarckianae aestimandam esse, sed etiam Naticam vesicalem Philippii ad hanc speciem pertinere, qua de causa hoc nomen antiquius cochleae ut reservetur necesse est.

*Natica didyma* Bolten (Phil. in Chemnitzii edit. altera Tab. 1. fig. 1—4.) nisi forte pariter eadem species, certe tamen admodum affinis est.

Operculum in nostra cochlea pervariabili ut in omnibus *Neveritis* corneum ac tenue, late spiratum est. Epidermis tenuis et decidua raro observatur.

Specimen maximum a clar. J. Rein collectum 61 mill. altum totidem fere latum est. Exemplaria nonnulla, quae clar. E. Satow in urbe Tokio Japoniae habitans, benevole mihi misit, colore vividissimo intus castaneo excellunt. Ut vir ille praestantissimus scripsit, haec cochlea a Japonis „Subeta-gahi“ nominatur.

**Neverita Reiniana Dkr.**

Tab. nostra 4. fig. 15. 16.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 71.

Testa ponderosa ovato-globosa, aperte umbilicata; anfractus quini rotundati subito crescentes. minutissime decussatim striati, ultimus striis plicisque incrementi crassioribus insignitus; spira elata acutiuscula; apertura oblique ovata; labium incrassatum; umbilicus amplius pervius, rugosus, costa lata spirali quasi funiculi instar pariter rugosa instructus; callus spiralis latus resupinatus anticam costae partem complectens; color testae cinereo-rufescens, infra suturam pallide rufus, labium superne inferneque album medio fuscum; fauces rufae. — Alt. 56, lat. 46 mill.

Haec species forma ovato-globosa, pondere atque callo resupinato costam umbilici complectente insignis, a ceteris Neveritis nunc notis facile distingui potest.

**Neverita incisa Dkr. (Natica).**

Chemn. Conch. Cab. ed. alt. Natica pag. 81. Tab. 12. fig. 8. (color iconis nimis vividus est).

Mare Chinense. Specimina nostra Japonica nondum adulta sunt.

**Genus Ruma Chemn.**

**Ruma simiae Chemn.**

Conch. Cab. vol. 5. pag. 285. Tab. 189. fig. 1938. Natica simiae Desh. Lam. anim. sans vert. vol. 8. pag. 552. Reeve Conch. icon. Natica spec. 76. (exemplar giganteum).

Specimina minora exstant.

Varietas huius speciei a clar. Recluz male „simioides“ appellata est.

**Genus Uber Humphr. \*)**

**Uber Powisianum Recl. (Natica).**

Proc. Zool. Soc. 1843. pag. 210. Phil. in Chemn. Conch. Cab. ed. 2. pag. 46. Tab. 7. fig. 4.

Haec species Naticae pedi elephantis Chemn. affinis est, sed habitu, colore et umbilici formatione differt.

Specimen integrum nitidum exstat. In umbilico ejus epidermidis atro-fuscae vestigia conspiciuntur.

Jokohama.

**Uber Draparnaudii Recl. (Natica).**

Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 74.

Nagasaki.

**Uber mamilla Lin. (Nerita).**

Syst. Nat. ed. 10. pag. 776. ed. 12. pag. 1252. Chemn. Conch. Cab. vol. 5. pag. 280. Tab. 189. fig. 1928. 1929. inclusis figg. 1930. 1931. Phil. l. c. pag. 32. Tab. 4. fig. 9. 10. (Natica ponderosa).

Plurima specimina minora nonnullaque majora ad Jokohama lecta exstant maximam partem fascia pallide flava spiram cingente insignia. Quamvis in hac specie color penitus lacteus desi-

---

\*) Genus Mamma Klein. non est adoptandum, cum diversissimae cochlides huc pertineant.



deretur, tamen testas nostras pro varietatibus habeo. Pariter Naticam ponderosam Phil. nec non Naticam piriformem Recl. (cfr. Phil. l. c. pag. 60.) huc refero, cum inter nostra specimina nonnulla eadem forma inveniantur.

Ut Philippi in descriptione Naticae Mamillae recte monet, Linnaeus nomine Neritae mamillae plures species conjunxit.

### **Genus Naticina Gray.**

#### **Naticina papilla Gmel. (Nerita).**

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3675. Papilla seu ruma felis Chemn. Conch. Cab. vol. 5. pag. 235. fig. 1939. etc.

Plura specimina forma latiore et angustiore variantia exstant. Statu integro testa epidermide tenui cornea vestita est. A nonnullis conchyliologis cum Sigaretis vel Catinis jungitur. Respectu habito testae cochlea nostra inter Rumas et Sigaretos locum tenet, ad Sigaretos vero propius accedere videtur quam ad Rumas. De incola Naticinae conf. A. Adams notes on the animals of certain genera of Mollusca in Ann. and Mag. Aug. 1860. pag. 109.

### **Genus Sigaretus Lam.**

#### **Sigaretus insculptus Adams et Reeve.**

Zool. Voy. Samar. Moll. pag. 55. Tab. 13. fig. 10.

Specimen maximum prope Wakayama maris Japoniae mediterranei lectum, 52 mill. latum est.

Haec species costis planatis plus minusve distantibus et interstitiis plano-cavatis, sculptura omnino asperiore spiraque prominula nec non apice lividescente potissimum cognoscitur. Epidermis pallide cornea decidua plerumque dehiscit.

Specimina nostra Sinensia multo minora sunt.

Sigaretus Leachii (Cryptostoma) de Blainv. (Sow. Gen. of Shells no. 19. Reeve Conch. syst. vol. 2. pag. 39. Tab. 148. fig. 3.) quod attinet ad sculpturam analogus est, sed spira depressiore alba differt.

#### **Sigaretus undulatus Lischke.**

Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 54. Tab. 3. fig. 11—14.

Sigareto depresso Philippii affinis atque adeo depressior est.

Plura specimina congruentia exstant.

#### **Sigaretus Japonicus Lischke.**

Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 55. Tab. 3. fig. 15—17.

Specimen unicum a clar. Lischke acceptum.

### **Genus Amaurella A. Adams.**

Clar. auctor speciem huius generis typicam in Ann. and Mag. of Nat. Hist. 1860. pag. 407. nomine Macrocheili Japonici descripsit annotans, cochleolam habitu Macrocheilo acuto Phill.

similem esse; sed posterius genus proprium Amaurellam dictum in hanc cochleam fundavit ob ejus affinitatem arctiorem cum Amaura Mölleri. Genus Macrocheili fossile e stratis tantum antiquis transitionis scilicet et carbonariae notum, in formationibus terrae recentioribus quod sciam nullibi inventum est, ita ut ex antiquissimo tempore jam extinctum esse videatur.

Generis Amaurellae nunc tres notae sunt species Japonicae.

*Amaurella Japonica* A. Ad.

Fretum Coreanum.

*Amaurella glabrata* A. Ad.

Takano-shima, et

*Amaurella semistriata* A. Ad.

Cfr. Proc. Zool. Soc. 1867. pag. 311.

Oki-no-shima.

## Cassidea.

### Genus Cassis Lam.

*Cassis cornuta* Lin. (Buccinum).

Syst. Nat. ed. 10. Mus. Lud. Ulr. pag. 602. Syst. nat. ed. 12. pag. 1198. Rumphii Mus. Tab. 23. fig. A. *Cassis labiata* Chemn. Conch. Cab. vol. 11. pag. 71. fig. 1790.

Nagasaki. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 62.

Specimen minus exstat.

*Cassis rufa* Lin. (Buccinum).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 736. Rumphii Mus. Tab. 23. fig. B. *Cassis rubra* fig. C. *Cassis pennata* = *Buccinum pennatum* Gmel. Syst. Nat. ed. 13. pag. 3476.

In litore Africano orientali, in Molluccis et Philippinis insulis aliisque regionibus haud raro obvenit magnitudine maximopere variabili. Exstant in collectione nostra exemplaria plane adulta *Casside* testiculo Lin. parum majora, ex altera parte specimina gigantea 140—175 mill. longa.

*Cassis pennata* Rumphii (*Buccinum pennatum* Gmelini) est testa nostrae speciei juvenis. Specimen minus Japonicum exstat.

*Cassis pila* Reeve.

Conch. icon. vol. 5. Tab. 9. spec. 21. Chemn. Conch. Cab. ed. alt. Tab. 51. fig. 7. 8.

Haec species maris Chinensis et Japonici satis frequens saepius cum *Casside saburon* Lam. commixta est Conferantur quae Lischke in Moll. Jap. vol. 1. pag. 63. de utraque cochlea fusius jam disseruit.

*Cassis Japonica* Reeve.

Conch. icon. vol. 5. Tab. 9. spec. 23.

Plura specimina magnitudine et pictura vivida insignia clar. J. Rein legit.

Plerumque varicibus instructa est, quae in *Casside pila* rarius obvenire videntur, sed multis speciminibus diligenter collatis persuasum mihi est hanc speciem ab antecedente certis finibus vix

distingui posse, praesertim cum Cassides generatim spectatae admodum variabiles sint. — Specimen exstat parvum ac ponderosum Cassidem suburon aliquo modo in mentem revocans. De incola Cassidis Japonicae cfr. A. Adams in Ann. and Mag. Nat. Hist. Apr. 1862. pag. 297.

*Cassis coronulata* Sow.

Tankerv. Cat. app. pag. 20. Reeve Conch. icon. vol. 5. spec. 31. *Cassis glauca* juv. Kien. Icon. des Coq. viv.

Specimen unicum.

Haec cochlea jam ex longo tempore pro varietate Cassidis glaucae (*Cassideae glaucae* Brug. vel *Bezoardicae vulgaris* Schum.) habita est, donec clar. Sowerby in Tankerv. Cat. eam pro specie diversa et genuina nomine Cassidis coronulatae a Casside glauca (*Buccino glauco* Linnaei) separavit.

E magna harum testarum serie, quae in collectione nostra exstat, perspicui potest utramque speciem quidem valde affinem esse, Cassidem coronulatam interdum quoque formam turgidam Cassidis glaucae plane ostendere, nihilo minus tamen *Cassis coronulata* spinis brevioribus ternis non quaternis, quibus antica labri pars munita est, nec non maculis magnis pallide fuscis subquadratis, in series ordinatis a Casside glauca constanter differre videtur. — Operculum corneum parvum tenue et angustum generatim spectatum operculo Cassidis glaucae simillimum est.

Nuperrime haec cochlea etiam ex insulis Samoë allata est. Japoni eam „Ibo hora“ nominant.

*Cassis strigata* Gmel. (*Buccinum*).

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3477. Chemn. Conch. Cab. vol. 10. fig. 1457. 1458. = *Cassis Zebra* Lam. anim. sans vert. vol. 10. pag. 28. (conf. nota). = *Cassidea arcola* Brug. non *Buccinum arcola* Lin.)

Specimina huius cochleae juniora sulcos transversos plus minusve expressos ostendere solent, qui sulci aetate proveciore sensim evanescent, ita ut in parte testae anteriore tantummodo appareant qua de causa cochlea adulta saepius tota paene laevigata est excepta quidem spira decussata et fronte sulcata. Hunc statum adultum optime jam pinxerunt Rumphius in Musei Tab. 25. no. 2. et Chemnitzius in Conch. Cab. vol. 10. fig. 1457. 1458. Ceterum conferantur Lischke Moll. Jap. vol. 3. pag. 43.

Inter plura specimina Japonica unum exstat varietatis tumidioris, quae toto anfractu ultimo transversim confertimque sulcata est.

*Cassis vibex* Lin. (*Buccinum*).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 737. Mus. Lud. Ulr. pag. 606.

Cochlea frequentissima omnibus nota magnitudine admodum variabilis. Duplex exstat eiusdem varietas primaria: maior tota laevis, minor testa multo crassiore anfractibus superne nodoso-plicatis instructa, quae est *Buccinum Erinaceus* Linnaei. Utramque varietatem jam bene delineavit Rumphius Mus. Tab. 25. figg. 7. 8. 9.

Plura specimina adsunt.

Japoni hanc cochleam „Ame gai“ nominant.

*Cassis pirum* Lam.

Anim. sans vert. ed. alt. vol. 10. pag. 33. = *Cassis Zeylonica* Lam. Reeve Conch. icon. spec. 29.

Species forma et crassitudine admodum variabilis.

Dunker, Moll. Jap. mar.

Specimen unicum parvulum exstat testa flavescente omnino laevigata sine ullo nodorum vestigio.

Africa australis (sinus Algoensis), litus Ceylonicum, Nova Hollandia.

Genus Cassidum sensu Lamarckiano sumsi, quamvis genera in hanc vel illam speciem fundata, respicienda mihi videantur. Operculi structura et formatio in singulis speciebus valde diversa est. Cassis rufa operculo plane caret.

## Scalariacea. \*)

### Genus *Scalaria* Lam.

#### *Scalaria Pallasii* Kien.

Coq. viv. Tab. 2. fig. 3. Sow. Thes. Conch. vol. 1. pag. 83. Tab. 32. fig. 16. Turbo principalis Pallasii esse dicitur. Conf. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 73.

Icones Thesauri minores 14 et 15 a clar. Sowerby pro varietatibus tantum habitas clar. Mörch (Cat. Yoldi pag. 48.) pro speciebus propriis declaravit, iconem enim 14 *Scalariam Nicobaricam* Beckii repraesentare affirmat, figuram 15 *Scalariam ferrugineam* nominavit.

Praeter specimina collectionis nostrae ex Amboinis insulis allata exemplar pulcherrimum adest Japonicum sine certa quidem indicatione loci natalis. Clar. A. Adams hanc speciem in freto Coreano cepit, H. Cuming in insulis Philippinis.

#### *Scalaria aculeata* Sow.

Proc. Zool. Soc. 1844. pag. 12. Thes. Conch. vol. 1. pag. 86. fig. 35—37. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 51.

Species in terrarum orbe late dispersa.

Unum specimen exstat.

#### *Scalaria replicata* Sow.

Proc. Zool. Soc. 1844. Thes. Conch. vol. 1. pag. 84. fig. 23. 24. A. Adams in Ann. Mag. Nat. Hist. Dec. 1861. pag. 479.

Mino-shima, A. Adams.

Duo specimina adsunt iconibus supra laudatis paululum minora.

#### *Scalaria obliqua* Sow.

Thes. Conch. pag. 89. fig. 69.

Mino-shima, A. Adams.

Specimen unicum haud adultum huc pertinere videtur.

#### *Scalaria muricata* Kien.

Coq. viv. Tab. 4. fig. 11. Sow. Thes. Conch. pag. 86. fig. 29. 31. 32.

Mino-shima, A. Adams.

Teste clar. Sowerby frequens invenitur in mari Indiae orientalis.

---

\*) In enumerandis *Scalariarum* speciebus Japonicis ordinem Adamsianum secutus sum, sed quaeritur num. genera et subgenera sic dicta Adamsiana satis firmata sint ut respiciantur.

*Scalaria pulcherrima* Sow.

Thes. Conch. vol. 1. pag. 97. Tab. 34. fig. 92. A. Adams in Ann. Mag. Nat. Hist. 1861. pag. 480.

Mino-shima.

Specimen quod exstat decoloratum huc pertinere videtur.

*Scalaria lineolata* Sow.

Thes. Conch. pag. 91. fig. 45. 46. 48.

Conferantur quae clar. Lischke de hac specie attulit. (Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 50.)

*Scalaria Japonica* Dkr.

Moll. Jap. pag. 13. Tab. 1. fig. 13.

Portus De-shimae.

*Scalaria angusta* Dkr.

Moll. Jap. pag. 13. Tab. 1. fig. 11.

Portus De-shimae.

Color in figuris nigrescens, quia pictor, ut colorem album exprimeret, plumbo carbonico usus est, quod facile mutatur.

*Scalaria lyra* Sow.

Thes. Conch. vol. 1. pag. 89. fig. 38. 39. 81. 82. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 168. vol. 3. pag. 51.

Tria specimina exstant fasciis duabus plus minusve distinctis picta.

*Scalaria aurita* Sow.

Proc. Zool. Soc. 1844. pag. 26. Thes. Conch. vol. 1. pag. 92. fig. 62.

Specimina pulcherrima ex parte fasciis vivide fuscis picta exstant, quae iconem Sowerbyanam magnitudine multo superant.

*Scalaria immaculata* Sow.

Proc. Zool. Soc. 1844. pag. 26. Thes. Conch. pag. 93.

Tria specimina exstant icone Sowerbyana multo majora.

Species peculiaris, gracilis, tenuis, minutissime transversimque striata, colore albo languido, haud splendente, varicibus plerumque tenuissimis et confertissimis insignis.

*Scalaria acuminata* Sow.

Proc. Zool. Soc. 1844. pag. 31. Thes. Conch. vol. 1. pag. 106. fig. 130. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 52.

Sinus Jedoënsis, insulae Philippinae.

Praeterea clar. Adams has Scalariarum species in Mari Japonico obvias enumeravit, fere omnes in freto Coreano profundo captas. (Scalidae of the Sea of Japan. Ann. and Mag. Nat. Hist. Dec. 1861. pag. 479).

*Scalariam (Scalam) rubrolineatam* Sow.

Thes. Conch. vol. 1. pag. 91. fig. 83. 84.

*Scalariam* (*Scalam*) *turriculam* Sow.

Thes. Conch. pag. 92. fig. 61. 88.

*Scalariam* (*Scalam*) *irregularem* Sow.

Thes. pag. 90. fig. 40. 60.

*Scalariam* (*Scalam*) *trabeculatam* A. Ad.

Ann. Mag. etc. 1861. pag. 480.

*Scalariam* (*Scalam*) *fimbriatam* A. Ad.

ibid.

*Scalariam* (*Scalam*) *optabilem* A. Ad.

ibid.

*Scalariam* (*Scalam*) *elegantulam* A. Ad.

ibid. pag. 481.

*Scalariam* (*Scalam*) *spiralem* A. Ad.

ibid.

*Scalariam* (*Scalam*) *praeclaram* A. Ad.

ibid.

*Scalariam* (*Scalam*) *liliputanam* A. Ad.

ibid.

Hisce speciebus adjiciendae sunt:

*Scalaria* (*Scala*) *soluta* A. Ad.

Mense Apr. a. 1862. in Ann. and Mag. pag. 296. descripta.

*Cochleola concinna anfractus solutos* formamque *Scalariae hyalinae Hindsii* et *varices simplices Scalariae laxatae Sowerbyi* repraesentat.

In Portu Lindsay capta est. Praeterea:

*Scalaria* (*Clathrus*) *hexagona* Sow.

Thes. Conch. pag. 198. fig. 67.

Awa-shima.

*Scalaria* (*Clathrus*) *Elenensis* Sow.

Thes. pag. 98. fig. 102. A. Ad. Ann. and Mag. 1861. pag. 482.

Mino-shima.

*Scalaria exquisita* A. Ad. (*Opalia*).

Ann. Mag. Apr. 1864. pag. 310.

Goto.

*Scalaria Ochotensis* Middend.

Reise etc. vol. 1. pars 1. pag. 213. Tab. 12. fig. 12—14. Beitr. zu einer Malacz. Rossica vol. 2. pag. 98.

*Sinus Nichta* in litore *Maris Ochotensis australi*.

Differt a *Scalaria Groenlandica*.

**Genus Amaea H. et A. Adams.**

*Amaea magnifica* Sow. (Scalaria).

Thes. Conch. pag. 102. fig. 103. A. Ad. l. c. pag. 482.

Mino-shima.

Species sane magnifica rarissima pariter in Mari Chinensi obvenit.

*Amaea Sowerbyi* Dkr.

*Scalaria decussata* Sow. (non Lam.) Thes. Conch. vol. 1. pag. 103. fig. 140. *Amaea decussata* A. Ad. l. c. pag. 482.

Mino-shima, fretum Coreanum.

*Scalaria decussata* Lamarckii in speciem telluris tertiariae fossilem fundata est, quae valde abhorret a nostra cochlea; inde nomen mutatum est.

**Genus Cirсотrema Mörch.**

*Cirсотrema sulcatum* Sow. (Scalaria).

Thes. Conch. pag. 95. fig. 111. A. Adams l. c. pag. 482.

Mino-shima et insulae Philippinae.

*Cirсотrema bicarinatum* Sow. (Scalaria).

Thes. pag. 104. fig. 113. 114. A. Adams l. c. pag. 482.

Mino-shima, insulae Philippinae.

*Cirсотrema suturale* Hinds. (Scalaria).

Sow. Thes. pag. 106. fig. 120. A. Ad. l. c. pag. 483.

Fretum Coreanum, paeninsula Malacca (Chersonesus aurea).

*Cirсотrema undulatum* Sow. (Scalaria).

Thes. pag. 104. fig. 136. A. Adams l. c. pag. 483.

Fretum Coreanum, Sow.

*Cirсотrema crassilabrum* Sow. (Scalaria).

Thes. pag. 105. fig. 115. 116. A. Adams l. c. pag. 183.

Mino-shima, insulae Philippinae, H. Cuming.

*Cirсотrema cribrarium* A. Adams.

l. c. pag. 483.

Tsu-shima.

*Cirсотrema Turbonilla* A. Adams.

ibid.

Mino-shima.

**Genus Crossea A. Adams.**

*Crossea miranda* A. Adams.

Ann. and Mag. etc. Apr. 1865. pag. 323. Journ. de Conch. vol. 16. pag. 55. Tab. 4. fig. 9.

Insula Goto.

*Crossea bellula* A. Adams.

Ann. and Mag. l. c. Journ. de Conch. vol 16. pag. 56. Tab. 4. fig. 10.

Insula Goto.

Adamsius opinatur has cochleolas Scalariaceis adjungendas esse.

**Genus Constantia A. Adams.**

*Constantia elegans*, A. Adams.

Ann. Nat. Hist. 1860. vol. 5. pag. 300. ibid. Dec. 1861. pag. 483.

Fretum Coreanum prope Mino-shima.

*Constantia Tantilla* A. Adams.

Ann. Mag. Dec. 1861. pag. 483.

Tabu-shima.

Hae species Adamsianae sine indicio mensurae breviter descriptae, plurimis conchyliologis certe dubiae, nullibi, quantum scio, depictae sunt. Species nonnullae collectionis nostrae in indice Adamsiano desiderantur, ex. gr. *Scalaria aurita*, *immaculata*, *Japonica* aliaequae.

**Terebracea.**

**Genus Terebra (Adans.) Lam. \*)**

*Terebra maculata* Lin. (Buccinum).

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1205. Rumphii Mus. Tab. 30. fig. A. Martini Conch. Cab. vol. 4. fig. 1440.

Lam. anim. sans vert. vol. 10. pag. 238. Reeve Conch. icon. *Terebra* spec. 4.

Exemplar minus huius speciei, maximae sui generis, quod Hamburgi quondam adeptus sum, Japonicum esse affirmabatur, qua de causa hanc speciem inter Mollusca Japonica hic numero etsi aliquo modo incertus.

*Terebra muscaria* Lam.

Cfr. Lamarck anim. sans vert. vol. 10. pag. 241. Reeve Conch. icon. *Terebra* spec. 9.

Specimen minus inter Mollusca Japonica adest.

---

\*) Adansonius cum *Terebra* Senegalensi „le Faval“ varia cochlidum genera conjunxit, inde hoc genus sensu Lamarckiano sumsi, divisiones Adamsianas haud respiciens, cum certe terminari nequeant. In „the genera of recent Mollusca“ vol. 1. pag. 224. ita dispertiuntur: 1. *Acus* Humphr. cum subgeneribus *Abretia*, *Hastula* et *Euryta*, 2. *Terebra* Adans. cum subgenere *Myurella*. Pariter Deshayesius has cochleas pervarias difficile decernendas disponere tentavit. Proc. Zool. Soc. 1859. pag. 275.



*Terebra evoluta* Desh.

Proc. Zool. Soc. 1859. pag. 292. Reeve Conch. icon. spec. 55.

Haec species a Deshayesio in exemplar collectionis Cumingianae unicum fundata, *Terebrae* Dussumieri Kien. quidem admodum affinis est, sed statura graciliore multo minore nec non sulco profundiore differt. Nihilo minus tamen quaeritur utrum sit species propria, an potius varietas tantum Japonica *Terebrae* Dussumieri. Ad hanc quaestionem solvendam major speciminum copia desideratur.

*Terebra flammea* Lam.

Anim. sans vert. vol. 10. pag. 239. Reeve Conch. icon. spec. 13.

Specimen grande adest.

Mare Japonicum (et Chinense).

*Terebra pretiosa* Reeve.

Proc. Zool. Soc. 1842. pag. 200. Conch. icon. *Terebra* spec. 30. fig. 30 a. optima.

Unum specimen magnum pulcherrimum.

Mare Japonicum (et Chinense).

*Terebra subulata* Lin. (*Buccinum*).

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1205. Lam. anim. sans vert. vol. 10. pag. 242.

Specimen minus exstat jam antea ex Japonia acceptum. Cochlea multis in regionibus obvia.

*Terebram* consobrinam Deshayesii (Journ. de Conch. vol. 6. pag. 72. Tab. 3. fig. 3.) e mari rubro pro varietate tantum *Terebrae* subulatae aestimandam esse mihi persuasissimum est.

*Terebra strigilata* Lin. (*Buccinum*) var?

Syst. Nat. ed. 10. pag. 714. Mus. Lud. Ulr. pag. 614. (icon. Rumphiana H. Tabulae 30 a Linnaeo citata minime quadrat). Born Test. Mus. Vind. pag. 264. Tab. 10. fig. 10. Lam. anim. sans vert. vol. 10. pag. 248.

Collectio Molluscorum nostra Japonica *Terebram* parvulam continet, quam pro varietate *Terebrae* strigilatae declaraverim, etsi tamen dubitatione quadam. Quamvis enim color et picturae indoles bene quadrare videantur, tamen testa parva multo gracilior acute striata valde discedit a forma typica *Buccini* strigilati, quam fig. 10. Borniana optime refert. Pariter dubitaverim num *Terebra* Verrauxii Desh., quam clar. Reeve et Lischke cum *Terebra* strigilata jungendam esse censent, huc pertineat. Specimina huius cochleae splendidissimae quasi murrinae exstant nonnulla in Molluscorum collectione nostra, quae descriptioni Deshayesianae (Journ. de Conch. vol. 6. pag. 95.) optime respondent et inter se congruunt. — Multa in conchyliologia incerta manebunt donec bestiolae testarum cognitae erunt. Conferantur quae clar. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 40. de *Terebra* strigilata admodum variabili jam dixit.

*Terebra Lischkeana* Dkr.

Tab. nostra 5. fig. 13—16. var.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 74.

Testa subulata acuta, fascia alba supera, fusca vel coerulescente, infera quasi bipartita, anfractibus 17—18 modice convexis, sutura distincta separatis, longitudine costatis instructa; costae

laeves; intervalla transversim denseque striata; sulcus infra suturam exilis, in costarum interstitiis punctulis pertusus; apertura oblonga; columella subrecta fusca; canalis brevis; apex purpureo-fuscus nitidus. Specimina maxima plane adulta 35 mill. longa sunt.

Plura specimina exstant congruentia.

Haec cochlea cum nulla quae hucusque descriptae sunt, Terebrarum specie conveniens, pictura et sulco infra suturam exili, in costarum intervallis punctis pertuso imprimis insignitur. In speciminibus nonnullis fascia fusca maculis vividioribus variegata est. Omnia lineam albam plus vel minus perspicuam in fronte ostendunt.

Hanc speciem gracilem amico C. E. Lischke dedicatam esse volui.

#### *Terebra bifrons* Hinds.

Proc. Zool. Soc. 1843. pag. 155. Sowerby Thes. Conch. vol. 1. pag. 174. Tab. 43. fig. 57. Reeve Conch. icon. spec. 62.

Haec cochlea jam ex longo tempore a clar. Siebold ex Japonia reportata, ad rariores Terebrarum species pertinere videtur. Testa ejus turrato-subulata, anfractibus parum convexis, superioribus longitudine plicatis, sulco mediano divisus, ultimo tertiam totius altitudinis partem paene aequante, seriebus granorum inaequalibus multis (14—16) cincto, canali brevi lato truncato, columella vix contorta nec non colore badio imprimis insignitur. Icon Reeveana optima est, pariter Sowerbyana ad minorem modum redacta, abunde sufficit.

Duo specimina congruentia exstant.

#### *Terebra Loebbeckeana* Dkr.

Tab. nostra 5. fig. 17. 18.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 74.

Testa longa, gracilis, alba fascia lata interrupta pallide fusca cincta, anfractibus circa 30 sutura distincta divisus, parum convexis, oblique costulatis transversimque striatis, subgranosis, superne sulco divisus instructa; apertura angusta; columella parum contorta; canalis subcurvus. — Alt. 75 mill. diam. max. vix 10 mill.

Unicum tantummodo specimen inter Mollusca Japonica exstat notis nonnullis Terebrae Limae Desh. respondens, sed altera ex parte ab ea satis discrepans. Testa enim differt primo habitu graciliore, secundo superficie minus aspera, tertio praesertim eo, quod costa spiralis infra suturam sulco perspicuo formata, non est granosa, sed plicata, ita ut plicae longitudinales sulco isto tantummodo interruptae appareant.

Haec species amico Theodoro Loebbecke Molluscorum sedulo scrutatori dicata est.

#### *Terebra triseriata* Gray.

Tab. nostra 5. fig. 19. 20.

Proc. Zool. Soc. 1834. pag. 61. Sowerby Thes. Conch. vol. 1. pag. 171. Tab. 45. fig. 119. Reeve Conch. icon. spec. 52a. b.

Beatus H. Cuming hanc cochleam e Philippinis insulis et mari Sinensi primus attulit.

Duo specimina integerrima in Japonia lecta exstant. Cum icon Sowerbyana, secundum exemplar incompletum picta, haud sufficiat et figurae Reeveanae paulum differant a nostris speciminibus, alterum integritatis causa hic depictum est.

Omnium specierum hucusque notarum gracillima gyrisque plurimis (46—48) instructa est. Anfractus plani, paene cavati, serie nodorum triplici, media maxima, infera minore, supera minima,

costulisque quaternis graniferis inaequalibus cinguntur; apertura parva subquadrata; columella antice producta; canalus latus aliquantulum resupinatus. Apex acutus anfractibus constat primordialibus quatuor laevissimis et nitidis. Color totius testae pallide aurantius vel stramineus.

*Terebra serotina* Hinds. (*Myurella*).

Adams et Reeve Voy. Samarang pag. 30. Tab. 10. fig. 20. Reeve Conch. icon. *Terebra* spec. 66.

Japonia Belcher. Nagasaki.

Specimen nostrum 45 mill. longum cum figuris et descriptionibus supra laudatis convenit, sed addendum est, apicem in hoc specimine integerrimum obtusiusculum, suboblique tortum, glabrum et nitidum testamque maculis nonnullis pallide fuscis fasciaeque infera albida pellucente signatam esse. Varietas gracilior in collectione Loebbeckeana Dusseldorpii exstat.

*Terebra torquata* Adams et Reeve (*Myurella*).

Voy. Samarang pag. 30. Tab. 10. fig. 13. Reeve Conch. icon. *Terebra* spec. 69.

Specimen unum integrum exstat 46 mill. longum prope Nagasaki lectum.

Haec cochlea antecedenti similis est, sed testa latiore, nodorum seriebus tribus, binis superioribus et una infera minore, costulis longitudinalibus striisque transversis cancellata omnino sculptura asperiore differt.

*Terebra Gotoënsis* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 183. Tab. 19. fig. 1. 1a.

Species variabilis in freto Coreano indigena.

*Terebra Jeffreysii* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 184. Tab. 19. fig. 2.

Species solidula lutea 25—26 mill. longa, anfractibus primordialibus insolite crassis insignita.

*Terebra textilis* Hinds.

Proc. Zool. Soc. 1843. pag. 156. Sow. Thes. Conch. vol. 1. pag. 177. Tab. 44. fig. 73. Smith Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 184.

Japonia australis.

*Terebra subtextilis* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 185. Tab. 19. fig. 3.

Insula Shikoku.

Antecedenti cognata testa majore, solidiore, colore albo aliisque notis differt.

*Terebra tantilla* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 185. Tab. 19. fig. 4.

*Myurella pumilio* Smith (Ann. Mag. etc. 1873. vol. 11. pag. 269.) auctore ipso affirmante eadem est species.

*Terebra albozonata* Smith.

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 185. Tab. 19. fig. 5.

Species fusca taenia alba cincta.

Kiushiu.

Dunker, Moll. Jap. mar.

*Terebra fulgurata* Phil.

Zeitschr. für Mal. 1846. pag. 53. Reeve Conch. icon. *Terebra* spec. 151. = *Terebra arguta* Gould.  
Mex. and Calif. Shells. pag. 7. Tab. 14. fig. 19.

Haec species *Terebrae* aciculatae Lam. Maris mediterranei cognata, antea e litore Californiano tantum nota, nec minus in freto Tatarico inventa est. Cfr. Schrenck Amurl. Moll. pag. 450.

Ad *Eurytas* fratrum Adams pertinet.

Praeterea hae *Terebrarum* species pariter in Mari Japonico obvenire dicuntur:

*Terebra blanda* Desh.

Proc. Zool. Soc. 1859. pag. 298. Reeve Conch. icon. *Terebra* spec. 117.

*Terebra Dillwyni* Desh.

Journ. de Conch. 1857. Reeve Conch. icon. *Terebra* spec. 74.

*Terebra tristis* Desh.

Proc. Zool. Soc. 1859. pag. 306. Reeve Conch. icon. *Terebra* spec. 102.

*Terebra solida* Desh.

Journ. de Conch. vol. 6. pag. 78. Tab. 3. fig. 11. Reeve Conch. icon. *Terebra* spec. 123.

Pyramidellacea.

Genus *Obeliscus* Humphrey.

*Obeliscus pulchellus* A. Adams.

Sow. Thes. vol. 2. pag. 808. Tab. 171. fig. 20. *Pyramidella pulchella* Reeve Conch. icon. spec. 24.  
Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 57.

Plura specimina adsunt in Mari Japoniae mediterraneo et sinu Jedoënsi lecta.

Nescio qua de causa Clar. Adamsius hanc speciem inter *Obeliscos* enumeraverit, cum ejus notae omnibus partibus *Syrnolis* respondeant. Specimina nostra plica unica instructa sunt, in uno tantum plica altera vix indicata est.

*Obeliscus teres* A. Adams.

Sow. Thes. vol. 2. pag. 807. Tab. 171. fig. 31. 32. A. Adams on Japanese *Obeliscinae* in Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 232.

Specimen detritum exstat.

Praeterea Adamsius l. l. pag. 232. has *Obeliscorum* species Japonicas enumeravit:

*Obeliscum balteatum* A. Ad.

Sow. Thes. Tab. 171. fig. 25.

Yobuko, Uraga.

*Obeliscum pusillum* A. Ad.

Sow. Thes. Tab. 171. fig. 7.

O-shima, Takano-shima.

*Obeliscum eburneum* A. Ad.

l. c. pag. 232.

O-shima.

Speciem albam, solidulam, anfractibus hinc atque illinc in longitudinem sulcatis.

*Obeliscum nitidulum* A. Ad.

Thes. Tab. 171. fig. 7.

Mino-shima.

*Obeliscum trifasciatum* A. Ad.

Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 232.

Uraga, Mososeki.

Speciem antecedenti simillimam, quae fasciis tribus differt.

*Obeliscum vitreum* A. Ad.

Mino-shima, Uraga, Tsu-shima.

Hanc et speciem quae antecedit, Adamsius antea (Ann. Mag. Nat. Hist. Nov. 1860. pag. 335). Syrnolis suis aggregavit, quod comprobaverim, cum notae allatae universe respondeant. Genus enim Syrnolarum in Obeliscos graciles, nitidos, vitreos, anfractibus planis, sutura incisa et unica tantum columellae plica instructos fundatum est. Nihilo tamen minus hae cochleolae quod attinet ad earum habitum et structuram tam arte cum Obeliscis conjunctae sunt, ut necessario separandae esse mihi non videantur.

His addendi sunt:

*Obeliscus solidulus* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 233. Moll. Jap. pag. 15. Tab. 1. fig. 5. magn. aucta.

*Obeliscus hyalinus* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 233. Moll. Jap. pag. 15. Tab. 1. fig. 9. magn. aucta.

Utraque species in Portu De-shimae lecta.

*Obeliscus tenuisculptus* Lischke.

Malak. Bl. vol. 19. pag. 102. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 58. Tab. 3. fig. 7. 8.

E sinu Jedoënsi.

**Genus Syrnola A. Adams. \*)**

Clar. auctor has Syrnolarum species Japonicas distinxit:

*Syrnolam gracillimam* A. Ad.

Ann. Mag. vol. 5. 1860. pag. 405. Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 233.

Mino-shima, Uraga.

*Syrnolam cinctellam* A. Ad.

Ibid. 1860. vol. 6. pag. 333. Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 233.

O-shima, Seto-Uchi.

*Syrnolam meram* A. Ad.

Ann. Mag. 1860. vol. 6. pag. 334. Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 233.

Mino-shima, O-shima.

*Syrnolam teretiusculam* A. Ad.

Ann. Mag. Nov. 1860. pag. 334. Proc. Zool. Soc. l. l.

Tsu-shima.

---

\*) Cfr. quae de Obelisco vitreo allata sunt.

*Syrnolam pupinam* A. Ad.

Ann. Mag. 1860. vol. 6. pag. 334. Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 334.

Mososeki, Mino-shima.

*Syrnolam pyramidalem* A. Ad.

Ann. Mag. 1860. vol. 6. pag. 334. Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 233.

Tsu-shima.

*Syrnolam bizonalem* A. Ad.

Ann. Mag. 1860. vol. 6. pag. 334. Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 233.

Mino-shima.

*Syrnolam elegantem* A. Ad. (Obeliscum).

Sow. Thes. pag. 808. Tab. 171. fig. 19. Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 233.

O-shima, Seto-Uchi.

*Syrnolam brunneam* A. Ad. (Obeliscum).

Sow. Thes. pag. 810. Tab. 171. fig. 35. Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 233.

O-shima.

*Syrnolam aciculatam* A. Ad. (Obeliscum).

Sow. Thes. pag. 809. Tab. 171. fig. 21. Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 233.

Tanabe.

*Syrnolam striatulam* A. Ad. (Obeliscum).

Sow. Thes. pag. 812. Tab. 171. fig. 29. Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 233.

Seto-Uchi.

*Syrnolam buxeam* Gould (Obeliscum).

Otia Conch. pag. 147. Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 234.

Takano-shima.

*Syrnolam lacteam* A. Ad.

Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 234.

O-shima.

Est species solidula lactea in anfractu ultimo angulata, sutura exarata.

*Syrnolam serotinam* A. Ad.

Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 234.

Takano-shima.

Species parvula, pallide aurantia.

*Syrnolam subulinam* A. Ad.

Proc. l. l.

Takano-shima.

*Syrnolae cinctellae* similis est, sed magis subulata, in anfractu ultimo angulata.

*Syrnolam pistillum* A. Ad.

Proc. l. c.

Yobuko.

Species solidula lactea transverse minutimque striata.

*Syrnolam Cylindrellam* A. Ad.

Proc. l. c.  
Takano-shima.

*Syrnolam columellam* A. Ad.

l. c. pag. 235.  
Seto-Uchi, Mososeki.

*Syrnolam daedalam* A. Ad.

l. c.  
Uraga.

**Genus *Stylopsis* A. Adams.**

*Stylopsis typica* A. Ad.

Ann. Mag. N. H. 1860. pag. 406.  
Corea.

*Stylopsis sulcata* A. Ad.

Ann. Mag. N. H. Sept. 1861. pag. 241.  
Mare Ochotsk.  
Genus *Stylopsis* *Syrnolae* cognatum est, sed plica columellae deficiente insignitur.

**Genus *Styloptygma* A. Adams.**

*Styloptygma taeniatum* A. Ad.

Proc. Zool. Soc. 1862 pag. 235.

Testa tenuis splendens flavido-alba, clausiliaeformis, fascia rufa cincta, anfractibus septenis vel octonis plano-convexis sutura conspicua sejunctis per longitudinem minutissime striatis instructa; apertura ovata, antice incrassata et dilatata; plica columellae mediana, labrum tenue simplex. — Alt. 7, diam. max. 1,5 mill.

Takano-shima.

Plura specimina exstant.

Cochleola integra splendens et pellucida, fascia transversa rubente signata est, quae in testis detritis vel adesis non observatur.

Praeterea l. c. enumerantur:

*Styloptygma pupiforme* A. Ad.

Rissoa (*Goniostoma*) pupiformis A. Ad. Ann. Mag. 1860. 5. pag. 411.  
Mino-shima.

*Styloptygma lendix* A. Ad.

Yobuko.

*Styloptygma gibbum* A. Ad.

O-shima, Tanabe.

*Styloptygma cereum* A. Ad.

Takano-shima.

*Styloptygma larvula* A. Ad.

O-shima.

*Styloptygma subuliforme* A. Ad.

Tsu-shima.

*Styloptygmata* Puparum vel Clausiliarum habitum aliqua ex parte repraesentant. Melius *Syrnolis* inserenda mihi videntur.

**Genus Elusa A. Adams.**

*Elusa gracilis* A. Ad.

*Pyramidella gracilis* A. Ad. Sow. Thes. vol. 2. pag. 815. Tab. 172. fig. 14. 15. Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 237.

Yobuko.

*Elusa subulata* A. Ad.

*Pyramidella subulata* A. Ad. Sow. Thes. vol. 2. pag. 815. Tab. 172. fig. 13.

O-shima.

*Elusa castanea* A. Ad.

Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 237.

O-shima.

*Elusa badia* A. Ad.

Proc. l. c.

O-shima.

*Elusa strigulata* A. Ad.

l. c.

Yobuko.

*Elusa cinnamomea* A. Ad.

O-shima.

Clar. Adams has cochleolas antea cum *Pyramidellis* conjunxit, sane quidem habitu diversas. Nec una earum in collectione exstat.

**Genus Turbonilla Risso (Chemnitzia d'Orb.).**

*Turbonilla varicosa* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 239. Moll. Jap. pag. 15. Tab. 2. fig. 5.

Portus De-shimae.

*Turbonilla Philippiana* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 239. Moll. Jap. pag. 16. Tab. 1. fig. 12. magn. aucta.

Portus De-shimae.



*Turbonilla multigyrata* Dkr.

Tab. nostra 13. fig. 18. 19. magn. aucta. fig. 20. m. naturali.

Testa gracilis turrito-subulata, lactea, nitida, pellucida, anfractibus 17—18 convexis sutura profunda sejunctis, in longitudinem suboblique costatis instructa; apertura ovato-subrotunda; columella recta; apex vel nucleus vitreus resupinus.

Haec species, 16—17 mill. longa, magnitudine et anfractuum numero multo majore quam in genere solet, insignis est.

Inter omnes *Turbonillas* mihi notas nullam invenire potui nostrae respondentem.

Praeterea Clar. Adams in Ann. and Mag. of Nat. Hist. 1860 pag. 418 septendecim *Turbonillarum* species palam fecit, in freto Coreano aliisve maris Japonici locis profundis captas.

Sunt haecce:

*Turbonilla perfecta* A. Ad.

Fretum Coreanum prope Mino-shima.

*Turbonilla eximia* A. Ad.

Portus Chosan.

*Turbonilla venustula* A. Ad.

Portus Chosan.

*Turbonilla macilenta* A. Ad.

Portus Hamiltoni.

*Turbonilla monocycla* A. Ad.

Mino-shima.

*Turbonilla nitida* A. Ad.

Mino-shima.

*Turbonilla commoda* A. Ad.

Tsu-shima.

*Turbonilla sculptilis* A. Ad.

Tsu-shima.

*Turbonilla fragilis* A. Ad.

Tsu-shima.

*Turbonilla bicincta* A. Ad.

Tsu-shima.

*Turbonilla cincta* A. Ad.

Mino-shima.

*Turbonilla munda* A. Ad.

Mino-shima.

*Turbonilla speciosa* A. Ad.

Mino-shima.

*Turbonilla debilis* A. Ad.

Mino-shima.

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
|                  | <i>Turbonilla modica</i> A. Ad.   |
| Mino-shima.      |                                   |
|                  | <i>Turbonilla Scaliola</i> A. Ad. |
| Fretum Coreanum. |                                   |
|                  | <i>Turbonilla metulina</i> A. Ad. |
| Mino-shima.      |                                   |

**Genus Chrysallida P. P. Carpenter.**

Hoc genus in certas Turbonillarum species fundatum, cochleolas complectitur pupiformes peristomate continuo tenui nec non plica unica columellae insignitas; superficies vel sculptura earum sic dicta plerumque cancellata est. Conf. Carpenter Catal. of the Reigen Collection of Mazatlan Mollusca pag. 416.

Clar. Adams multas species in profundo mari Japonico praesertim in freto Coreano detexit. In Ann. and. Mag. of Nat. Hist. m. Jun. 1860 pag. 478. et Jan. 1861 pag. 44. hae species enumeratae sunt:

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
|                   | <i>Chrysallida plicata</i> A. Ad.     |
| Mino-shima.       |                                       |
|                   | <i>Chrysallida semiplicata</i> A. Ad. |
| Mino-shima.       |                                       |
|                   | <i>Chrysallida Minna</i> A. Ad.       |
| Mino-shima.       |                                       |
|                   | <i>Chrysallida Brenda</i> A. Ad.      |
| Mino-shima.       |                                       |
|                   | <i>Chrysallida metula</i> A. Ad.      |
| Mino-shima.       |                                       |
|                   | <i>Chrysallida elegantula</i> A. Ad.  |
| Mino-shima.       |                                       |
|                   | <i>Chrysallida pulchella</i> A. Ad.   |
| Mino-shima.       |                                       |
|                   | <i>Chrysallida concinna</i> A. Ad.    |
| Mino-shima.       |                                       |
|                   | <i>Chrysallida pygmaea</i> A. Ad.     |
| Portus Hamiltoni. |                                       |
|                   | <i>Chrysallida pupula</i> A. Ad.      |
| Tsu-shima.        |                                       |
|                   | <i>Chrysallida consimilis</i> A. Ad.  |
| Portus Hamiltoni. |                                       |
|                   | <i>Chrysallida consobrina</i> A. Ad.  |
| Awa-shima.        |                                       |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Tsu-shima.        | <i>Chrysallida alveata</i> A. Ad. |
| Fretum Coreanum.  | <i>Chrysallida munda</i> A. Ad.   |
| Portus Hamiltoni. | <i>Chrysallida mumia</i> A. Ad.   |
| Tsu-shima.        | <i>Chrysallida nana</i> A. Ad.    |
| Tsu-shima.        | <i>Chrysallida terebra</i> A. Ad. |
| Tsu-shima.        | <i>Chrysallida pusio</i> A. Ad.   |
| Awa-shima.        | <i>Chrysallida pura</i> A. Ad.    |

**Genus *Odostomia* Fleming\*).**

Clar. Adams haud exiguum harum cochleolarum copiam in mari Japonico, praesertim in freto Coreano detexit et in Ann. and Mag. Nat. Hist. 1860 pag. 20 et 416 descripsit. Sed hae bestiolae hucusque, quantum scio, nondum depictae sunt. Cupiendum et optandum est, ut omnes huius generis species plurimam partem parvulae ac minimae, difficillime discernendae, iterum diligenter et accurate comparentur, describantur et depingantur, nam nullo modo determinari possunt ex sola descriptione brevi.

*Odostomia nivea* A. Adams.

Testa subrimata, turrito-conica, alba, subpellucida, anfractibus senis planiusculis sutura distincta sejunctis instructa, ultimo subangulato; apertura ovata; plica columellae parva paululum obliqua. — Alt. 3,5, lat. vix 2 mill.

Fretum Coreanum.

*Odostomia subdiaphana* A. Ad.

Testa imperforata, ovato-conica, alba, subpellucida, anfractibus quinque planiusculis sutura incisa sejunctis instructa, ultimo magno obtuse angulato; apertura ovata; plica columellae parva transversa. — Alt. 3, lat. 1,5 mill.

Oko-siri.

*Odostomia subangulata* A. Ad.

Testa subrimata, ovato-conica, alba, opaca, anfractibus senis vel senis et dimidio, planis sutura canaliculata divisis, ultimo subangulato; apertura ovata, antice effusa; plica columellae valida mediana, subobliqua. — Alt. 5,5, lat. 2,6.

Tsu-shima.

---

\*) *Odostomia*, cum e vocabulis *ὀδοῖς* dens et *στόμα* os derivetur, verbum mutilatum est, quod clar. Jeffreys in *Odontostomia* mutavit; melius dicatur *Odontostoma*, quod quidem nomen variis conchyliorum generibus jam impositum est.

*Odostomia obesula* A. Ad.

Testa subrimata, ovata, alba, nitida, solidula, anfractibus quaternis convexiusculis sutura incisa divisis instructa, ultimo vix angulato; apertura ovata, antice paululum producta; plica columellae valida mediana, transversa. — Alt. 2, lat. circiter 2,2 mill.

Fretum Coreanum.

*Odostomia pupa* A. Ad.

Testa oblongo-ovata rimata, pupaeformis, lactea, nitida, anfractibus quinis vel senis plano-convexis, sutura conspicua sejunctis instructa; apertura ovata; plica columellae conspicua transversa. — Alt. 2,5, lat. vix 1 mill.

Fretum Coreanum.

*Odostomia elata* A. Ad.

Testa elongato-conica, acuminata, alba, nitida, solidula, anfractibus quinis vix convexis sutura incisa sejunctis instructa, ultimo subangulato; apertura ovata, plica columellae obliqua; labrum in medio subangulatum. — Alt. 2,5, lat. 1 mill.

Mino-shima.

*Odostomia neglecta* A. Ad.

Testa minima ovato-conica, imperforata, alba, nitida, subpellucida, anfractibus tribus et dimidio convexiusculis sutura simplici disjunctis instructa, ultimo rotundato; apertura ovata; plica columellae parva obliqua. — Alt. 2, lat. vix 1 mill.

Tabu-shima.

*Odostomia cana* A. Ad.

Testa ovato-conica, subrimata, sordide alba vel lactea, anfractibus quaternis et dimidio usque ad quinis convexiusculis sutura conspicua divisis instructa, ultimo ovato basique rotundato; apertura oblonga, antice paululum dilatata; plica columellae valida, obliqua, mediana. — Alt. 2,5, lat. 1 mill.

Fretum Coreanum.

Species reliquae ab Adamsio l. c. enumeratae hae sunt:

*Odostomia pruinosa* A. Ad.

Oko-siri.

*Odostomia Achatinella* A. Ad.

Tsu-shima.

*Odostomia Japonica* A. Ad.

Mino-shima.

*Odostomia nana* A. Ad.

Mino-shima.

*Odostomia pygmaea* A. Ad.

Mino-shima.

*Odostomia oblonga* A. Ad.

Mino-shima.

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Mino-shima.      | <i>Odostomia scalina</i> A. Ad.                 |
| Mino-shima.      | <i>Odostomia tenera</i> A. Ad.                  |
| Fretum Coreanum. | <i>Odostomia ventricosa</i> A. Ad.              |
| Awa-shima.       | <i>Odostomia ovoidea</i> A. Ad. *)              |
| Mino-shima.      | <i>Odostomia hyalina</i> A. Ad.                 |
| Sado.            | <i>Odostomia producta</i> A. Ad.                |
| Fretum Coreanum. | <i>Odostomia goniosstoma</i> A. Ad.             |
| Fretum Coreanum. | <i>Odostomia vitrea</i> A. Ad.                  |
| Mino-shima.      | <i>Odostomia</i> (Evalea) <i>elegans</i> A. Ad. |
| Mino-shima.      | <i>Odostomia</i> (Evalea) <i>pyramis</i> A. Ad. |
| Mino-shima.      | <i>Odostomia</i> (Evalea) <i>arcuata</i> A. Ad. |

His speciebus addendae sunt:

*Odostomia lactea* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 234. Moll. Jap. pag. 17. Tab. 2. fig. 4.

Portus De-shimae.

*Odostomia fasciata* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 234. Moll. Jap. pag. 17. Tab. 2. fig. 2.

Portus De-shimae.

Haec cochleola fortasse melius Obeliscis adnumeranda est.

### **Genus Oscilla A. Adams.**

*Oscilla lirata* A. Ad.

*Odostomia* (Evalea) *lirata* A. Ad. Ann. and Mag. Nat. Hist. Dec. 1860. pag. 418.

Sato, O-shima etc.

*Oscilla sulcata* A. Ad.

*Odostomia* (Evalea) *sulcata* A. Ad. l. c. pag. 417.

Tsu-shima, Mososeki.

---

\*) Ovoides non est verbum latinum.

*Oscilla annulata* A. Ad.

*Obeliscus annulatus* A. Ad. Sow. Thes. Conch. Obeliscus Tab. 171. fig. 26.

Mososeki, Yobuko.

*Oscilla circinata* A. Ad.

Cfr. Proc. Zool. Soc. 1867. pag. 311.

O-shima, Takano-shima.

**Genus Parthenia Lowe \*).**

*Parthenia* (Odost.) *costulata* Dkr.

Moll. Jap. pag. 16. Tab. 2. fig. 15.

Portus De-shimae.

*Parthenia* (Odost.) *spirata* A. Ad.

Testa ovato-conica, alba, rimata, anfractibus quaternis et dimidio, sutura canaliculata gradatis, superioribus in longitudinem obsolete costatis; apertura ovata; plica columellae parva dentiformis mediana; labrum postice angulatum. — Alt. 3, lat. 1,5 mill.

Fretum Coreanum.

Non commutari debet cum *O. spirali* Mont.

*Parthenia coelata* A. Ad. in sched.

Testa turrito-conica alba, solidula, anfractibus planiusculis novenis vel decenis per longitudinem dense plicatis, supra suturam incisam carinula transversa signatis instructa; apertura ovata, antice subeffusa; plica columellae mediana dentiformis. — Alt. 5, lat. 1,5 mill.

Mare Japonicum.

Exstat in Museo Senckenbergiano.

Praeterea in Ann. and Mag. Nat. Hist. 1860. Jun. pag. 479. Dec. pag. 415. et 1861. Jan. pag. 42. hae species maris Japonici enumeratae sunt:

*Parthenia diadema* A. Ad.

Mino-shima.

*Parthenia monocycla* A. Ad.

Mino-shima.

*Parthenia foveolata* A. Ad.

Mino-shima.

*Parthenia pagodula* A. Ad.

Tabu-shima.

*Parthenia fenestrata* A. Ad. \*\*)

Mino-shima.

*Parthenia Mariella* A. Ad.

Mino-shima.

---

\*) *Partheniae* habitum *Turbonillarum* quarundam prae se ferunt excepta quidem peristomatis formatione, sunt enim *Odostomia* per longitudinem costatae pro genere proprio vix aestimandae.

\*\*) Non commutanda cum *Odostomia fenestrata* Forbes = *Turbonilla Weinkauffi* Dkr.

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Tsu-shima.   | <i>Parthenia bellula</i> A. Ad.    |
| Tsu-shima.   | <i>Parthenia punctigera</i> A. Ad. |
| Insula Sado. | <i>Parthenia mundula</i> A. Ad.    |
| Tsu-shima.   | <i>Parthenia costellata</i> A. Ad. |
| Tsu-shima.   | <i>Parthenia litoralis</i> A. Ad.  |

**Genus Auriculina Gray.**

Fortasse hae cochleolae aptius cum Actaeonaceis junguntur. Cf. A. Adams in Ann. etc. m. Maji 1860 pag. 407 et Jan. 1861 pag. 42, ubi enumeratae sunt:

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fretum Coreanum et                | <i>Auriculina Grayi</i> A. Ad.     |
| Mino-shima,<br>quae desiderantur. | <i>Auriculina ovalis</i> *) A. Ad. |

**Genus Eulimella Forbes.**

Species Japonicae hucusque cognitae hae sunt:

|                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                  | <i>Eulimella Philippiana</i> Dkr. |
| Malak. Bl. vol. 6. pag. 226. Moll. Jap. pag. 17. Tab. 2. fig. 8. |                                   |
| Portus De-shimae.                                                | <i>Eulimella pellucens</i> A. Ad. |
| Ann. etc. Jan. 1861. pag. 46.                                    |                                   |
| Mino-shima.                                                      | <i>Eulimella opalina</i> A. Ad.   |
| ibid.                                                            |                                   |
| Tsu-shima.                                                       | <i>Eulimella opaca</i> A. Ad.     |
| ibid.                                                            |                                   |
| Mino-shima.                                                      | <i>Eulimella vitrea</i> A. Ad.    |
| ibid.                                                            |                                   |
| Tsu-shima.                                                       | <i>Eulimella hyalina</i> A. Ad.   |
| ibid.                                                            |                                   |
| Sado.                                                            |                                   |

---

\*) Melius „ovata“ nominata fuisset, nam vox ovalis significationem habet longe alienam.

**Genus Aclis Lovén.**

*Aclis labiata* A. Ad.

Ann. Mag. Nat. Hist. Aug. 1860. pag. 118.

Mino-shima.

*Aclis cingulata* A. Ad.

ibid.

Mino-shima.

*Aclis lirata* A. Ad.

ibid.

Mino-shima.

*Aclis sulcata* A. Ad.

ibid.

Mino-shima.

*Aclis Loveniana* A. Ad.

Ann. Mag. Nat. Hist. Jan. 1861. pag. 43.

Portus Hamiltoni.

Auctor annotat hanc speciem pro hoc genere magnam Turritellae cujusdam minutae habitum repraesentare, sed nondum datam esse occasionem nucleum examinandi.

*Aclis crystallina* A. Ad.

ibid.

Tsu-shima.

*Aclis fulgida* A. Ad.

ibid.

Tsu-shima.

Ne una quidem huius generis species inter Mollusca nostra Japonica exstat.

**Genus Ebala Gray. \*)**

*Ebala virginea* A. Adams.

Ann. Mag. Aug. 1860. pag. 119.

Mino-shima.

*Ebala virginea* A. Adams.

l. c.

Mino-shima.

*Ebala diaphana* A. Adams.

Ann. Mag. Jan. 1861. pag. 43.

Portus Hamiltoni.

*Ebala scintillans* A. Adams.

ibid.

Sado.

**Genus Mucronalia A. Adams.**

*Mucronalia bicincta* A. Ad.

Ann. and Mag. Apr. 1860. pag. 301.

Fretum Coreanum.

---

\*) In genera of rec. Moll. hoc genus cum antecedente conjunctum est.



**Mucronalia exilis A. Ad.**

Ann. and Mag. Apr. 1862. pag. 295.

Simonoseki.

**Genus Apicalia A. Adams.**

*Apicalia gibba* A. Ad.

Ann. and Mag. Apr. 1862. pag. 295.

Insula Goto.

Hoc genus testam Eulimarum distortam refert, sed apicem singularem Styliiferi et Mucronaliae.

**Genus Monoptygma Lea.**

*Monoptygma eximium* Lischke.

Malak. Bl. vol. 19. pag. 103. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 59. Tab. 3. fig. 4. 5. 6.

Mare Japoniae mediterraneum.

Plura specimina habitu et colore variantia adsunt non solum *M. striato* Gray, sed etiam *M. fulvo* A. Ad. tam similia, ut omnia pro una eademque specie habuerim. Sunt maximae inter Monoptygmata hodierna.

*Monoptygma coelata* A. Ad. \*)

Ann. etc. Oct. 1861. pag. 303.

Mino-shima.

**Genus Cingulina A. Adams.**

*Cingulina circinata* A. Ad.

Ann. Mag. Nat. Hist. Dec. 1860. pag. 414.

Awa-shima (et Mare Chinense sept.)

Haec species generis typica, ad hoc tempus unica, forma et sculptura Monoptygmati respondet, sed plica columellae deficiente Turbonillae similis est.

**Genus Jolaea A. Adams.**

*Jolaea scitula* A. Ad. (Jole).

Ann. 1860. pag. 300.

Mino-shima, Seto-Uchi etc.

*Jolaea sculptilis* A. Ad.

Proc. Zool. Soc. 1867. pag. 310.

*Menestho sculptilis* Ann. Oct. 1861. pag. 303.

Mino-shima, Yobuko.

---

\*) Haec vox, cum a plica, τὸ πύγμα derivetur, pro neutro usurpari debet, ergo coelatum scribendum est.

**Jolaea amabilis A. Ad.**

Proc. Zool. Soc. 1867. pag. 310.

O-shima, Tanabe, Goto.

Cum designatio „Jole“ jam avium generi cuidam imposita esset, Adamsius nomen Jole in „Jolaea“ mutavit, qui opinatus est Jolaeam inter genera Monoptygma et Menestho medium tenere.

**Genus Menestho Möller.**

**Menestho exarata A. Ad.**

Ann. etc. m. Oct. 1861. pag. 303.

Hakodate.

Hoc genus notis gravioribus a genere antecedente differre non videtur.

**Eulimacea.**

**Genus Eulima Risso.**

Clar. A. Adams in Ann. etc. m. Febr. 1861. pag. 125. viginti et unam huius generis species in mari Japoniae obvias enumeravit omnes difficile distinguendas, cum inter se simillimae sint et omnium specierum testae laevissimae sculptura insignita prorsus careant.

**Eulima clavula A. Ad.**

Testa acute pyramidalis lactea pellucens anfractibus octonis convexiusculis sutura submarginata sejunctis instructa, ultimo lato vix angulato, subobliquo; apertura ovata; labrum incrassatum; apex postice paululum resupinatus. — Alt. vix 4, lat. 1,4 mill.

Species parvula nitida, solidula, anfractibus subito crescentibus insignis.

Mino-shima.

**Eulima curvata A. Ad.**

Testa subulata, curvata, lactea, tenuicula, anfractibus septenis planiusculis instructa, ultimo paululum producta; apertura ovata; labrum tenue vix incrassatum; apex acutiusculus dextrorsum inclinatus. — Alt. 4, lat. 1,3 mill.

Species parvula testa curvata insignis.

Mino-shima.

**Eulima stylata A. Ad.**

Testa subulata, parum idque dextrorsum flexa, alba, nitida, anfractibus octonis planiusculis sutura conspicua divisim instructa, ultimo oblongo; apertura ovato-elliptica; labrum subincrassatum. — Alt. 3,4, lat. 1,2 mill.

Mino-shima.

**Eulima pandata A. Ad.**

Testa subulata, eburnea, gracilis, perparum flexa, anfractibus circiter octonis planis sutura vix conspicua conjunctis instructa, ultimo paululum producta; apertura ovata; labrum tenue. — Alt. 4,2, lat. 1,2.

Fretum Coreanum.

*Eulima eburnea* A. Ad.

Testa subulata paululum flexa, solidula, eburnea, anfractibus octonis planatis, ultimo magno basi rotundato instructa; apertura ovata; columella rectiuscula; labrum acutum. — Alt. 6, lat. 2 mill. Tsu-shima.

Praeterea l. l. enumerantur:

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
|                  | <i>Eulima robusta</i> A. Ad.      |
| Mino-shima.      | <i>Eulima pinguicula</i> A. Ad.   |
| Mino-shima.      | <i>Eulima mundula</i> A. Ad.      |
| Tsu-shima.       | <i>Eulima acicularis</i> A. Ad.   |
| Mino-shima.      | <i>Eulima flexa</i> A. Ad.        |
| Mino-shima.      | <i>Eulima reclinata</i> A. Ad.    |
| Tsu-shima.       | <i>Eulima stenostoma</i> A. Ad.   |
| Tsu-shima.       | <i>Eulima semitorta</i> A. Ad.    |
| Tsu-shima.       | <i>Eulima dentaliopsis</i> A. Ad. |
| Fretum Coreanum. | <i>Eulima angulata</i> A. Ad.     |
| Tabu-shima.      | <i>Eulima valida</i> A. Ad.       |
| Mino-shima.      | <i>Eulima odontoidea</i> A. Ad.   |
| Mino-shima.      | <i>Eulima chrysallida</i> A. Ad.  |
| Mino-shima.      | <i>Eulima debilis</i> A. Ad.      |
| Mino-shima.      | <i>Eulima indeflexa</i> A. Ad.    |
| Mino-shima.      | <i>Eulima scitula</i> A. Ad.      |
| Tabu-shima.      |                                   |

Postero tempore certo nomina huius vel illius speciei ut exstinguantur e systemate necesse erit, si modo omnes Eulimarum testae descriptae tam recentes quam fossiles accuratius perscrutatae atque comparatae fuerint.

**Genus Niso, Risso. \*)**

*Niso interrupta* Sow.

Thes. Conch. vol. 2, pag. 801, Tab. 170, fig. 9. Bonellia Desh. A. Ad. Ann. etc. Oct. 1861, pag. 306.

De incola testae cfr. ibid. m. Apr. 1862, pag. 295.

Mino-shima, Simonoseki. Pariter in America centrali obvenire dicitur.

\*) At vero in Nereidis Neso enumeratur, hinc melius Neso monente Herrmannsen Ind. gen. Mal. vol. 2. pag. 122.

**Niso brunnea Sow. (Eulima).**

Thes. Conch. vol. 2. pag. 801. Tab. 170. fig. 3. Conch. Ill. fig. 9.

Mino-shima (mare Chinense Sow.).

**Genus Leiostraca H. et A. Adams. \*)**

Haud exigua huius Eulimaceorum generis copia hucusque innotuit. Clar. A. Adams duodecim enumeravit species Japonicas:

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
|                        | <i>Leiostracam turgidulam</i> A. Ad. |
| Tsu-shima.             |                                      |
|                        | <i>Leiostracam lanceatam</i> A. Ad.  |
| Fretum Coreanum.       |                                      |
|                        | <i>Leiostracam nixam</i> A. Ad.      |
| Mino-shima.            |                                      |
|                        | <i>Leiostracam Leachii</i> A. Ad.    |
| Mino-shima.            |                                      |
|                        | <i>Leiostracam spiculam</i> A. Ad.   |
| Mino-shima.            |                                      |
|                        | <i>Leiostracam paxillum</i> A. Ad.   |
| Mino-shima.            |                                      |
|                        | <i>Leiostracam puram</i> A. Ad.      |
| Tsu-shima, Mino-shima. |                                      |
|                        | <i>Leiostracam niveam</i> A. Ad.     |
| Tsu-shima.             |                                      |
|                        | <i>Leiostracam claram</i> A. Ad.     |
| Mino-shima.            |                                      |
|                        | <i>Leiostracam labiatam</i> A. Ad.   |
| Mino-shima.            |                                      |
|                        | <i>Leiostracam clavellam</i> A. Ad.  |
| Sado.                  |                                      |
|                        | <i>Leiostracam nitidam</i> A. Ad.    |

Okosiri.

(Conf. Ann. and Mag. etc. m. Febr. 1861. pag. 123.)

His adjicio species nonnullas Adamsianas nondum, quantum scio, descriptas, quae inter Mollusca Japonica Musei Senckenbergiani exstant. Sunt haece:

*Leiostraca tantilla* A. Ad. in sched.

Testa parvula subulata alba anfractibus senis vel septenis plano-convexis sutura distincta sejunctis instructa, ultimo magno; apertura ovata, antice paululum effusa. — Alt. 2,5, lat. 1 mill.

*Leiostraca lepida* A. Ad. in sched.

Testa subulata angusta, alba, nitida, anfractibus septenis vel octonis convexis sutura incisa. divisis instructa, ultimo magno ad basin rotundato; apertura ovato-oblonga antice subeffusa. — Alt. 3,2, lat. vix 1 mill.

---

\*) Non commutanda cum *Leiostraco* Alb. sectione *Bulimi*.

*Leiostraca lentiginosa* A. Ad. in sched.

Testa parvula subulata, alba, nitida, anfractibus senis vel septenis planiusculis instructa, ultimo subangulato; sutura conspicua; apertura ovata. — Alt. 2,5, lat. vix 1 mill.

Differt a *Leiostraca* tantilla testa graciliore nec non anfractu ultimo subangulato.

*Leiostraca vineta* A. Ad. in sched.

Testa tenuis subulata angusta nitida, alba lineis duabus pallide rufis vineta, anfractibus octonis vel novenis vix convexis instructa; apertura ovata antice subdilatata. — Alt. 4,5, lat. 1 mill.

Differt a *Leiostraca* bilineata Alder (*Eulima*) testa multo minore et graciliore.

## Cerithiopsidea.

### Genus *Cerithiopsis* Forbes et Hanley.

*Cerithiopsis subreticulata* Dkr. (*Cerithium*).

Moll. Jap. pag. 9. Tab. 2. fig. 10. magn. aucta.

Portus De-shimae.

Species nostra *Cerithiopsi* tuberculari Mont. maris germanici affine, statura multo exiliore aliisque notis differt.

Clar. Adams in Ann. and Mag. etc. Febr. 1861. pag. 130 harum cochleolarum species Japonicas enumeravit octo, quae sunt:

Tsu-shima. *Cerithiopsis rosea* A. Ad.

Tsu-shima et Mino-shima. *Cerithiopsis cerina* A. Ad.

Mino-shima. *Cerithiopsis baculum* A. Ad.

Mino-shima. *Cerithiopsis clavula* A. Ad.

Fretum Coreanum. *Cerithiopsis paxillus* A. Ad.

Fretum Coreanum. *Cerithiopsis pagodula* A. Ad.

*Cerithiopsis* (*Seila*) *dextroversa* Ad. et Reeve.

Triforis dextroversus Voy. Sam. Zool. pag. 45. Tab. 11. fig. 31.

Tsu-shima, Fretum Coreanum.

Tsu-shima. *Cerithiopsis* (*Seila*) *cingulata* A. Ad.

Haec et species quae antecedit, fortasse sunt Trifores dextroversae.

*Cerithiopsis* a Bittio, genere Leachiano, e sola testarum consideratione vix discernenda, nisi forte incolae comparari possunt.

## Solariacea.

### Genus Solarium Lam.

#### *Solarium perspectivum* Lin. (Trochus).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 757. Mus. Ulr. Reg. pag. 646. Chemn. Conch. Cab. vol. 5. fig. 1693. Hanl. in Sow. Thes. vol. 3. pag. 228. fig. 36—38. = *Solarium formosum* Hinds. = *zonatum* et *incisum* Phil.

Inter Mollusca mea Japonica specimen integerrimum exstat.

Haec cochlea mirabilis maximopere variat ut plura exemplaria in variis regionibus collecta, quae Thesaurus meus Conchyliorum continet, satis docent. Inde singulae varietates pro speciebus meris habitae sunt.

#### *Solarium quadriceps* Hinds.

Proc. Zool. Soc. 1844. pag. 23. Zool. Voy. Sulph. vol. 2. Moll. pag. 50. Tab. 14. fig. 7. 8. *Sol. granulatum* Kien. non Sow. Conf. Hanl. Mon. in Thes. Conch. vol. 3. pag. 229. Tab. 250. fig. 3. 4. Tab. 252. fig. 25. 26.

Specimen unum exstat sine indicatione certa loci natalis. (Nagasaki Lischke).

#### *Solarium dorsuosum* Hinds.

Proc. Zool. Soc. 1844. pag. 23. Phil. Conch. Cab. ed. 2. pag. 37. Hanl. Mon. l. c. pag. 238. fig. 73. 74.

Duo specimina Japonica exstant, alterum detritum. (Insulae Philippinae.)

## Conoidea.

### Genus Conus Lin.

#### *Conus marmoreus* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 712. ed. 12. pag. 1165. Rumphii Mus. Tab. 32. fig. N. Martini Conch. Cab. vol. 2. fig. 685.

Specimen minus exstat jam antea ex Japonia acceptum. (Nagasaki.)

#### *Conus pulicarius* Hwass.

Encycl. méth. vers vol. 1. pars 2. pag. 66. Puncticulis pul. Swains. Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 166. vol. 3. pag. 21.

Jokohama.

#### *Conus ebraeus* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 715. Rumphii Mus. Tab. 33. fig. B. B.

Specimen minus inter Mollusca Japonica adest.

#### *Conus fulgetrum* Sow.

Proc. Zool. Soc. 1841. Thes. Conch. vol. 3. Tab. 190. fig. 69. *Conus scaber* Kiener = *Conus miliaris* var. Reeve Conch. icon. spec. 198. Suppl.

Specimen minus exstat.

Haec species cum *Cono miliari* Hw. (Enc. méth. vers. vol. 1. pars 2. pag. 629.) facile commutari potest, sed accuratius spectata tam forma, quam sculptura differt. Specimina a clar.

Theodoro Loebbecke e mari rubro quondam reportata nostro Japonico omnino respondent, quod epidermide firma cornea nitente obductum est.

Haec et quae antecedit species ad Coronaxin Swainsoni pertinent.

*Conus Lischkeanus* Weinkauff.

Mart. et Chemn. Conch. Cab. ed. 2. 4. pag. 311. Tab. 56. fig. 2. 3. Cat. Jahrb. der malak. Gesellsch. 1. pag. 260.

Kiusiu.

Specimen unicum a clar. J. Rein lectum aliquantulum detritum est, nihilominus vestigia epidermidis fuscae in anfractibus canaliculatis lamellosae in eo conspiciuntur. Ad Lithoconos Mörchii pertinet.

*Conus tessellatus* Born.

Mus. Caes. pag. 151. Lamarck anim. sans vert. vol. 11. pag. 39. Reeve Conch. icon. vol. 1. spec. 163.

Specimen unum adest maculis subquadrangulis ex parte confluentibus pictum.

Species in mari Indico haud rara, pariter ad Lithoconos pertinens.

„Harasa gai“ Japonorum.

*Conus Sieboldii* Reeve.

Conch. icon. vol. 1. Suppl. Tab. 1. spec. 269. G. B. Sowerby Thes. Conch. vol. 3. pag. 13. fig. 369.

Testa elongato-conica, tenuicula, alba, maculis strigisque fuscis sparsis signata, striis incrementi tenerrimis instructa; spira exserta acuminata gradata; anfractus duodecim ad carinam excavati; labrum tenue leviter arcuatum; epidermis subtilis fibrosa.

Inter Mollusca Japonica specimen integerrimum 57 mill. altum, 24 latum exstat iconibus supra citatis paullo majus. (Leptoconus Swains.)

„Acome gai“ Japonorum.

*Conus Orbigny* Audouin.

Mag. de Zool. Moll. 1838. Tab. 20. *Conus planicostatus* Sowerby. Conch. Ill. 1840. Reeve Conch. icon. vol. 1. *Conus* spec. 17.

Specimina minora detrita et laesa lecta sunt.

Clar. Reeve et Sowerby Conum insculptum Kieneri (Icon Coq. viv. Tab. 99 fig. 2, Sowerby Thes. Conch. vol. 3. pag. 12. fig. 363) pro varietate huc referendum esse putant, quod ego non approbaverim, cum haec species habitu multo minore, graciliore, colore pallide fusco nec non sculptura inter sulcos cancellata satis differre mihi videatur.

Pariter ad Leptoconus Swainsoni pertinet.

*Conus miles* Lin.

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1167. Rumphii Mus. Tab. 33. fig. W. Martini Conch. Cab. vol. 2. fig. 663. 664. Reeve Conch. icon. vol. 1. spec. 9. (exemplar giganteum).

Specimen parvum in nostra Molluscorum Japonicorum collectione exstat. Cochlea in remotissimis regionibus obvia ad Rhizoconos Mörchii pertinet.

**Conus fulmen** Reeve.

Proc. Zool. Soc. 1843. Conch. icon. vol. 1. spec. 215. Sow. Thes. Conch. vol. 3. pag. 39. fig. 351.

Plura specimina a clar. Rein. lecta sunt.

Testa oblonga subventrosa striis incrementi subtilibus lineas transversas pariter subtiles decussantibus instructa, frontem versus obsolete sulcata, in fundo cinereo-purpurascente vel albido strigis undulatis maculisve irregularibus nigro-fuscis variegata; spira convexa, subacuta, haud carinata; epidermis, quae reliqua est, holoserica.

(Insulae Philippinae.)

**Conus pauperculus** Sow.

Tab. nostra 2, fig. 4. 5.

Sow. Conch. Ill. fig. 78. Thes. Conch. vol. 3. pag. 13. fig. 217. Reeve Conch. icon. vol. 1. spec. 108. Rumphii Mus. Tab. 32. fig. T.

Testa turbinato-conica, solidula, viridescenti-cinerea, balteo lato mediano pallide rubro subalbicante nec non costulis subtilibus transversis obsolete granosis rufo-lineatis et punctatis cincta, costulis basin versus paullo crassioribus; spira modice elevata, obtuse angulata, obsolete nodosa, strigis fuscis picta spiraliterque sulcata; apex obtusiusculus; epidermis passim conservata fusco-cornea lamellosa. — Alt. 32, diam. max. 17 mill.

Icon Reeveana specimen gracilius multo minus exhibet ceteroquin nostro respondens. Specimen in Thesauro Conch. depictum magis convenit statura sua non vero colore.

Integritatis ac pulchritudinis causa specimen nostrum denuo depinximus.

Haec et species antecedens ad *Chelyconos Mörchii* pertinent.

**Conus textile** Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 717 etc. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 31.

Specimen unum attulit clar. J. Rein.

**Genus Nubecula** Klein.

**Nubecula intermedia** Reeve (*Conus*).

Conch. icon. vol. 1. *Conus* spec. 12. *Conus geographus* var. Brod. Sow. Conch. Ill. fig. 33.

Insula Annae Oceani pacifici.

Unum specimen Japonicum adest icone Reeveana paullo minus, pictura marmorata fusca in fundo roseo insigne. Species *Cono geographo* Linnaci quidem affinis, sed constanter diversa.

Haec cochlea cum *Cono geographo*, obscuro, *Humphreysii* et *tulipa Lamarckii* sectionem, vel potius genus bene terminatum format a Kleinio *Nubecula*, a Montfortio *Rollus*, a Swainsonio *Tuliparia* dictum.



## Strombea.

### Genus Strombus Lin.

#### *Strombus latissimus* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 745. Testa labro rotundato maximo, ventre inermi, spira subnodosa. Rumphii Mus. Tab. 36. fig. L.

Specimen magnum et ponderosum, sed paululum decoloratum jam antea ex Japonia accepimus. Pariter clar. Lischke hanc cochleam singularem inter Mollusca Japonica commemoravit. In indice Strombidarum Japoniae ab A. Adams edito (Journ. Proc. Linn. Soc. vol. 7. pag. 92) huius speciei nulla fit mentio.

Plerumque ex Amboinis insulis affertur.

#### *Strombus guttatus* Mart. (Pugil.)

Martini Conch. Cab. vol. 3. pag. 13. fig. 840. Str. auris Dianae Lin. (ex parte). Str. auris Dianae var. laevigata, labro intus undique laevissimo, Menke Synopsis pag. 71.

Unum specimen exstat.

#### *Strombus pacificus* Swainson.

Exot. Conch. 1834. pag. 10. Tab. 17. de Synon. conf. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 19.

Sinus Jedoënsis.

#### *Strombus succinctus* Lin. var.

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1212. = Str. accinctus Born. Dkr. Moll. Jap. pag. 1.

#### *Strombus vittatus* Lin. var.

Dunker Moll. Jap. pag. 1. Strombus Japonicus Reeve Conch. icon. vol. 6. Strombus spec. 42. Gallinula vittata var. A. Adams. Proc. Linn. Soc. vol. 7. pag. 92. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 30. Tab. 5. fig. 7.

Plura huius cochleae specimina exstant maximam partem cum ea forma convenientia, quam clar. Reeve nomine Strombi Japonici descripsit. Cum vero notae distinguentes a Reeveo allatae mihi haud sufficiant ut pro specie genuina haberi possit, cum insuper multae Stromborum species praesertim Strombus vittatus admodum variabiles sint, hanc speciem Reeveanam pro varietate tantum Strombi vittati jam antea enumeravi hodieque numero intermediam inter Strombum vittatum typicum atque turritum Sowerbyi.

Operculi serrati structura et indoles eadem est atque in Strombo vittato justo. Epidermis tenuis villosa caduca facile dehiscit.

#### *Strombus flosculosus* Mart. (Canarium).

Rumphii Mus. Tab. 37. Lit. W. Martini Conch. Cab. vol. 3. fig. 807—809. Strombus floridus Lam. anim. sans vert. ed. 2. vol. 9. pag. 707.

Varietates minores vivide pictae exstant.

#### *Strombus urceus* Lin.

Mus. Lud. Ulr. Reg. pag. 624. Syst. Nat. ed. 12. pag. 1212. Rumphii Mus. Tab. 37. Lit. T. Canarium. Exstat specimen minus maculis pallide rufis variegatum.

Species admodum variabilis in orbe terrarum late dispersa.  
Apud Japanos „Hashitomi gai“ nominatur.

*Strombus corrugatus* Ad. et Reeve.

Voy. Samar. Moll. pag. 35. Tab. 10. fig. 19.

*Litus Coreanum*.

Species antecedenti cognata.

*Strombus luhuanus* Lin.

Mus. Reg. Ulr. pag. 621. Syst. Nat. ed. 10. pag. 744. ed. 12. pag. 1209. Rumphii Mus. Tab. 37.  
lit. S. Luhua. Martini Conch. Cab. vol. 3. fig. 789—791.

Tria specimina prope Tokio lecta. Testa integra epidermide cornea vestita est.  
Cochlea pariter late dispersa.

*Strombus Isabella* Lam.

Anim. sans. vert. ed. 2. vol. 9. pag. 700. Alata Gallinula gibba Mart. Conch. Cab. vol. 3. fig. 817.  
818. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 19.

*Japonia australis*.

**Genus Pterocera Lam.**

*Pterocera chiragra* Lin. (*Strombus*).

Mus. Lud. Ulr. pag. 615. Syst. Nat. ed. 12. pag. 1207. Rumphii Mus. Tab. 35. lit. A. B. Harpago.  
Mart. Conch. Cab. vol. 3. pag. 145. Tab. 85. fig. 851. 852.

Specimina juvenilia.

*Pterocera millepeda* Lin. (*Strombus*).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 743. „Testae labro decadactylo, digitis inflexis, fauce substriata, dorso gibbere compresso.“ — *Cornuta millepeda* Rumphii Mus. Tab. 36. lit. J. *Pterocera millepeda* Lam. ex parte.

Exemplar unicum; alia specimina collectionis nostrae ex insulis Java et Philippinis originem habent.

*Pterocera lambis* Lin. (*Strombus*).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 743. „Testae labro heptadactylo, digitis rectiusculis, fauce laevi.“ Rumphii Mus. Tab. 35. lit. E. F.

Specimen junius nondum adultum.

*Pterocera radix bryoniae* Chemn. (*Strombus*).

Chemn. Conch. Cab. vol. 10. pag. 227. Tab. 159. figg. 1512—1515. *Strombus Bryonia* Gmel.  
Syst. Nat. ed. 13. pag. 3520. *Pterocera truncata* Lam. anim. sans vert. vol. 9. pag. 671. Cfr.  
Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 29.

Nagasaki.

### Genus *Rostellaria* Lam.

*Rostellaria Powisii* Petit \*).

Mag. de Zool. 1842. Tab. 53. Reeve Conch. icon. vol. 6. Tab. 2. fig. 4. Sow. Thes. vol. 1. pag. 22. Tab. 5. fig. 5. 6.

Specimen juvenile decoloratum lectum est.

### Terebellacea.

#### Genus *Terebellum* Klein.

*Terebellum punctatum* Klein.

Meth. pag. 38. Tab. 2. fig. 48. *Strombus terebellum* Lin. Syst. Nat. ed. 10. pag. 718. *Bulla terebellum* Lin. Syst. Nat. ed. 12. pag. 1185. *Strombus terebellum* Rumphii Mus. Tab. 30. lit. S. Martini Conch. Cab. vol. 2. pag. 190. fig. 568. 569. *Avena marina* Chemn. Conch. Cab. vol. 10. pag. 124. Tab. 146. fig. 1362. 1363. *Terebellum punctatum* Lam. anim. sans vert. vol. 10. pag. 584. *Terebellum subulatum*.

Specimina tantum minora lecta sunt colore pallidiore maculis albis punctulisque fuscis tincta. Punctula macularum medium tenent. Sed pictura saepe diversa, modo marmorata, modo aspersa, vel rarius lineata; lineae parallelae in antica testae parte divergunt. Haec varietas a Kleinio *Terebellum striatum* nominatur. Specimen collectionis nostrae pergrande 68 mill. longitudinem aequat.

### Cypraeacea.

#### Genus *Cypraea* Lin.

*Cypraea testudinaria* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 719. Mus. Lud. Ulr. pag. 567. Rumphii Mus. Tab. 38. fig. C. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 62.

Nagasaki.

*Cypraea Isabella* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 722. Rumphii Mus. Tab. 39. fig. G.

Duo specimina exstant.

*Cypraea carneola* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 719. Testa subturbinata pallida, fasciis incarnatis, ore violaceo. Mus. Lud. Ulr. pag. 568. Rumphii Mus. Tab. 38. K.

Specimen unum pergrande exstat huius speciei late dispersae; minora jam antea ex Japonia accepimus.

---

\*) Kleinius in tentamine suo methodi ostracologicae Strombos atque Pteroceras in genera distribuit, quae a scriptoribus nonnullis comprobata sunt etsi tantum ut subgenera sic dicta. Hanc dividendi rationem etiam approbaverim ad multas species facilius perlustrandas, sed minime aestimanda sunt pro generibus veris.

*Cypraea felina* Gmelin.

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3412. Martini Conch. Cab. vol. 1. fig. 233. 234.

Nagasaki. Kino-o-shima.

Specimina tria exstant.

*Cypraea asellus* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 722. Testa umbilicata alba, fasciis tribus fuscis. Mus. Lud. Ulr. pag. 576.  
Rumphii Mus. Tab. 39. fig. M.

Specimen detritum lectum est.

*Cypraea cribraria* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 723. Mus. Lud. Ulr. pag. 577. Argenvillei Conch. Tab. 18. fig. X.

Specimen minus vivide ocellatum.

*Cypraea fimbriata* Gmelin.

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3420. Martini Conch. Cab. fig. 263. 264. Dunker Moll. Jap. pag. 9. Thes.  
Conch. Cypraea no. 99. fig. 387—391.

Plurima specimina maximam partem detrita et decolorata saepius ex Japonia accepi.  
Sicut et aliae Cypraearum species magnitudine mirum in modum variant; specimina majora 22,  
minora vix 13 mill. longa sunt.

*Cypraea macula* A. Adams.

Sow. Thes. Conch. Cypraea no. 98. fig. 379—381.

Mare Japonicum.

Hanc speciem Adamsianam pro varietate paululum ventrosiore antecedentis habeo.

*Cypraea reticulata* Martyn.

Univ. Conch. fig. 15. *C. histrio* Gmel. Syst. Nat. ed. 13. pag. 3403. *C. arlequina* Chemn. Conch.  
Cab. vol. 10. pag. 110. fig. 1346. 1347. Adams Journ. Proc. Linn. Soc. vol. 7. pag. 93.

Specimen minus exstat.

Kino-o-shima. (A. Adams l. c.)

Quamvis clar. Redfield in Ann. of New York Lyc. of Nat. Hist. 1847 de discrimine quod  
inter *Cypraeam reticulatam* et *histrionem* creditur, uberius scripserit, mihi non contigit differentias  
constantes inter utramque speciem invenire; est enim *Cypraea reticulata* admodum variabilis tam  
magnitudine quam habitu et pictura.

*Cypraea Arabica* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 718. Mus. Lud. Ulr. pag. 566. Rumphii Mus. Tab. 33. fig. M. Reeve Conch.  
icon. spec. 2.

Tago (A. Adams), Jedo (Lischke).

Specimina haud adulta exstant.

*Cypraea Mauritiana* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 721. Mus. Lud. Ulr. pag. 571. Rumphii Mus. Tab. 38. fig. E. Caput serpentis  
majus. Mart. Conch. Cab. vol. 1. fig. 228. 229. Schrenck Nordjap. Moll. pag. 457.

Specimen minus adest.

*Cypraea caput serpentis* Lin

Syst. Nat. ed. 10. pag. 720. Mus. Lud. Ulr. pag. 571. Rumphii Mus. Tab. 38. fig. F. Caput serpentis minus.

Unum specimen clar. J. Rein legit.

Haec cochlea latissime dispersa est. Cypraeam caput anguis Phil. pro varietate habeo.

*Cypraea moneta* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 723. Mus. Lud. Ulr. pag. 578. Rumphii Mus. Tab. 39. fig. C. A. Adams l. c. pag. 94. De Cypraeis icterina et Barthelemyi conf. Thes. Conch. figg. 244—251.

Nagasaki (Lischke) Tatiyama (A. Adams). Hakodate Schrenck. Nordjap. Moll. pag. 457. In collectione nostra desideratur.

*Cypraea annulus* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 723. Mus. Lud. Ulr. pag. 578. Rumphii Mus. Tab. 39. fig. D.

Nagasaki.

Duo specimina exstant.

*Cypraea vitellus* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 721. Porcellana salita. Rumphii Mus. Tab. 38. fig. L. Dkr. Moll. Jap. pag. 9.

Specimen statura mediocri vivide pictum ocellis effulgentibus.

*Cypraea lynx* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 721. Mus. Lud. Ulr. pag. 573. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 70.

Species in terrarum orbe late dispersa.

*Cypraea tigris* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 721. Mus. Lud. Ulr. pag. 721. Rumphii Mus. Tab. 38. fig. A. Porcellana guttata.

Specimen exstat colore fusco-nigricante tinctum, maculis confluentibus, praeterea testa juvenis punctata et undata adest.

*Cypraea miliaris* Gmelin.

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3420. Martini Conch. Cab. vol. 1. fig. 323. Cypraeam Lamarckii Gray Zool. Journ. 1. pag. 506. pro varietate habeo.

Duo specimina minora lecta sunt.

*Cypraea erronea* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 723. Mus. Lud. Ulr. pag. 577. = C. ovum et subflava Gmelini = olivacea Lamarckii (non Gmel.).

Mare Japonicum australe.

*Cypraea erosa* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 723. Mus. Lud. Ulr. pag. 579. Rumphii Mus. Tab. 39. fig. A. Martini Conch. Cab. vol. 1. fig. 320. 321.

Jokohama.

*Cypraea onyx* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 722. Mus. Lud. Ulr. pag. 574. Rumphii Mus. Tab. 38. fig. G.

Duo specimina exstant.

Cum hac specie plerumque *Cypraea adusta* Chemnitzii (Conch. Cab. vol. 10, pag. 106. Tab. 145. fig. 1341.) jungitur, quae vero, ut septem specimina collectionis nostrae saltem probant, testa majore tenuiore, magis piriformi, colore, dentibus pallidioribus exceptis, penitus castaneo nec non umbilico melius expresso differt, quod hic tantum indicare volui.

*Cypraea pallida* Gray.

Zool. Journ. vol. 1. pag. 387. Reeve Conch. icon. spec. 54. Jay in Perry Jap. Exp. Shells pag. 297. (si determinatio recta).

Mare Japonicum.

Haec species satis frequens ad Isthmum Panamensem, inter Mollusca Japonica nostra desideratur.

*Cypraea helvola* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 724. Mus. Lud. Ulr. pag. 579. Var. = *C. citrina* Gray Thes. Conch. fig. 218. 219.

Duo specimina minora vivide colorata exstant.

*Cypraea clandestina* Lin.

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1177. His verbis Linnaei bene descripta: Testa laevis livida magnitudine *Cypraeae* Aselli, fascia una alterave pallida obsoleta. Notae propriae sunt striae pictae, luteae, transverse passim concurrentes, vix nisi oculo armato manifestae. Subtus testa alba immaculata est.

Plura specimina exstant.

Figura Reeveana Conch. icon. sp. 106. secundum specimen pergrande desumpta est. Specimina tali magnitudine rarissime obveniunt.

*Cypraea caurica* Lin.

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1179. Rumphii Mus. Tab. 38. fig. P.

Satanomosaki A. Adams Journ. Proc. Linnean Soc. vol. 7. pag. 94.

*Cypraea gracilis* Gaskoin.

Proc. Zool. Soc. 1848. pag. 93. Sow. Thes. Conch. *Cypraea* fig. 315—317.

Specimen unum lectum est. (Mare chinense.)

*Cypraea staphylaea* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 725. Mus. Lud. Ulr. pag. 583.

Duo specimina minora exstant colore pallidiore, granulis obsoletis ad varietatem pertinentia, quae Lamarckio est *Cypraea limacina*.

*Cypraea cicercula* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 527. ed. 12. pag. 1181. Rumphii Mus. Tab. 39. fig. K. Born. Mus. Caes. Vind. pag. 495. Tab. 8. fig. 19. Mart. Conch. Cab. vol. 1. fig. 243. 244. = Lienardi Jouss.

Specimen decoloratum lectum est.

*Cypraea globosa* Gray.

Sow. Conch. Ill. no. 117. Reeve Conch. icon. vol. 3. *Cypraea* spec. 152. = *Cypraea pilula* Kien. var.?

Species singularis parvula.

Satanomosaki A. Adams.

*Cypraea grando* Gaskoin.

Proc. Zool. Soc. 1848. pag. 96.

Goto et Simoda A. Adams Journ. Proc. Linn. Soc. vol. 7. pag. 94.

Manila Gaskoin. Hanc speciem clar. Weinkauff pro *Cypr. oryza* Lam. juv. habet.

Ut conchyliologi sciunt, jam Linnaeus in decima Systematis Naturae editione *Cypraeas* in certum ordinem redigere tentavit eas dividens primo in subturbinatas, secundo obtusas absque spira manifesta, tertio umbilicatas, quarto marginatas. Posterius in formas quasdam *Cypraeorum* adeo genera fundata sunt, quibus vero jus haud concedendum est, cum genera ista finibus artis minime sint secernenda. Nonnullae tamen sectionem permittunt bene terminatam, ex gr. illae *Cypraeae* minores et minimae Triviae dictae, quae costis rugisque transversis notantur, ut *Cypraea pediculus* Linnaei ceteraeque. Non repugnabo, si pro genere habeantur.

**Amphiperascaeae.**

**Genus Amphiperas Gronov.\*)**

*Amphiperas Ovum* Lin. (Bulla).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 725. Mus. Lud. Ulr. pag. 584. Syst. Nat. ed. 12. pag. 1181. Gmel. pag. 3422.

Rumphii Mus. Tab. 38. fig. Q. (Ovum). Lam. anim. sans vert. vol. 10. pag. 467. Ovula oviformis.

Specimen grande pulcherrimum 94 mill. longum exstat.

*Amphiperas rhodium* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1854. pag. 130. Tab. 28. fig. 8.

Plura specimina lecta sunt.

Discrimen gravius inter hanc speciem et Ovulum triticeum Sow. quale in Thesouro Conch. vol. 2. pag. 474. Tab. 100. fig. 20. 21. descriptum et depictum est, invenire non potui.

*Amphiperas triticeum* Lam. (Ovula).

Anim. sans vert. ed. alt. pag. 470. Ovulum triticeum Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 474. fig. 20. 21.

Mare Japonicum; Lamarckio auctore pariter in litore Africano obvenire dicitur.

*Amphiperas formosum* Sow. (Ovulum).

Voy. of Samarang Tab. 6. fig. 6a.b. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 474. Tab. 101. fig. 99. 100.

Specimen in Japonia lectum cum iconibus supra laudatis satis convenit.

---

\*) Hic notandum est nomen genericum Gronovii „Amphiperas“ ab *ἀμφί* (utrinque) et *πέρας* (finis) derivandum esse, quam ob rem pro neutro usurpari debet; sed clar. Gray in Proc. Zool. Soc. 1847. pag. 143. (Gen. of rec. Moll.) *Amphiceras* scripsit (*κέρας* cornu). Cum haec denominatio aptior videatur, vox *Amphiperas* fortasse in errore typographico nititur.

Testa nitidissima dorso subangulosa, rufa, subviolacea, transversim tenerrimeque striata, striae sub vitro puncturatae; apertura angusta; labrum subangulatum plicatum, plicis margine postico in denticulos nonnullos exeuntibus; labium laevissimum antice crenatum. — Long. 11 mill.

*Amphiperas hordaceum* Lam. (Ovula).

Anim. sans vert. vol. 10, pag. 471. Kiener Icon. Coq. viv. Tab. 6. fig. 6. Ovulum hordaceum Sow. Thes. Conch. vol. 2, pag. 473. Tab. 101. fig. 110—112.

Testam unicam nondum adultam dubitatione aliqua hic enumero ut Ovulam hordaceam Lamarekii veram.

**Genus Radius Montf.**

*Radius volva* Lin. (Bulla).

Syst. Nat. ed. 10, pag. 725. Mus. Lud. Ulr. pag. 584. *Radius textoris* Argenv. Conch. Tab. 18. fig. J. *Ovula volva* Lam. anim. sans vert. vol. 7, pag. 370.

Specimen maximum exstat.

*Radius roseus* A. Adams (Volva).

Proc. Zool. Soc. 1854, pag. 130. Tab. 28, fig. 9.

Mare Japonicum (Menke), M. Chinense (H. Cuming).

Hanc speciem quondam ab amico C. Th. Menke accepi, cuius memoriam nulla delebit oblivio. In schedula *Ovula birostris* Lam. nominata erat, quae vero ventricosior est.

*Radius Philippinarum* Sow. (Ovulum).

Thes. Conch. vol. 2, pag. 481. Tab. 100. fig. 57, 58. Proc. Zool. Soc. 1848, pag. 136.

Inter Mollusca Japonica unicum tantum specimen exstat. Plura specimina ex insula Philippinarum Capul quondam reportavit H. Cuming.

*Radius Adamsii* Dkr. (Volva).

Tab. nostra 13. fig. 3, 4.

Malak. Bl. vol. 24, pag. 75.

Testa angusta extensa, utrinque sensim rostrata, nitida rufescens vel alba, extremitatibus lineis transversis puncturatis sub vitro tantum conspicuis cincta; apertura rectiuscula antice subdilatata utrinque subtruncata; labrum incrassatum laeve. — Long. 20 mill., lat. vix 6 mill.

Duo specimina exstant alterum lacteum, alterum rufescens.

Hanc speciem nullibi descriptam invenire potui. Inter omnes sui generis species *Radio* praecedenti simillima est, qui vero statura multo majore minus gracili abunde differt. Denominata est in honorem clar. A. Adams eruditissimi Molluscorum Japonicorum scriptoris.

*Radius Carpenteri* Dkr. (Volva).

Tab. nostra 13. fig. 1, 2.

Malak. Bl. vol. 24, pag. 75.

Testa gracilis fusiformis antice posticeque attenuata subrecurva, carneo-rubens, nitida, striis tenuissimis undulatis sub vitro tantum conspicuis utrinque cincta; labrum glabratum laeve;



apertura perangusta subrecta antice latior; columella et labri pars antica sinuosae. — Long. 35 mill., diam. maxima 7 mill.

Unum tantum specimen exstat, speciei quae antecedit, quidem analogum, sed habitu majore formaque graciliore diversum.

Philippo P. Carpenter Molluscorum peritissimo haec species dicata est.

## Cancellariacea.

### Genus Cancellaria Lam.

#### Cancellaria Spengleriana Deshayes.

Enc. méth. vers vol. 2. pag. 185. Cancellaria Tritonis Sow. Conch. Ill. fig. 15. Cancellaria Spengleriana Thes. Conch. vol. 2. pag. 439. Tab. 93. fig. 29. Reeve Conch. icon. spec. 11.

Plura specimina juvenilia et adulta lecta sunt. Pariter ex insulis Philippinis affertur.

Clar. A. Adams in Ann. Mag. Febr. 1864. pag. 143. animal descripsit, quod Mitris affine esse affirmat.

#### Cancellaria nodulifera Sow.

Tab. nostra 6. fig. 24. 25.

Tankerv. Cat. pag. 15. (1825) Conch. Ill. fig. 21. Thes. vol. 2. pag. 440. Tab. 94. fig. 57. Reeve Conch. icon. spec. 6. Cancellaria imperialis Michelin Guerin Mag. Hist. Nat. (1832) Tab. 16.

A. Adams Japanese species of Cancellariidae Ann. Mag. Nat. Hist. 1868. vol. 2. pag. 368.

Specimina tria exstant, maximum integerrimum et pulcherrimum icon nostra ante oculos ponit. Plicae in specie nostra quidem parum prominent, nihilo minus tamen pictor eas clarius exprimere debebat.

#### Cancellaria semipellucida Adams et Reeve.

Moll. Voy. Sam. pag. 42. Tab. 10. fig. 3. 3a.

Mino-shima. A. Adams.

Specimen incompletum exstat.

#### Cancellaria Bocageana Crosse et Debeaux.

Journ. de Conch. 1863. vol. 9. pag. 77. 263. Tab. 9. fig. 3. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 41. Tab. 2. fig. 12. 13. 14.

Sinus Jedoënsis, Mare Chinense septentrionale.

Clar. Lischke hanc speciem habitu paululum variabilem l. l. fusius tractavit. Specimina nostra icone Lischkeana minora sunt.

#### Cancellaria asperella Lam.

Enc. Méth. pag. 347. fig. 3. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 447. Tab. 93. fig. 38.

Mare Japoniae mediterraneum.

Specimen integrum icone Sowerbyana paululo minus exstat. „Kongū-bora“ Japanorum.

**Cancellaria Reeveana Crosse.**

*Cancellaria elegans* Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 446. Tab. 93. fig. 36. Tab. 96. fig. 104. *Metrica elegans* H. et A. Adams Gen. Rec. Moll. vol. 1. pag. 277. Crosse Journ. de Conch. vol. 9. pag. 237. (non *C. elegans* Desh. quae species est fossilis teliuris tertiariae).

Duo specimina integra Japonica exstant.

(Philippinae insulae, H. Cuming.).

Haec cochlea prope accedit ad *Cancellariam asperellam* Lamarckii, quae vero sutura canaliculata et sculptura asperiore differt. Apex oblique tortus est. „Giō-ja gai“ Japonorum.

**Cancellaria macrospira Adams et Reeve (Merica).**

Zool. Voy. Samar. Moll. pag. 41. Tab. 10. fig. 2. Ann. Mag. Nat. Hist. Nov. 1863. pag. 368.

Fretum Coreanum, litus Borneense, Mare Sinense.

Species spira producta atque turrita insignis.

**Cancellaria Fischeri A. Adams (Merica).**

Ann. Mag. Nat. Hist. 1860. ibid. Nov. 1868. pag. 363.

Mino-shima in freto Coreano.

Haec species mihi incognita est.

H. et A. Adams fratres *Cancellarias* in subgenera diviserunt (Gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 275.) quae clar. A. Adams posterius adeo atque ut genera vera promulgavit (Japanese species of *Cancellaridae* in Ann. Mag. Nat. Hist. nov. 1868. pag. 368). Hanc dividendi rationem minime comprobare possum, cum subgenera ista sic dicta unum in alterum transeant ideoque haud respicienda sint. At contra clar. Crosse Journ. de Conch. vol. 9. pag. 229. *Cancellarias* in sectiones *Purpuraeformes*, *Mitraeformes* etc. divisit, quod naturae magis respondere mihi videtur.

**Genus Admete Möller.**

*Admete viridula* O. Fabr. (Tritonium).

*Admete crispa* Möll. Ind. Moll. Scand. *Cancellaria viridula* Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 449. Tab. 96. fig. 102. A. Adams Ann. Mag. Nov. 1868. pag. 368.

Sinus Aniwa; Castle Point, Manchuria.

(Litus Norvegicum, Labradorensis etc.)

*Admete arctica* Midd. (*Cancellaria*).

*Admete borealis* A. Adams Ann. Mag. Nov. 1868. pag. 369.

Iisdem locis.

*Admete Japonica* Smith (*Cancellaria*).

Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 216. Tab. 20. fig. 54.

Fretum Coreanum.

## Trichotropidea.

### Genus *Trichotropis* Brod. et Sow.

#### *Trichotropis cedo nulli* A. Ad.

Ann. Mag. 1860. (mense Maji) pag. 411. Sow. Thes. vol. 3. pag. 322. fig. 4. 5.

Specimen unum adest. Mino-shima A. Adams.

Species anfractibus rotundatis, spira producta, apertura subrotunda, columella truncata et sculptura pulcherrime cancellata insignita.

#### *Trichotropis bicarinata* Brod. et Sow.

Thes. pag. 323. fig. 7. 8.

Specimen integrum in Museo Senckenbergiano exstat his notis insigne: anfractus bicarinati celeriter accrescentes; carinae setis longis distantibus instructae; apertura maxima subquadrata; columella latiuscula plana canaliculo brevi terminata; umbilicus vix expressus carinula hirta cinctus.

Mare Japoniae septentrionalis.

Icon Sowerbyana specimen ante oculos ponit maximum 41 mill. altum perspicue umbilicatum.

*Trichotropis bicarinata* species maxima est sui generis hucusque nota.

#### *Trichotropis unicarinata* Sow.

Tab. nostra 1. fig. 11. 12.

Thes. vol. 3. pag. 323. Tab. 285. fig. 10.

Haec species rarissima, mire delectans, forma sua Latiaxin in mentem revocat. Testa anfractibus octonis, sutura constricta divisis, superne angulatis inde scalatis a carina funiculi instar cinctis nec non umbilico latissimo pervio a carina crassa circumdato insignita est. Color flavido albus. Epidermis ignota est. Suspicio eam in carina setigeram esse.

#### *Trichotropis borealis* Brod. et Sow.

Zool. Journ. vol. 4. pag. 375. Sow. Thes. Conch. vol. 3. pag. 321. Tab. 285. fig. 1—3.

Castle Point in litore Mandshurico. A. Adams.

Species circumpolaris late dispersa. De variis locis ubi observata est, conferatur clar. de Schrenck Amurl. vol. 2. pag. 601.

#### *Trichotropis inermis* Hinds.

Proc. Zool. Soc. 1843. pag. 17. Sow. Thes. Conch. vol. 3. pag. 321. Tab. 285. fig. 14.

Insula Okosiri.

Middendorffius hanc testam pro varietate antecedentis habet; secundum descriptionem et iconem Thesauri Conch. species propria esse mihi videtur.

#### *Trichotropis insignis* Midd.

Malac. Ross. vol. 2. pag. 107. Tab. 10. fig. 7—9. Sow. Thes. Conch. vol. 3. pag. 322. Tab. 285. fig. 9.

Mare Beringii.

Dunker, Moll. Jap. mar.

*Trichotropis* (Iphinoë) *quadricarinata* A. Ad.

Ann. Mag. Aug. 1861. pag. 135. Sow. Thes. Tab. 235. fig. 15. 16.

Mino-shima. A. Adams.

Haec species desideratur.

**Cerithiacea.**

**Genus *Cerithium* Adanson.**

*Cerithium Guinaicum* Philippi.

Abbild. vol. 3. pag. 5. 17. Tab. 1. fig. 13. Sowerby Thes. Conch. vol. 2. pag. 866. fig. 126. 127.

*Vertagus Guinaicus* H. et A. Adams Gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 285.

Icones Sowerbyanae melius in specimen nostrum quadrant quam figura Philippiana, quae costas infra suturam minime interruptas ostendit. Sed clar. Philippi in describenda hac specie sulcum illum transversum, quo costae interruptae apparent, verbis „anfractu ultimo infra suturam coarctato“ jam indicavit.

Haec species et in sinu Guineensi (ad Gabon teste Largilliert) invenitur. *Cerithio* Mediterraneo Deshayesii aliqua ex parte affinis est.

*Cerithium echinatum* Lamarck.

Anim. sans vert. vol. 9. pag. 291. Sowerby Thes. Conch. vol. 2. pag. 858. fig. 44. *Cerithium*

*mutatum* Sowerby Gen. of Shells. Kiener Coq. viv. pag. 7. Tab. 3. fig. 1. 1a. Reeve Conch. icon. *Cerithium* spec. 10.

Unum specimen minus exstat plane conveniens cum illis, quae ex Philippinis insulis et litore Africae orientalis proveniunt.

*Cerithium columna* Sowerby. var.

Thes. Conch. vol. 2. pag. 855. Tab. 178. fig. 55—58. Reeve Conch. icon. *Cerithium*. sp. 2. = *Cerithium echinatum* Kieneri.

Specimen unum albidum dense acuteque liratum in anfractu ultimo haud nodosum. Species habitu ac sculptura inconstans satis frequens et in Mari Erythraeo aliisque locis.

*Cerithium dialeucum* Phil.

Abb. vol. 3 *Cerithium* pag. 14. Tab. 1. fig. 5. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 72. Nagasaki.

*Cerithium humile* Dkr.

Moll. Jap. pag. 9. Tab. 2. fig. 17. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. Tab. 3. fig. 18.

Plura specimina illaesa in variis Japoniae locis saepius lecta sunt.

*Cerithium Kobelti* Dkr.

Tab. nostra 4. fig. 8. 9.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 67.

Testa solida, oblongo-turrita, flavidula, varicosa, anfractibus octonis vel novenis convexis sutura distincta sejunctis per longitudinem dense plicatis transversimque liratis asperis et nodiferis

instructa, ultimo tertiam longitudinis partem fere aequante; apertura ovato-rotundata; canalis brevissimus paululum resupinatus; labrum incrassatum intus sulcatum.

Testa magnitudine mediocri vix 23 mill. longa, irregulariter varicosa, liris subtilibus et duabus crassioribus medium anfractuum tenentibus plicas decussantibus insignis est.

Collectio nostra Cerithiorum magna speciem nullam continet quacum haec conjungi possit. Cerithio dialeuco Phil. cognata est.

In honorem Guilielmi Kobelt eam nominavi.

*Cerithium granosum* Kien.

Coq. viv. *Cerithium* Tab. 4. fig. 3. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 63.  
Nagasaki.

**Genus *Vertagus* Klein.**

*Vertagus Chinensis* Chemnitz. (Turris).

Conch. Cab. vol. 4. fig. 1489. Turris seu obeliscus Chinensis. Murex Sinensis Gmel. Syst. Nat. ed. 13. pag. 1542. Cer. obeliscus Brug. Enc. méth. Tab. 443. fig. 4. Sowerby Thes. Conch. vol. 2. pag. 851. Tab. 177. fig. 30—32.

Species variabilis late dispersa.

Specimina maxima exstant.

*Vertagus aluco* Lin. (Murex).

Mus. Lud. Ulr. pag. 643. Syst. Nat. ed. 12. pag. 1225. Rumphii Mus. Tab. 30. fig. N. Strombus tuberosus = Murex coronatus Born. Test. Mus. Vind. pag. 322. Reeve Conch. icon. *Vertagus* spec. 3.

Duo specimina exstant maculis fuscis marmorata et aspersa.

Species in Philippinis insulis haud rara.

*Vertagus fasciatus* Bruguière (*Cerithium*).

Enc. méth. pag. 474. Cer. no. 3. *Cerithium Martinianum* Pfeifferi Krit. Reg. pag. VII. Chemn. Conch. Cab. fig. 1480. *Cerithium procerum* Kiener Coq. viv. Tab. 18. fig. 2. Sowerby Thes. Conch. vol. 2. pag. 849. Tab. 176. figg. 6—10. (icones optimae).

Unum specimen ex itinere in Japoniam facto clar. J. Rein. retulit totum album statura modica.

Magnam huius cochleae seriem e litore Africae orientali, praesertim ex insula Zanzibar ante oculos habeo, quae docet *Cerithium Martinianum* Pfeifferi nec non *Cerithium procerum* Kieneri ab hac specie mirum in modum variabili non separanda esse. Cochlea modo est alba, modo fusco-fasciata, vel seriatim maculata, plus minusve sulcata, verum etiam plicis evanescentibus instructa, imo in anfractibus ultimis interdum sine ullo plicarum vestigio invenitur. Specimina quae beatus H. Pease ex insulis Sandwich quondam ad me misit, habitu minore et graciliore insignita sunt, ceteroquin cum reliquis plane congruunt.

*Vertagus attenuatus* Phil. (*Cerithium*).

Philippi Abb. vol. 1. Tab. 1. fig. 2. 1849. *Cerithium longicaudatum* Adams et Reeve Zool. Samarang. Moll. pag. 43. Tab. 10. fig. 15.

Fretum Coreanum, insulae Philippinae.

Species rostro angusto longo resupinato insignis.

**Vertagus Kochii Philippi (Cerithium).**

Abb. vol. 3. pag. 14. Tab. 1. fig. 3.

Plura specimina Japonica exstant ex parte varicibus instructa, pleraque lineis fuscis sulcos occupantibus ornata. Cochlea rarius unicolor alba obvenit ut specimen originale Philippianum e Mari Erythraeo.

**Vertagus Pfefferi Dkr.**

Tab. nostra 4. fig. 12. 13. fig. 14. anfractus ultimus magnitudine aucta delineatus.

Testa anguste turrita albida vel flavescens, fasciis fuscis cincta, anfractibus convexiusculis transversim costatis et lineatis per longitudinem plicatis granosis et asperis instructa, ultimo tertiam longitudinis partem aequante, antice carinato minutimque cancellato; apertura ovato-rotunda; labrum paulum incrassatum externe, ut in Cerithiaceis solet, varicosum; columella laevis haud plicata; canalis rectus brevissimus paulum resupinatus.

Cochlea nostra 22 mill. alta, 6 lata, sculpturae indole Cerithio Kochii similis est, sed statura multo minore, sculptura asperiore — cum costulae anfractuum tres nodulos ferant aliquantulum compressos magis prosilientes — canali breviori recto, columella haud plicata differt.

Plura specimina plane congruentia exstant.

Species amico Guilielmo Pfeffer dedicata est.

**Genus Colina H. et A. Adams.**

*Colina pupaeformis* A. Adams.

Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 877. Tab. 148. fig. 221.

Colinarum ad hoc tempus quantum scio, duo tantummodo species notae sunt, haec et *Colina macrostoma* Hindsii. A Cerithiis veris praesertim testa angusta, anfractibus inferioribus coarctatis et peristomate expanso differunt.

Unum solummodo exemplar mutilatum exstat in collectione Molluscorum Japoniae.

**Genus Bittium Leach.**

*Bittium pusillum* Dkr.

*Cerithium pusillum* Dkr. in Malak. Bl. vol. 6. pag. 224. Moll. Jap. pag. 11. Tab. 2. fig. 6. magn. aucta.

Portus De-shimae.

*Bittium scalatum* Dkr.

Testa exigua, tenuicula, anguste turrita, flavo-albida, anfractibus 10—11 subangulatis et scalatis longitrorsum crasse costatis transversimque tenuiliratis instructa, anfractus ultimus in dorso varice signatus; apex acutus. — Long. vix 5 mill., lat. paene 2 mill.

Cochleola interdum punctulis singulis fuscis aspersa, anfractibus supra suturam distincte angulatis insignis est.

**Genus Triforis Deshayes.**

*Triforis violacea* Quoy et Gaimard (*Cerithium*).

Voy. de l'Astr. vol. 3. pag. 134. Tab. 55. figg. 22. et 23. Dkr. Moll. Jap. pag. 10.

Portus De-shimae. Australia, Nova Irlandia.

*Triforis fusca* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 237. Moll. Jap. pag. 10. Tab. 2. fig. 22. magn. aucta.

Portus De-shimae.

*Triforis granulata* Adams et Reeve.

Voy. Samar. pag. 46. Tab. 11. fig. 33 a. b. Dkr. Moll. Jap. pag. 10.

Portus De-shimae.

*Triforis exilis* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 237. Moll. Jap. pag. 10. Tab. 2. fig. 9.

Portus De-shimae.

*Triforis tricineta* Dkr.

Moll. Jap. pag. 10. Tab. 2. fig. 1. magn. aucta. (nomine *Tr. cingulatae*).

Portus De-shimae.

**Genus Lampania Gray.**

*Lampania zonalis* Bruguière (*Cerithium*).

Lamarck anim. sans vert. vol. 9. pag. 299.

Multa specimina exstant peristomate et labro sinuato ex parte laesa.

In operis Lischkeani vol. 1. pag. 73. de hac specie fusius disputatum est.

*Lampania multiformis* Lischke.

Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 74. Tab. 6. fig. 1—10.

Plurima specimina cum varietatibus primariis, in opere Lischkeano optime delineata, a clar. J. Rein collecta sunt.

Cochlea frequentissima cum specie praecedente aquas Japoniae semisalsas praesertim fluminum ostia habitare dicitur.

Haec species a clar. Reeve (Conch. icon. *Lampania* spec. 2.) cum *Lampania Cumingii* Crosse confusa esse videtur, quae vero satis differt.

*Lampania aterrima* Dkr.

Tab. nostra 5. fig. 7. 8.

Testa turrita gracilis, anfractibus 10—12 plano-convexis, sutura leviter impressa divisis, transversim denseque costulatis instructa, costulis nonnullis infra suturam seriatim granosis; anfractus supremi plicati, ultimus tertiam longitudinis partem adaequans, paulum dilatatus; columella arcuata supra infraque callosa; labrum subexpansum vix sinuatum, intus sulcatum; canalis latus brevissimus; color aterrimus excepta columella caesia vel lactea. — Long. 30 mill.

Duo specimina Japonica congruentia in collectione clar. Theodori Loebbecke Dusseldorpini exstant.

**Lampania Cumingii Crosse.**

Journ. de Conch. vol. 10. pag. 54. Tab. 1. fig. 10. 11. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 76. Tab. 6. fig. 11. 12. (Icones Lischkeanae a speciminibus nostris desumtae sunt.)

**Genus Tympanotonus Agass.**

**Tympanotonus fluviatilis Pot. et Mich. (Cerithium).**

Cat. des Moll. de Douai pag. 363. Tab. 31. fig. 19. 20. Reeve Conch. icon. Tympanotonos fig. 9 a. b. Cerithium microptera Kien.

Plura specimina lecta sunt ex parte lineis fuscis vividissimis cincta et magnitudine variantia, sed sculptura in omnibus constans est. Cerithium alatum Philippii (Abb. vol. 3. pag. 17. Tab. 1. fig. 11.), quod Lischke cum specie nostra jungendum esse putat, nisi species est genuina, quod credo, cum Tympanotono macroptero Kieneri potius conjunxerim.

Cochlea late dispersa in collectione exstat variis regionibus lecta, ex. gr. in insula Sumatra (Dinklage), Ceylon (Guil. Blanford, Robertus de Schlagintweit), Madras, Nicobar etc. J. Zelebor \*). Omnibus locis quantum scio, in aquis semisalsis invenitur.

**Litorinacea.**

**Genus Litorina Férussac.**

**Litorina grandis Middend.**

Bull. de la classe physico-mathém. de l'Acad. de St. Pétersb. T. 7. no. 16. Reise etc. vol. 1. pars 1. pag. 198. Tab. 11. fig. 4—10.

Testa maxima solida transversim inaequaliterque striata et lirata, cinerea vel livida, fasciis angustis fuscis cincta; anfractus tumidi sex subito crescentes, ultimus ventrosus, spira acuta altior; apertura subrotunda antice haud producta; columella alba appressa plana, imo interdum subcavata; labrum acutum interne valde incrassatum, plerumque leviter sulcatum; fauces fuscae vel luteae; operculum fusco-corneum late spiratum.

Haec cochlea ad maximas Litorinarum species pertinens, a Litorina litorea vulgari primo aspectu differt liris scabriusculis inaequalibus, spira incisa, anfractibus multo convexioribus inde habitu alieno.

Plura exemplaria e sinu de Castries exstant juniora et adulta.

---

\*) Occasione hac oblata notandum mihi est, me de omnibus quae beatus Joannes Zelebor ex itinere Novarae pericosmio quondam reportaverat Molluscis indicem absolutum et criticam, ut in lucem prodiret, conscripsisse. Plures quidem species, quas pro novis habui, in literis Societatis zoologico-botanicae Vindobonensis et in opere Novarae descriptae sunt, sed index meus omnibus suis numeris perfectus, quem multis inquisitionibus instructum ad Joannem Zelebor miseram, nunquam in publicum prodiit, quod valde doleo. Posterius clar. de Frauenfeld indicem Molluscorum Novarae tenuem et aridum in commentariis Societatis illius Vindobonensis promulgavit et errores nonnullos a me commissos bona fide recepit.



*Litorina brevicula* Philippi (Turbo).

Zeitschr. für Malak. 1844. pag. 166. Abb. vol. 2. pag. 161. Tab. 3. fig. 10. spec. minus. Dunker  
Moll. Jap. pag. 12.

Plurima specimina variantia lecta sunt, majora 15 mill. lata.

*Litorina Souverbiana* Crosse. Journ. de Conch. vol. 10. pag. 53. Tab. 1. fig. 6. 7. certe  
eadem est species.

*Litorina Mandschurica* Schrenck.

Reisen im Amurl. vol. 2. Moll. pag. 333. Tab. 14. fig. 14—20.

Clar. de Schrenck hanc formam praeter alias quasdam differentias praesertim sculptura in latere inferiore diversa a specie antecedente distingui posse affirmat. Inter permulta *Litorinae breviculae* specimina, quae examinare licuit, hanc speciem mihi dubiam invenire non potui, et icones supra citatae *Litorinam breviculam* Philippii veram satis variabilem repraesentare mihi videntur.

*Litorina Malaccana* Phil.

Abbild. u. Beschr. vol. 3. *Litorina* pag. 51. (15) Tab. 6. fig. 17. (magn. nat. et aucta).

Pulo Pinang, legit Th. Philippi. Plura specimina prope Tokio lecta descriptioni et iconibus Philippianis plane respondentia clar. Satow misit.

*Litorina exigua* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 226. Moll. Jap. pag. 13. Tab. 2. fig. 3. *Litorina granularis* Reeve.  
Conch. icon. *Litorina* spec. 68. Schrenck pag. 340. non Gray Zool. of Bechey's Voyage pag. 140.

Portus De-shimae (Nuhn), Nagasaki (Rein.), Hachijō-shima (Satow.). Specimina plurima exstant vix variantia.

Legantur quae clar. Lischke de hac cochleola vulgatissima exposuit.

*Litorina Sitchana* Philippi.

Proc. Zool. Soc. 1845. pag. 140. Abb. vol. 3. pag. 49. Tab. 6. fig. 13. 18.

Unum specimen inter Mollusca Japonica a clar. J. Rein. allata repertum est.

*Litorina subtenebrosa* Middendorff.

Bull. de la cl. phys.-math. de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersb. vol. 7. pag. 242. Mal. Ross. vol. 2. pag. 64. Reise vol. 2. pag. 1. pag. 202. Tab. 9. fig. 11. 12.

Clar. de Schrenck (Nordjap. Moll.) hanc speciem, *Litorinam* Kurilam Middendorffii, tenebrosam Montagui aliasque cum *Litorina Sitchana* Philippii jungendas esse putat, sed ego certe hoc confirmare non possum, cum harum cochlearum earumque varietatum magnam copiam, quae comparari possit, non habeam ante oculos. Vir ille praestantissimus saepius species quasdam conjunxit finibus nimis latis eas terminans, quae mea opinione separari debent.

Specimina nostra Japonica — sine dubio e regione septentrionali — iconibus *Lit. subtenebrosae* Midd. (Reise etc. vol. 1. pars 1. pag. 202. Tab. 11. fig. 11. 12.) satis respondent, sed a *Lit. Sitchana* transversim crosse sulcata valde differunt.

**Litorina Sinensis Philippi.**

Abb. vol. 3. pag. 52. 16. Tab. 6. fig. 23. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 71.

Exemplaria nostra specimine a clar. Philippi delineato paulo majora sunt, ceteroquin plane respondent.

**Litorina strigata Lischke.**

Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 73. Tab. 5. fig. 22.

Nagasaki.

Haec cochleola antecedenti admodum affinis, in collectione nostra desideratur.

**Litorina modesta Philippi.**

Proc. Zool. Soc. 1845. pag. 141. Abb. u. Besch. vol. 3. pag. 48. Lit. Tab. 6. fig. 12. Schrenck, Amurl. vol. 2. Moll. pag. 310.

Sinus de Castries Schrenck, Sitcha, Nova Albion, insula Mauritius Philippi.

Haec species antecedenti cognata desideratur.

**Litorina Sieboldii Phil.**

Proc. Zool. Soc. 1845. pag. 142. Abb. u. Besch. vol. 3. Tab. 6. fig. 3.

Mare Japonicum, legit cl. de Siebold. Hae quatuor species ad Melaraphen Mühlfeldtii pertinent.

**Genus Lacuna Turton.**

**Lacuna vineta Mont.**

Test. Brit. pag. 307. Schrenck Amurl. vol. 2. Moll. pag. 319.

Sinus de Castries et Hakodate.

**Lacuna glacialis Möll.**

Ind. Moll. Groenl. 1842. pag. 9. Midd. Reise etc. vol. 1. pag. 197. Tab. 10. fig. 10. 11.

Inter Mollusca nostra Japonica unum specimen Lacunae prostat, quod huc referendum esse arbitror. (Mare Ochotense Middend.)

**Lacuna latifasciata A. Ad.**

Ann. Mag. n. Maji 1863. pag. 350.

Kino-o-shima.

Lacunae pallidulae Da Costa habitu similis, sed fascia rufa lata notata.

**Lacuna turrita A. Ad. (Medoria).**

Ann. Mag. 1861. pag. 305. ibid. 1863. pag. 350.

Insula Rifunsiri.

Lacunae crassiori Walkeri affinis.

**Lacuna decorata A. Ad. (Epheria).**

locis cit.

Insula Rifunsiri.

locis cit.  
Rifunsiri.

*Lacuna inflata* A. Ad. (Epheria).

*Lacuna carinifera* A. Ad. (Epheria).  
Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 225. Ann. Mag. 1863. pag. 350.  
Takano-shima.

*Lacuna lepidula* A. Ad. (Epheria).  
Ann. Mag. m. Maji 1863. pag. 350.  
Seto-Uchi, Akasi.  
Species parvula umbilico lato carinula acuta cincto insignita.

### Genus *Stenotis* A. Adams.

*Stenotis laxata* A. Ad.

Ann. Mag. 1863. pag. 351.  
Idsuma-Nada, Yobuko.  
Adamsius hanc cochleolam singularem Lacunaceis subjunxit, annotans eam tam Fossarum,  
quam Naticinam parvulam in memoriam reducere.

## Fossarea.

### Genus *Fossarus* Philippi.

Species huius generis Japonicae ab Adamsio detectae hae sunt:

*Fossarus costatus* Brocchi (Nerita).

Conch. foss. pag. 300. Tab. 11. fig. 11. = *Delphinula costata* Bronn = *Purpura costata* Sow.  
= *Fossarus tornatilis* Gould. Otia pag. 110. = *Fossar Japonicus* Adams Ann. 1861.  
pag. 139.

Kuro-shima, Tsu-shima.

*Fossarus trochlearis* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1853. pag. 187.

O-shima.

*Fossarus fenestratus* A. Adams.

O-shima.

### Genus *Fossarina* Adams et Angas.

*Fossarina picta* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1867. pag. 312. Tab. 19. fig. 26.

Tanabe, Oki-no-shima.

*Fossarinae* patulae Ad. et Ang. Novae Hollandiae affinis.

Quaeritur num locum rectum teneat in ordine systematico?

Dunker, Moll. Jap. mar.

**Genus Couthouya A. Adams.**

*Couthouya decussata* A. Adams.

Ann. and Mag. 1860. pag. 410.

Mino-shima.

*Couthouya reticulata* A. Adams.

*Fossar reticulatus* A. Ad. Proc. Zool. Soc. 1853. pag. 186.

Seto-Uchi, Uraga.

*Couthouya striatula* A. Adams.

Yobuko.

*Couthouya plicifera* A. Adams.

Yobuko.

**Genus Isapis H. et A. Adams.**

*Isapis lirata* A. Adams.

Ann. Mag. 1860. pag. 120.

Mino-shima, Uraga.

*Isapis conoidea* A. Adams.

Takano-shima.

**Genus Conradia A. Adams.**

*Conradia cingulifera* A. Adams.

Ann. and Mag. 1860. pag. 410.

Mino-shima, Uraga.

*Conradia carinifera* A. Adams.

Ann. and Mag. 1860. pag. 410.

Mino-shima, Goto.

*Conradia clathrata* A. Adams.

Ann. and Mag. 1860. pag. 410.

*Conradia pulchella* A. Adams.

Ann. and Mag. Oct. 1861. pag. 307.

Tsu-shima, Goto.

*Conradia doliaris* A. Adams.

Seto-Uchi.

*Conradia tornata* A. Adams.

Goto.

**Genus Gotoïna A. Adams.**

*Gotoïna sulcifera* A. Adams.

*Gotoïna pyrgula* A. Adams.

Utraque species prope insulam Goto inventa est.

Gotoïnae a Fossaro differunt fissura vel rima deficiente, a Conradia et Couthouya testa imperforata crassa et ab Isapi labio interno non dentato.

**Genus Cithna A. Adams.**

*Cithna globosa* A. Adams.

Seto-Uchi, Harima Nada.

*Cithna spirata* A. Adams.

Seto-Uchi, Idsuma Nada.

Cfr. A. Adams On the genera and species of Fossaridae found in Japan in Proc. of the Zool. Soc. of London 1863. pag. 110. et Note sur le genre Fossarus par P. Fischer. Journ. de Conch. 1864. pag. 252.

**Planaxidea.**

**Genus Planaxis Lam.**

*Planaxis pyramidalis* Gmel. (Buccinum).

Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 70.

Nagasaki.

Specimina nonnulla exstant apice erosa.

**Litiopacea.**

**Genus Alaba H. et A. Adams.**

Cochleolae huc pertinentes ab auctoribus antea pro sectione Cerithiopsidis aestimatae sunt, sed A. Adamsius postquam testae incolam observaverat, Alabam melius Litiopis adjungendam esse arbitratus est, eam in sectiones tres dividens, 1. Alabam sensu stricto sive Litiopaeiformes, 2. Dialam vel Cingulaeiformes, 3. Styliferinam vel Styliferiformes.

Clar. auctor has species Japonicas observavit:

*Alabam pictam* A. Ad. (Dialam).

Ann. Mag. Nat. Hist. Sept. 1861. pag. 143.

Takano-shima.

*Alabam leucostictam* A. Ad. (Dialam).

l. c.

Tabu-shima.

*Alabam corneam* A. Ad. (Dialam).

l. c.

Awa-shima, Takano-shima.

*Alabam zebrinam* A. Ad.

Ann. Mag. etc. Apr. 1862. pag. 296.

Tsu-shima.

- Alabam imbricatam A. Ad.  
 l. c. pag. 297.  
 O-shima.
- Alabam felinam A. Ad.  
 l. c.  
 Takano-shima.
- Alabam lucidam A. Ad.  
 l. c.  
 Takano-shima.
- Alabam inflatam A. Ad.  
 l. c.  
 O-shima.
- Alabam subangulatam A. Ad.  
 l. c. pag. 298.  
 Tsu-shima.
- Dialam variam A. Ad.  
 Ann. Mag. 1861. et Oct. 1862. pag. 293.  
 Awa-shima, Takano-shima.
- Dialam sulciferam A. Ad.  
 ibid.  
 O-shima, Tanabe.
- Styliferinam orthochilam A. Ad.  
 Ann. Mag. etc. Nov. 1860. pag. 335. Oct. 1862. pag. 299.  
 In Asteriis parasitam. — Tsu-shima.
- Styliferinam goniochilam A. Ad.  
 Ann. Mag. Nov. 1860. pag. 335. Oct. 1862. pag. 299.  
 In Ophiuris degentem. — Mino-shima.
- Styliferinam lepidam A. Ad.  
 Ann. Mag. Oct. 1862. pag. 299.  
 Yobuko.

## Rissoellacea.

### Genus Rissoella Gray.

Clar. A. Adams plures harum cochleolarum species in Mari Japonico obvias descripsit (Ann. Mag. m. Nov. 1860. pag. 332.), quae hic sequuntur:

- Rissoella omphalotropis A. Ad.  
 Sado.
- Rissoella vitrina A. Ad.  
 Tabu-shima.
- Rissoella vesicalis A. Ad.  
 Sado.
- Rissoella turgidula A. Ad.  
 Fretum Coreanum.

Tabu-shima. *Rissoella hydrophana* A. Ad.

Sado. *Rissoella spiralis* A. Ad.

Tsu-shima. *Rissoella minima* A. Ad.

Tsu-shima. *Rissoella mundula* A. Ad.

*Rissoellam minimam, mundulam et fulgidam* A. Ad. (in sched.), quae mihi praesto fuerunt, hisce verbis breviter descripsi:

*Rissoella minima* A. Ad.

Testa subumbilicata vel rimata minima 1 mill. alta, glabra, nitida, alba, anfractibus tribus et dimidio rotundatis sutura incisa sejunctis instructa; apertura circularis subincrassata.

*Rissoella mundula* A. Ad.

Testa pariter minima vix 1,5 mill. alta, rimata, nitida, pallide cornea, pellucida, anfractibus convexus rotundatis sutura profunda divisim instructa; apertura rotundato-ovata, labrum subincrassatum.

*Rissoella fulgida* A. Ad.

Testa minima 1,3 mill. alta, umbilicata, nitidissima, pallide cornea diaphana, anfractibus tribus et dimidio tumidis rapide crescentibus sutura profunda sejunctis instructa; apertura incrassata semilunaris.

## Rissoacea.

### Genus *Rissoa* Frémenville.

*Rissoa miranda* A. Adams.

Ann. Mag. Aug. 1861. pag. 135.

Mino-shima.

*Rissoa* (*Goniostoma*) *pupaeformis* A. Ad.

Ann. Mag. 1860. pag. 411.

Mino-shima.

### Genus *Rissoina* Orbigny.

Species huius generis sequentes in Japonia lectae sunt, quae prostant.

*Rissoina cancellata* Phil.

Zeitschr. für Malak. 1847. pag. 127. Var. albam Cubensem Pfeifferus R. Philippianam nominavit.

*Rissoina canaliculata* Schwarz.

Fam. der Rissoiden pag. 55. fig. 18.

*Rissoina striolata* A. Ad.

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 266. Ann. Mag. Nat. Hist. 1854. pag. 67.

**Rissoina concinna A. Ad.**

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 266. Ann. Mag. 1854. pag. 67.

Testa subulato-turrita alba, solida, anfractibus septenis vel octonis convexiusculis sutura incisa sejunctis longitudine plicatis transversimque dense striatis instructa; plicae in anfractu ultimo saepius evanidae; apertura ovata, antice effusa et subcanaliculata; labrum incrassatum. — Long. 7—8 mill.

**Rissoina miranda A. Adams in lit.**

Testa angusta, subulato-turrita, solidula, alba, transversim lirata, inter liras exquisite cancellata anfractibus septenis vel octonis instructa, superioribus biliratis, anfractu penultimo trilirato, ultimo quadrilirato; apertura ovata; labrum incrassatum. — Alt. 3,3, lat. 1 mill.

Species sculptura elegantissima insignis.

**Rissoina nitida A. Adams.**

Cfr. Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 266. Schwartz l. c. pag. 90.

Testa turrato-subulata, solida, lactea, nitida, anfractibus novenis convexiusculis per longitudinem et transverse aequaliter costata, inde eximie cancellata; apertura ovata obliqua antice subcanaliculata; labrum acutum, extus varicis instar incrassatum. — Long. 6, lat. 2 mill.

**Rissoina Sagrayana Orb.**

Cuba vol. 2. pag. 25. Tab. 12. fig. 4. 5. Dkr. Moll. Jap. pag. 11.

Portus De-shimae.

**Rissoina costulata Dkr.**

Malak. Bl. vol. 6. pag. 235. Moll. Jap. pag. 12.

Portus De-shimae.

Haec atque species antecedens ab Adamsio fortasse alio nomine enumeratae sunt, quod e descriptionibus Adamsianis erui non poterat, cum nimis breves sint et mensuris careant.

**Genus Microstelma A. Adams.**

**Microstelma daedala A. Adams.**

Ann. and Mag. vol. 3. pag. 348.

Ins. Goto.

**Genus Alvania Risso.**

Species Japonicae nunc notae ab Adamsio in Ann. Mag. 1861. pag. 137 enumerantur:

**Alvania semicostata A. Ad.**

Mino-shima.

**Alvania tiarula A. Ad.**

Taba-shima.

**Alvania clathratula A. Ad.**

Tsu-shima.



- Tsu-shima. *Alvania Mariella* A. Ad.  
Tsu-shima. *Alvania concinna* A. Ad.  
Yesso. *Alvania ferruginea* A. Ad.

His addendae sunt:

*Alvania circinata* A. Ad. in lit.

Testa conica, subturbinata, imperforata, maculis minutis fuscis signata, anfractibus quaternis et dimidio vel quinis convexis per longitudinem costatis transversimque tenuistriatis instructa; apertura ovata; labrum paululum incrassatum. — Alt. 3, lat. 1,6 mill.

Insula Sado.

*Alvania caelata* A. Ad. in lit.

Testa ovato-conica, solidula, subrimata, pallide flavida, anfractibus quinis convexiusculis longitudine crassicostatis, transversim tenuiterque striatis, conspicue sejunctis instructa; apertura ovata. — Alt. 2—2,4 mill.

In hac specie, quae praecedenti affinis est, costae in anfractus ultimi media parte evanescent.

### Genus *Fenella* A. Adams.

In Annals and Mag. etc. anni 1860 clar. auctor cochleolas plures exquisite sculpturatas pro Dunkeriis \*) habuit, sed posterius prope Takano-shima testas illas cum bestiola vivente invenit, quae his verbis designatur. Caput proboscidiforme; rostrum elongatum, annulatum; tentacula filiformia distantia; oculi parvi sessiles in areolis albidis pone basin tentaculorum positi; pes elongatus angustus antice truncatus, postice acuminatus; operculum corneum linea subanguinea signatum. Ex hac descriptione elucet has cochleolas Alvaniis cognatas esse. Species quae enumerantur hae sunt:

*Fenella pupoides* A. Ad.

Journ. de Conch. vol. 16. pag. 47. Tab. 4. fig. 5.

Takano-shima, Tsu-shima etc.

- Tabu-shima. *Fenella fusca* A. Ad. (Dunkeria).  
Mino-shima. *Fenella asperulata* A. Ad. (Dunkeria).  
Mino-shima. *Fenella pulchella* A. Ad. (Dunkeria).  
Tsu-shima. *Fenella scabra* A. Ad. (Dunkeria).  
Sado. *Fenella ferruginea* A. Ad. (Dunkeria).

---

\*) Genus *Dunkeria* a clar. Carpenter creatum, ad Pyramidellacea pertinet anfractibus tumidis decussatis insignia Turbonillis (vel Chemnitziiis) cognata. (Conf. Mazatlan Mollusca pag. 433.)

- Fenella reticulata A. Ad. (Dunkeria).  
Awa-shima.
- Fenella craticulata A. Ad. (Dunkeria).  
Mino-shima.
- Fenella rufocincta A. Ad. (Dunkeria).  
Mososeki, Takano-shima.

**Genus Onoba H. et A. Adams.**

Hoc genus Rissois affine cochleolas complectitur elongatas transversim neque longitudine costulatas. (Conf. Genera of rec. Moll. vol. 1. pag. 331. Ann. Mag. Aug. 1861. pag. 136. ibid. 1863. pag. 348.) Discrimen grave inter Onobas et Rissoas mihi quidem constare non videtur.

Adamsius l. c. has enumeravit species:

- Onobam mundulam A. Ad.  
Fretum Coreanum.
- Onobam elegantulam A. Ad.  
ibid.
- Onobam proceram A. Ad.  
Yara, Mososeki.
- Onobam mirificam A. Ad.  
Oki-no-shima, Tanabe.
- Onobam bellam (Rissoam) A. Ad.  
Yara.
- Onobam spiratam A. Ad.  
Mososeki.
- Onobam patulam A. Ad.  
Yobuko.
- Onobam egregiam A. Ad.  
Yobuko, Seto-Uchi.
- Onobam lucidam A. Ad.  
O-shima.

His adjicio:

- Onobam (Rissoinam) annulatam Dkr.  
Moll. Jap. pag. 12. Tab. 2. fig. 12. (O. sulciferam A. Ad. in sched.)  
et Onobam ferrugineam A. Ad. in sched.  
quam hic breviter descripsi.

Onoba ferruginea A. Ad. in sched.

Testa turrato-subulata vix 3 mill. alta, fusca vel ferruginea, interdum tota alba vel maculis fuscis aspersa; anfractibus quinque rotundatis sutura profunda sejunctis, transversim et longitudine costatis instructa; apertura rotundato-ovata.

Species sane inter Rissoas et Onobas intermedia.

**Genus Setia H. et A. Adams.**

Tres huius Rissoarum sectionis species Japonicae hucusque innotuerunt in Ann. Mag. Aug. 1861. pag. 136. descriptae:

*Setia candida* A. Ad.

Sado.

*Setia tricineta* A. Ad.

Awa-shima.

*Setia bifasciata* A. Ad.

Awa-shima.

Forma typica generis est Rissoa pulcherrima Jeffr.

**Genus Scaliola A. Adams.**

*Scaliola bella* A. Adams.

Ann. and Mag. 1860. vol. 6. pag. 120. ibid. Dec. 1862. pag. 420. Journ. de Conch. vol. 16. pag. 53. Tab. 4 fig. 6.

Tabu-shima, Takano-shima prope Tatiyama.

*Scaliola arenosa* A. Adams.

l. c. Dec. 1862. pag. 421.

O-shima, Tanabe, Simoda.

*Scaliola glareosa* A. Adams.

l. c. pag. 421.

Tsu-shima, Takano-shima.

*Scaliola gracilis* A. Adams.

l. c. pag. 421.

Insula Goto.

Hoc genus Gastropodum minimorum arenulis agglutinatis est valde singulare et insigne.

**Turritellacea.**

**Genus Turritella Lam.**

*Turritella erosa* Couth.

Boston Journ. of Nat. Hist. vol. 2. 1839. pag. 103. Tab. 3. fig. 1. = *T. polaris* Beck. Cfr. Schrenck Amurl. vol. 2. Moll. pag. 341.

Mare Japoniae septentrionale aliaeque regiones arcticae.

Haec species apice plerumque erosa invenitur.

Praeterea Turritellae cuiusdam specimen Japonicum juvenile, gracillimum et tenue, exstat anfractibus 16 convexiusculis quadricarinatis instructum, cum aliqua certitudine haud determinandum.

Dunker, Moll. Jap. mar.

## Caecacea.

### Genus Caecum Flem.

Magna harum testarum mirabilium copia hodie nota est. A. Adamsius in Ann. Mag. Nov. 1868. pag. 364. species septem distinxit omnes fere e limo et arena marina prope Akasi, O-shima, et Tanabe adeptas. Sunt haec:

*Caecum gracile* Carp.

*Caecum vitreum* Carp.

*Caecum dextrorsum* Carp.

*Caecum Clarkii* Carp.

*Caecum?* *mamillatum* Carp.

*Caecum glabriforme* Carp. (Brochina).

*Caecum glabellum* Carp. (Brochina) an var.?

Cuius interest has testas parvas et minimas accuratius cognoscere, catalogum Molluscorum Mazatl. legat, quem P. P. Carpenter edidit.

## Vermetacea.

### Genus Vermetus Adanson.

#### *Vermetus imbricatus* Dkr.

Malak. Bl. 1860. pag. 240. Moll. Jap. pag. 17. Tab. 2. fig. 18. *Thylacodes?* *imbricatus* Mörch. Review of Vermetidae Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 73. ubi quae de hac specie dixi iisdem verbis repetita sunt. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 83. de synonymis huius speciei et de ratione Mörchiana nomina mutandi uberius disseruit.

Portus De-shimae, Jedo, Nagasaki etc. Adamsius animal descripsit in Ann. Mag. Febr. 1864. pag. 141.

#### *Vermetus Planorbis* Dkr. (*Spiroglyphus* Daud.)

Malak. Bl. 1860. pag. 240. Moll. Jap. pag. 18. Tab. 2. fig. 16.

*Vermeto imbricato* insidens.

#### *Vermetus nodoso-rugosus* Lischke.

Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 84. Tab. 5. fig. 1—4.

Ohosaka.

### Genus Tenagodus Guettard.

#### *Tenagodus* (*Pyxipoma*) *lacteus* Lam. (Siliquaria).

Anim. sans vert. vol. 5. pag. 584. Mörch, Review on the genus *Tenagodus* Proc. Zool. Soc. 1860. pag. 409. Specimen unum exstat fortasse ad hanc speciem referendum.

#### *Tenagodus* (*Siliquarius*) *Cumingii* Mörch.

Var. *conifera* Mörch. l. c. pag. 404. Specimen mutilatum exstat, eadem species var. Japonica Mörch. l. c. pag. 405. Cum icone Rumphiana Tab. 41. fig. 1. conveniens.

## Xenophorea.

### Genus *Xenophora* Fischer.

#### *Xenophora exuta* Reeve (Phorus).

Conch. syst. vol. 2. pag. 161. Tab. 225. fig. 9, 10. Chemn. Conch. Cab. ed. 2. Trochus et *Xenophora* Tab. 48. fig. 4. (China).

Exstant specimina minus et pergrande integerrimum 85 mill. latum. Plerumque haec species, etiam in mari Chinensi obvia, plane denudata, nec lapillos neque conchylia aliave corpora marina fert, rarius vero animal primo aetatis tempore conchylia minora vel eorum fragmenta agglutinat. In speciminibus nonnullis collectionis nostrae margo umbilici sulcis duobus vel tribus levibus circumdatus est. De incola testae cfr. Adams et Reeve Voyage Samarang. pag. 50.

#### *Xenophora pallidula* Reeve (Phorus).

Conch. syst. vol. 2. pag. 160. Tab. 214. fig. 4. Conch. icon. Phorus fig. 4. Chemn. Conch. Cab. ed. alt. Trochus et *Xenophora* pag. 347. Tab. 48. fig. 2. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 169. vol. 3. pag. 56. Tab. 3. fig. 1—3.

Utraque icon et in Conch. syst. et in Conch. icon. ab uno eodemque specimine desumta, multo serius a clar. Philippi in Chemnitzii editione altera repetita est, sed eximiam huius cochleae imaginem et accuratam descriptionem nuperrime foras dedit l. l. clar. Lischke. Specimina ab eo depicta basin leviter concavam non umbilicatam ostendunt, at contra nostra specimina umbilico angusto perspicuo lamina quidem columellae semiobtectio instructa sunt, ceterum vero omnibus notis singulis cum illis plane conveniunt.

Mollusca agglutinata imprimis sunt bivalvia ex. gr. *Pectunculus albolineatus*, *Limopsis*, *Crassatella parvula* aliaque, inter univalvia *Ancillariae* species quaedam, omnia detrita, decolorata ex parte spongiis perforata, cum certitudine haud determinanda.

#### *Xenophora solarioides* Reeve (Phorus).

Conch. icon. Phorus Tab. 3. fig. 8. A. Adams et Reeve Voy. Samarang. Moll. pag. 50. Tab. 17. fig. 6.

Specimen juvenile jam antea Hamburgi acquisitum, quod ex Japonia originem ducere affirmabatur, cum Sinensibus plane convenit. Clar. Adams et Reeve incolam testae observaverunt eumque l. l. descripserunt.

## Calyptracea.

### Genus *Crepidula* Lam. (Crypta Humphrey).

#### *Crepidula grandis* Midd.

Tab. nostra 6. fig. 1, 2.

Middendorff, Beiträge zu einer Malacozoologia Rossica vol. 2. pag. 101. Mém. de l'Acad. imp. des sc. de St. Pétersb. 6. Sér. Sc. nat. pag. 429. Tab. 11. fig. 8—10. Schrenck, Reisen und Forschungen im Amurlande vol. 2. Zool. pag. 382.

Specimen integerrimum epidermide fusca lamellosa et foliacea obductum, quod clar. J. Rein ex Japonia reportavit, hic depictum est. Species ut plurimae *Crepidulae* varians septo semper sub-sinuato et obliquo instructa est.

**Crepidula aculeata Gmel. (Patella).**

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3693. Patella fornicata aculeata Chemn. Conch. Cab. vol. 10. fig. 1624.  
1625. Lam. anim. sans vert. vol. 7. pag. 642.

Plura specimina inter Mollusca Japonica exstant plus minusve aspera sed vix aculeata. Haec cochleola in remotissimis terris obvia est. Clar. Lischke eam in operis sui vol. 2. pag. 76. fusius tractavit. Crepidulae hystrix et echinus Broderipii pro varietatibus habendae sunt. Ad Crepipatellas Lessoni pertinet.

**Crepidula Walchi Herrm.**

Reeve Conch. icon. Crepidula spec. 17. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 82. vol. 3. pag. 56.

Exemplaria tria huius speciei singularis semper latitudine extensae exstant. Specimina Chinensia a beato H. Cuming quondam accepta non differunt. Calyptraea plana Adams et Reeve Voy. Sam. Moll. pag. 70. Tab. 11. fig. 3. certo eadem est species.

**Crepidula lamellosa A. Adams (Crypta).**

Ann. Mag. Apr. 1862. pag. 297.

Insula Goto.

Species mihi incognita.

**Capulacea.**

**Genus Capulus Montfort.**

Capulus badius Dkr.

Tab. nostra 13. fig. 15. 16. 17.

Testa valde obliqua compressiuscula, costulis radiantibus obsoletis instructa, badia vel rufescens; vertex valde porrectus et pronus ultra marginem extensus oblique intortus; apertura ovata, postice paululum dilatata et repanda.

Mare Japoniae mediterraneum.

Species nostra forma compressiuscula vertice valde porrecto involuto infimo, interdum adeo incumbente insignis est. Nullam novi speciem huic comparabilem.

**Capulus Japonicus A. Adams.**

Ann. Mag. Aug. 1861. pag. 138.

Mino-shima.

Haec species desideratur.

**Capulus dilatatus A. Ad.**

Tab. nostra 12. fig. 12. 13. 14.

Mino-shima. Conf. Ann. Mag. Dec. 1860. pag. 422.

**Genus Pilidium Middendorff.**

Pilidium commodum Midd.

Capulus depressus A. Adams Ann. and Mag. 1860. et Febr. 1864. pag. 142. Piliscus probus Lovén. (Forell Spitzbergen Mollusca pag. 88.)

Caput Notoro insulae Saghalien.

**Genus Amathina Gray.**

*Amathina tricostata* Chemn. (Patella.)

Conch. Cab. vol. 10. pag. 333. Tab. 168. fig. 1622, 1623.

*Patella tricostata* testa ovata alba, vertice valde adunco, tribus costis instructa, in lateribus striata, margine interno planiusculo angulato seu lacero.

Clar. H. et A. Adams fratres in Gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 372. incolam testae descripserunt nomine *Amathinae tricarinatae*; *Patella tricarinata* Linnaei est cochlea valde diversa. Conf. Schroeter Einl. vol. 2. pag. 417. Tab. 5. fig. 2.

Unicum specimen adest flavido-album sine ullo epidermidis vestigio, quae, quantum scio, prorsus ignota est.

*Amathina angustata* Sauverbie.

Journ. de Conch. 1875. pag. 43. 1877. pag. 72. Tab. 1. fig. 6.

Archip. Caled. R. P. Montrouzier.

Haec cochleola primo obtutu facile pro testa juvenili speciei antecedentis haberi potest, sed forma minore angustiore, vertice spirali ultra marginem prono lateribusque haud striatis abunde differt.

Statu integro testa epidermide atro-fusca obducta est.

Duo specimina Japonica in collectione exstant.

*Amathina nobilis* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1867. pag. 312. Tab. 19. fig. 27.

Caput Notoro insulae Saghalien una cum Pilidio commodo Midd., Velutina coriacea Pall. aliisque.

**Genus Hipponyx Defr.**

*Hipponyx pilosus* Desh.

Capulus pilosus Dkr. Moll. Jap. pag. 15. Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 78.

*Hipponyx foliaceus* Quoy et Gaim.

Astr. vol. 3. pag. 439. Tab. 72. fig. 41—45. Dkr. Moll. Jap. pag. 15.

*Hipponyx australis* Lam. (Patella).

Anim. sans vert. vol. 7. pag. 541. Delessert Rec. Tab. 23. fig. 11. Dkr. Moll. Jap. pag. 15. Menke Spec. Moll. Nov. Holl. pag. 33.

Dé-shima, Nagasaki etc.

Species maris Japonici vulgatissima conchyliis quibusdam ex. gr. *Halioti giganteae* et *Tritonio nodifero* adhaerere solet. Specimina a beato Preiss Dre e Nova Hollandia quondam reportata nihilo differunt.

Ad *Amaltheas Schumacheri* pertinet.

## Naricacea.

### Genus *Narica* Recluz \*).

#### *Narica cancellata* Chemn. (*Nerita*.)

Specimen minus exstat, quod *Neritae cancellatae* Chemnitzii generatim respondet. Testa ejus alba decussatim striata et cancellata vel reticulata anfractibus constat tribus rotundatis rapide crescentibus; apertura patula semirotonda; columella obliqua; umbilicus angustus.

Mare Japonicum.

## Neritacea.

### Genus *Nerita* Lin.

#### *Nerita polita* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 778. Lam. anim. sans vert. ed. 2. vol. 8. pag. 604.

Hanc speciem vulgatissimam late dispersam clar. Lindholm navarchus in freto tatarico legit. cfr. Schrenck Amurl. vol. 2. Moll. pag. 380.

#### *Nerita albicella* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 778. Rumphii Mus. Tab. 22. fig. 8.

Plurima specimina legit clar. J. Rein omnia fere ad varietatem minorem pertinentia nigro, albo cinereoque marmorata, ex parte fasciis duabus latis cincta. *Nerita mea venusta* ex Amboinis insulis (Philippii Abb. vol. 1. pag. 86.) fasciis rubris picta, septo labroque laevibus instructa, pariter ad hanc speciem mirum in modum variabilem referenda est, quod mea series varietatum magna in variis regionibus collecta nunc docet. Eodem modo suspicor *Neritam* quoque marmoratam Reevei huc pertinere.

#### *Nerita Japonica* Dkr.

Dkr. Moll. Jap. pag. 18. Tab. 2. fig. 23.

Ex eo tempore quo hanc cochleam l. c. descripsi plura specimina accepi mirum in modum variabilia. Saepius indusium testae nigrum hinc illic erosum invenitur, ita ut stratum inferius album vel flavum eerni possit et specimina tali modo adesa et erosa picturam marmoratam offerant. Specimina vero integerrima atra punctulis albis aspersa vel pictura reticulata ornata sunt, interdum quoque fasciis tribus transversis notantur.

Clar. Lischke speciem nostram ad *N. picam* Gouldii referendam esse putat, sed dubitatio aliqua mihi remanet, num res ita se habeat.

#### *Neritina* (*Clithon*) *adspersa* Recluz (*Nerita*)?

Journ. de Conch. 1853. pag. 319. Tab. 7. fig. 6. non *Neritina aspersa* Recluz in Reeve Conch. icon. spec. 114.

Plura specimina exstant prope Tokio lecta, cum icone et descriptione supra citatis aliquo modo convenientia. Ad *Neritinas* marinas pertinere videtur.

---

\*) Quoy et Gaimard huic generi nomen barbarum Vanikoro, insulae maris pacifici imposuerunt.



## Phasianellacea.

### Genus Phasianella Lam.

#### *Phasianella variegata* Lam.

Anim. sans vert. vol. 9. pag. 243. Deless. Rec. Tab. 37. fig. 10. Philippi Conch. Cab. ed. 2. Phasianella pag. 8. Tab. 3. fig. 1—3.

Specimen adultum et nonnulla juniora exstant.

Haec species hucusque tantummodo, quantum scio, in litore Novae Hollandiae inventa erat.

#### *Phasianella elongata* Krauss.

Südafr. Moll. pag. 104. Tab. 6. fig. 3. Philippi l. c. pag. 22. Tab. 4. fig. 21—23. Schrenck, Amurl. vol. 2. pag. 366.

Unum specimen detritum huc pertinere videtur.

#### *Phasianella Capensis* Dunker.

Zeitschr. für Malak. 1846. pag. 110. Krauss, Südafr. Moll. pag. 104. Tab. 6. fig. 5. Philippi l. c. Phasianella pag. 22. Tab. 4. fig. 17—20. Schrenck l. c. pag. 366.

Species habitu variabilis colore plerumque opaco et obscuro, in litore Capensi frequentissima. Conferantur quae de hac et antecedente specie a clar. de Schrenck uberrime dicta sunt.

## Turbinacea.

### Genus Turbo Lin.

#### *Turbo cornutus* Gmelin.

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3593. Chemn. Conch. Cab. vol. 5. pag. 193. Tab. 179. fig. 1779. 1780. Os argenteum cornutum. „Cochlea lunaris viridescens, cornibus seu muricibus acutis imbricatis, in anfractu margine coronata.“

Hanc cochleam admodum variabilem in mari Japonico vulgatissimam clar. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 87 et Vol. 2. pag. 81. uberrime tractavit.

Multa specimina exstant praesertim prope Tokio lecta, nonnulla mutica cornibus plane deficientibus. Ad hanc varietatem Turbo Japonicus Reevei certo pertinet, quem Adamsius adeo cum alia sectione conjunxit.

Exemplaria maris Sinensis plerumque sculptura asperiore et cornibus brevioribus confertioribus imbricatis excellunt, in Japonicis contra cornua in anfractu ultimo longiora et tubulosa esse solent et magis distant. Est quoque discrimen leve inter opercula. In Turbine cornuto Sinensi color viridescens et subfuscus, in Japonico albus. Praeterea fovea anguinea profundior et superficies asperior est.

Turbo cornutus in Japonia „Sazaye“ nominatur.

**Turbo marmoratus Lin.**

Syst. Nat. ed. 10. pag. 763. Chemn. Conch. Cab. vol. 5. fig. 1775. 1776. Testa adulta. Turbo olearius Lin. Syst. Nat. ed. 10. pag. 763. Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 86.

Testae tantum juveniles inter Mollusca nostra Japonica exstant. Specimina maxima ponderosa integerrima cum operculis suis in collectione Molluscorum nostra asservantur e Philippinis insulis reportata.

**Turbo variabilis Reeve.**

Conch. icon. vol. 4. fig. 8. icon optima.

Unum specimen exstat inter Mollusca nostra Japonica, quod latitudinem 60 mill. attingit. Haec cochlea pulcherrima forma quidem constans, sed pictura mutabilis est. Plerumque ex insulis Philippinis affertur.

Cochlea nostra et Turbo petholatus Linnaei, qui affinis est, testa nitente laevisissima quasi polita et epidermide paene carente notantur, imo statu integerrimo.

**Genus Lunella Bolten.**

**Lunella granulata Gmelin. (Turbo) var. minor.**

Chemn. Conch. Cab. vol. 5. pag. 164. Tab. 176. figg. 1744—1746. Cochlea lunaris perforata, granulata et tuberculis coronata. Turbo granulosus Kien. Iconogr. Turbo lugubris Reevei Conch. icon. vol. 4. spec. 63.

Species admodum variabilis cum testis Lunellae (Coronae) reclusae Chemnitzii junioribus facile confundi potest, quod mihi olim accidit. Interdum testae fasciis atro-viridescentibus, albis vel rubris cinctae inveniuntur; specimina quoque exstant per totam superficiem granosa, tuberculorum seriebus paene carentia, sed omnia apicem ostendunt aurantium, si quidem testa est detrita. Operculum valde convexum subgranosum cinereo-viride et albescens, in latere interno subconcavo linea dense involuta signatum. Epidermis raro observatur, nam facile dehiscit.

Clar. Mörch. (Catal. Yoldi pag. 161) hanc speciem Turbinem (Lunellam) granulatum Chemnitzii nominavit, sed nullibi vocabulum „granulatus“ nisi inter verba supra citata invenire potui.

Turbo lugubris Reevei varietatem nostram minorem in mari Japonico frequentissimam optime refert. Turbo Coreensis Recluz (Journ. de Conch. 1853 pag. 245. Tab. 8. fig. 2) pariter ad varietates pertinet.

**Genus Collonia Gray.**

**Collonia sanguinea Lin. (Turbo).**

S. N. ed. 10. pag. 763. ed. 12. pag. 1235. Phil. Conch. Cab. ed. 2. Turbo pag. 48. Tab. 12. fig. 3. Jeffer. Korea Shells Linn. Soc. Journ. Zool. vol. 14. pag. 423. Journ. de Conch. 1879. pag. 284.

Cochleola jam longo ex tempore e mari mediterraneo nota.

**Collonia rubra Dkr.**

Tab. nostra 12. fig. 7. 8. fig. 9. magn. aucta.

Testa parva solida, globosa, anfractibus 4—4½, rotundatis, costulis transversis subgranosis instructa; sutura perspicua; apertura rotunda, intus splendens et margaritacea; labrum incrassatum. Diam. 6—6½, alt. vix 6 mill.

Specimina tria congruentia adsunt.

Speciei nostrae antecedens simillima est, quae quidem costulis crassioribus laevigatis et spira altiore differt.

*Collonia purpurascens* Dkr.

Tab. nostra 12. fig. 1. 3. fig. 2. magn. aucta.

Testa globosa, anfractibus quinque rotundatis sutura subcanaliculata sejunctis, costulis transversis inaequalibus graniferis instructa; apertura rotunda, intus sulcata et margaritacea; columella incrassata. — Diam. 9—10, alt. circa 8 mill.

Haec species venusta ab antecedente habitu maiore costulisque inaequalibus praesertim differt. Costulae enim nonnullae prominentes anfractus subcarinatos reddunt. Operculum calcareum pro exiguitate testae crassum est.

Turbo Sangarensis Schrenck (Amurl. vol. 2. pag. 363.), qui nobis deest, pariter ad *Collonias* pertinere videtur.

**Genus Calcar Montfort.**

*Calcar haematragus* Menke.

*Trochus haematragus* Mke. Catal. coll. Malsb. Pyramonti 1829. pag. 18 = *Trochus columellaris* Phil. Dkr. Moll. Jap. pag. 20.

Specimina plura prope Tokio, Nagasaki aliisque locis iterum collecta exstant tum integerima callo columellae vivide purpureo tincta, tum erosa vel Vermiliis et calce incrustata.

**Genus Guildfordia Gray.**

*Guildfordia triumphans* Phil. (*Trochus*).

Jahresber. des Vereins für Naturk. Cassel 1841. pag. 8. Abbild. und Beschr. vol. 1. pag. 31. Tab. 1. fig. 1. *Trochus Guildfordiae* Gray Reeve Conch. syst. vol. 2. Tab. 218. fig. 17. *Astracium triumphans* Phil. Zeitschr. für Malak. 1847. pag. 23. Mart.-Chemn. Conch. Cab. ed. 2. *Trochus* pag. 229. Tab. 35. fig. 1. H. et A. Adams Gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 299. Tab. 44. fig. 5. cum operculo fig. 5a et b.

Mare Japonicum.

Specimina tria pulcherrima exstant, maximum spinis inclusis 75 mill. latum.

Hanc cochleam mirabilem clar. R. A. Philippi primus descripsit, qui illo tempore jam suspicatus est, determinationem genericam non esse rectam. Et sane quamvis animal hucusque haud innotuerit, tamen tota testae structura et formatio tam singulares sunt, ut pro genere proprio haberi debeat. Testa rufescens interdum subcuprea splendorem margaritaceum ostendit translucens. Callum umbilici Umbonia (Globulos vel Rotellas) in memoriam reducit. Operculum ovatum, crassum, album, superne paululum cavatum hinc illic subgranosum in circuitu deruptum, margine externo anguste carinatum. Anfractus ultimus spinis logis 8—10 calcaris instar armatus est.

Haec cochlea eximia a Japonis „Kuruma-gahi“ dicta, inter Mollusca, quae nunc vivunt, ad hoc tempus unica est sui generis, sed clar. Martin, Professor Lugduni Batavorum, nuperrime speciem telluris tertiariae Javanicae alteram promulgavit nostrae simillimam, quam *Trochum triumphatorem* appellavit. Haec species fossilis imprimis basi minime granifera, sed striis incrementi simplicibus falcatis differt.

Dunker, Moll. Jap. mar.

### Genus Uvanilla Gray.

#### Uvanilla Heimburgi Dkr.

Tab. nostra 6. fig. 6. 7.

Testa conica imperforata anfractibus constat planiusculis quinque costulis densis subgranosis cinctis, ultimo spinis compressis imbricatis paululum deflexis armato; basis plano-convexa, costulis spiralibus subimbricatis ornata; callum columellae fovea oblonga terminatum; apertura subrotunda; labrum subacutum; fauces argenteo-margaritaceae. Color testae albidus ejusque basis subrosea. — Diam. max. 20, alt. circiter 12 mill.

Specimen unicum adest in mari Japoniae mediterraneo captum, sed certus locus natalis desideratur.

Hanc cochleam venustam sectioni Uvanillae satis respondentem, in honorem amici de Heimburg Oldenburgensis nominavi.

### Genus Pachypoma Gray.

#### Pachypoma rhodostoma Lam.

Anim. sans vert. vol. 9. pag. 12. Delessert Rec. Tab. 34. fig. 12. Phil. Conch. Cab. ed. alt. Tab. 20. fig. 2.

Specimen unum inter Mollusca Japonica repertum est sine certa indicatione loci natalis. Specimina reliqua nostrae collectionis e mari Sinensi originem ducunt.

Haec cochlea, quae cum Trocho haematrago Menke (columellari Phil.) artissime conjuncta est, satis docet divisiones quasdam Grayanas infirmas esse.

### Genus Pomaulax Gray.

#### Pomaulax Japonicus Dkr. (Trochus).

Phil. Abb. vol. 1. Trochus pag. 187. Tab. 5. fig. 1.

Haec species jam anno 1845 a me descripta, Trocho undoso Wood affinis et analogae est.

Specimen nunc exstat pergrande spinis inclusis 142 mill. latum, 75 altum, epidermide cornea passim viridescente sublamellosa obductum. Spinae compressae cavae convolutae vel cucullatae in eo majores et sulci spirales fortiores sunt. Ceterum conferantur quae l. c. de hac cochlea uberius jam dixi.

Operculum ponderosum in speciminibus adultis crusta calcarea nitente quasi murrhina obductum est, ita ut sulci obscuriores appareant. Latus internum concentricè rugosum nigro-corneum.

Pomaulax genus Grayanum a voce *αὐλαξ* sulcus et *πῶμα* operculum derivandum, anno 1850 fundatum, hanc tantum speciem et Trochum undosum Wood (= gigantem Anton) amplexitur.

### Genus Bolma Risso.

#### Bolma modesta Reeve (Trochus).

Proc. Zool. Soc. 1842. Conch. syst. vol. 2. pag. 165. Tab. 218. fig. 14. Philippi in Mart.-Chemn. Conch. Cab. ed. alt. Trochus pag. 273. Tab. 40. fig. 3. (specimen haud adultum).

Haec species sculptura variabilis, sed colore constans, Turbini rugoso Linnaei proxima est praesertim respectu habito lateris inferioris, peristomatis et calli columellae rufi. — Operculum

haud innotuit, sed suspicor umbilico Veneris simile esse, ut opercula Turbinis rugosi a pharmacologis quondam nominata sunt.

Specimina juniora plus minusve laesa clar. J. Rein. ex itinere Japonico retulit. Nuperrime clar. Satow specimen adultum misit magnitudine Turbinis rugosi grandis.

## **Liotiacea.**

### **Genus Liotia Gray.**

#### **Liotia pilula Dkr.**

Moll. Jap. pag. 19. Tab. 3. fig. 7. (magn. aucta).

Plura specimina nunc exstant nigra et sanguinea ad umbilicum alba; ceteroquin descriptioni meae priori nil habeo, quod addere possim. Cochleola Collonias in mentem revocat, quae vero sunt imperforatae.

#### **Liotia armata A. Adams (Arene).**

Ann. Mag. Sept. 1861. pag. 243.

Fretum Coreanum.

Liotiae muricatae Humphr. cognata est.

#### **Liotia semiclathratula Schrenck.**

Bullet. de l'Acad. imp. de St. Pétersb. vol. 4. pag. 410. Amurl. vol. 2. pag. 370. Tab. 16. fig. 16—25.

Fretum Sangaricum, Algis insidens. Haec species venusta l. c. uberius tractata est.

### **Genus Cynisca H. et A. Adams.**

#### **Cynisca Japonica A. Ad.**

Ann. Mag. Sept. 1861. pag. 244.

Fretum Coreanum.

Cynisca (Cyclostrema) granulata A. Ad. et australis Kiener (Delphinula australis) species cognatae sunt.

### **Genus Cyclostrema Marryatt.**

#### **Cyclostrema micans A. Adams.**

Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 43. Sow. Thes. vol. 3. pag. 250. Tab. 255. fig. 7. 8. 27. Cyclostrema pulchellum Dkr. Moll. Jap. pag. 20. Tab. 3. fig. 5.

E descriptione Adamsii manca icone non illustrata species nullo modo erui poterat.

#### **Cyclostrema sulcatum A. Ad.**

Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 44. Sow. Thes. vol. 3. pag. 250. Tab. 255. fig. 11. 12.

Mare Sinense et Japonicum, insulae Philippinae.

#### **Cyclostrema cinguliferum A. Ad.**

Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 43. Sow. Thes. vol. 3. pag. 250. Tab. 255. fig. 13. 14.

Mare Japonicum, Philippinae insulae.

**Cyclostrema tornatum A. Ad.**

Sow. Thes. vol. 3. pag. 251. Tab. 255. fig. 19. 20.

Mare Japonicum.

**Cyclostrema cingulatum Dkr.**

Malak. Bl. vol. 6. pag. 225. Moll. Jap. pag. 20. Tab. 3. fig. 11. Sow. Thes. l. c. fig. 23. 24.

Portus De-shimae.

G. B. Sowerby annotat hanc speciem Cyclostremati angulato a me depicto affinem esse.  
Nullibi eam depinxi.

**Cyclostrema anaglyptum A. Ad.**

Sow. Thes. vol. 3. pag. 252. Tab. 255. fig. 28. 29.

Zolenko, Jap.

**Cyclostrema biporcatum A. Ad.**

l. c.

Seto-Uchi, Jap.

**Genus Daronia A. Adams.**

**Daronia cyclotina A. Ad.**

Sow. Thes. vol. 3. pag. 253. Tab. 255. fig. 34.

Kino-o-shima. Jap.

**Genus Tubiola A. Adams.**

**Tubiola nivea Chemn. (Turbo).**

Conch. Cab. vol. 10. fig. 1587. 1588. Delphinula nivea Phil. Chemn. Conch. Cab. ed. alt. Tab. 4.  
fig. 1. Tubiola nivea A. Ad. Proc. Zool. Soc. 1863. pag. 74. Thes. vol. 3. pag. 253. Tab. 255.  
fig. 35. 36.

Mare Japonicum.

**Tubiola cornuella A. Ad. (Skenea).**

Sow. Thes. vol. 3. pag. 253. Tab. 255. fig. 37. 38.

Mare Japonicum.

**Genus Microtheca A. Adams.**

**Microtheca crenellifera A. Ad. (Isanda).**

Ann. Mag. Nat. Hist. 1862. ibid. 1863. Thes. Conch. vol. 3. Tab. 255. fig. 41. 42.

Mare Japonicum.

**Genus Mörchia A. Adams.**

**Mörchia obvoluta A. Ad.**

Ann. Mag. Nat. Hist. Apr. 1860. pag. 301. Proc. Zool. Soc. 1863. pag. 74. Sow. Thes. Conch. vol. 3.  
pag. 254. Tab. 255. fig. 43. 44.

Fretum Coreanum.

Forma singularis et Neritulam et Teinostoma in mentem vocans.

**Genus Adeorbis Searles Wood.**

*Adeorbis planus* A. Adams (*Cyclostrema*\*).

Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 43. Sow. Thes. Conch. vol. 3. pag. 255. Tab. 256. fig. 3. 4.

Tria specimina illaesa exstant.

Testa magna orbicularis, depressa, alba, subpellucida, costulis confertis tenuissimis undique cincta, anfractibus planiusculis quinque subito crescentibus instructa; apex prominulus; apertura ovato-rotundata perobliqua; umbilicus amplus perspectivus.

Adamsius anfractus planos infra laeves nominavit, sed specimina nostra undique tenuissime striata sunt, ceterum cum iconibus citatis optime conveniunt.

Haec species 10—11 mill. lata, sui generis maxima est, omnes reliquae parvae vel minimae sunt.

Praeterea in Thesauri Conch. vol. 3. a clar. Adams hae species Japonicae enumerantur.

*Adeorbis trochulus* A. Ad.

Sow. Thes. Conch. vol. 3. pag. 258. Tab. 256. fig. 12. 13.

Goto.

*Adeorbis depressus* A. Ad.

ibid. pag. 257. fig. 14. 15.

Mino-shima.

*Adeorbis orbellus* A. Ad.

ibid. pag. 256. fig. 16. 17.

Mino-shima.

*Adeorbis carinatus* A. Ad.

ibid. pag. 258. fig. 18. 19.

Seto-Uchi.

*Adeorbis Japonicus* A. Ad.

ibid. pag. 256. fig. 20.

Goto.

*Adeorbis prominulus* A. Ad.

ibid. pag. 257. fig. 23. 24.

Mino-shima.

*Adeorbis clausus* A. Ad.

ibid. pag. 256. fig. 25. 26.

Tahu-shima.

*Adeorbis suturalis* A. Ad.

ibid. pag. 257. fig. 27. 28.

Tsu-shima.

*Adeorbis corniculum* A. Ad.

ibid. pag. 257. fig. 29. 30.

Mino-shima.

---

\*) Nescio qua de causa clar. Adams verbis *Cyclostrema* et *Adeorbis* pro foemininis usus sit.

*Adeorbis nanulus* A. Ad.

ibid. pag. 257. fig. 31. 32.

Mino-shima.

*Adeorbis subangulatus* A. Ad.

ibid. pag. 258. fig. 33. 34.

Goto.

*Adeorbis patruelis* A. Ad.

ibid. pag. 257. fig. 35. 36.

Mino-shima.

*Adeorbis diaphanus* A. Ad.

ibid. pag. 258. fig. 39. 40.

Goto.

## Umboniacea.

### Genus Umbonium Link.

*Umbonium giganteum* Lesson. (Rotella).

Ill. de Zool. Tab. 17. *Rotella gigantea* Kien. Icon. Coq. viv. pag. 6. Tab. 3. fig. 7. *Rotella aucta*. Sow. Gen. of Shells fig. 3. Reeve Conch. syst. Tab. 216. fig. 3. *Globulus giganteus* Phil. in Conch. Cab. ed. alt. pag. 50. Tab. 8. fig. 1. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 90. vol. 3. pag. 63.

Multa specimina colore variantia exstant ex parte maxima. Inter juniora unum est anfractibus margine superiore prominulis medio subconcavis, margine inferiore sulcis subtilibus circumcurrentibus tam insigne, ut pro varietate eximia haberi possit. Clar. Reeveus in Conchyliologia systematica *Rotellae* vestiariae varietatem nostrae cochleae similem l. c. depinxit verbum „aucta“ adjungens, quod certe significare vult magnitudine aucta. Hoc modo fortasse denominatio *Rotellae auctae* orta est.

De bestiola *Umbonii gigantei* conf. A. Adams Ann. Mag. Aug. 1860. pag. 110.

*Umbonium antiquissimum* est nomen huic Gastropodum generi anno 1807 a Linkio (Beschr. Rost. Samml.) inditum, *Globulus Schuhmacheri* anno 1817, *Rotella Lamarekii* a. 1822. prodiit.

*Umbonium costatum* Valenciennes (Rotella).

*Rotella costata* Val. apud Kienerum Spéc. génér. pag. 10. Tab. 2. fig. 5. Cfr. Philippi Conch. Cab. ed. alt. pag. 51. et Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 91.

Plura specimina attulit clar. Rein.

Simoda, Hakodate, Tsu-shima etc.

*Umbonium superbum* Gould (Rotella).

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 8. pag. 17. Otia Conch. pag. 156. *Umbonium superbum* A. Adams in Ann. Mag. Nat. Hist. 1863. pag. 265.

Sinus Kago-shimae.

Descriptio Gouldii duobus speciminibus a clar. Pöhl navarcho quondam acceptis ad Jokohama lectis satis respondere videtur, nihilo minus tamen non satis constat utrum sit varietas praecedentis, an species propria. Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 83.



*Umbonium moniliferum* Lamarck (Rotella).

Anim. sans vert. ed. 2. vol. 9. pag. 118. Cfr. Sow. Gen. of Shells fig. 1. Reeve Conch. syst. vol. 2. Tab. 216. (eadem tabula) Philippi in Conch. Cab. ed. alt. pag. 52. Rotella Javanica Lam. l. c. Delessert Recueil Tab. 34. fig. 4. (Teste Kienero est specimen Umbonii moniliferi detritum et decoloratum, quod et ego crediderim.)

Plura specimina exstant variantia.

Nagasaki, Simoda, O-shima.

*Umbonium anguliferum* Philippi (Globulus).

Conch. Cab. ed. alt. pag. 51. Tab. 8. fig. 3.

Prope Yokohama invenitur.

Quatuor specimina exstant.

*Umbonium vestiarium* Lin. (Trochus).

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1230. Rotellae lineolata et rosea Lam. anim. sans vert. vol. 9. pag. 116 et 117. A. Adams Umboniidae from the Seas of Japan. Ann. Mag. Nat. Hist. 1863. pag. 264.

Tsaulian. A. Adams.

In nostra Molluscorum Japonicorum collectione deest.

*Umbonium Thomasi* Crosse (Globulus).

Journ. de Conch. vol. 11. pag. 384. Tab. 13. fig. 8 a. b. c.

Testa conoidea trochiformis subtilissime striata paene glabrata, nitida, pallide cinereo-flava lineis undulatis nigrescenti-griseis vel viridescentibus picta, anfractibus senis vel septenis plano-convexis infra suturam paululum cavatis instructa, sutura subimbricata costula filiformi signata; apex acutiusculus; basis plana, lineis cinereo-nigrescentibus undulatis zona alba spirali interruptis picta; callum album crassiusculum ad columellam obscure plicatum; operculum circulare corneum ac tenue linea anguinea angusta lacunaque media parvula signatum.

Tria specimina forma picturaque plane congruentia exstant. Specimen a clar. Crosse l. c. depictum varietatem exhibet, ut videtur, rariorem roseo-albam, sutura rosea lineisque flexuosis ornatam.

Species singularis 12 mill. alta, 20 lata prae omnibus Umboniis ad hoc tempus notis habitu trochiformi basique plana insignis est.

Habitat in sinu Hakodate dicto Japoniae (Crosse), varietas roseo-tincta prope insulas Chah-wi-tien Chinae septentrionalis.

*Umbonium Adamsi* Dkr.

Tab. nostra 6. fig. 3. 4. 5.

Testa depresso-conoidea nitida, glabra, albida, lineis confertis undulatis atro-fuscis picta, anfractibus plano-convexis ultimo obtuso instructa; basis planiuscula; callum crassum cinereo-album.

Cochlea praecedenti affinis, sed minor modo 12 mill. lata, 6 circiter alta, lineolis confertis atro-fuscis vel purpureis, basi paullo convexiore et calli formatione distinguenda. Sub vitro striae conspiciuntur tenerrimae transversae et longitudinales.

Duo specimina adsunt aequalia in mari Japonico capta, sed locus natalis certus desideratur.

**Genus Umbonella A. Adams.**

**Umbonella murrea Reeve (Turbo).**

Conch. icon. Turbo Tab. 12. fig. 54. = *Isanda maculosa* A. Adams Ann. and Mag. Nat. Hist. 1862. et Apr. 1863. pag. 265.

Insula Goto.

Clar. Adams Umbonellam Chrysostomati, generi Swainsoniano, affinem esse opinatur. Pariter Turbo pusio Anton (Philippi Trochideen Conch. Cab. ed. 2. pag. 71. nec non Turbo Californicus Troschel ibid. pag. 68.) fortasse Umbonellis inserendi sunt.

**Genus Ethalia H. et A. Adams.**

**Ethalia perspicua A. Ad.**

Ann. Mag. Nat. Hist. 1861. Apr. 1863. pag. 266.

Oki-no-shima, Takano-shima.

**Ethalia sobrina A. Ad.**

Ann. Mag. Oct. 1861. pag. 306. Apr. 1863. pag. 266.

Akasi, Tsu-shima.

**Ethalia candida A. Ad.**

Ann. Mag. Apr. 1862. pag. 296. Apr. 1863. pag. 266.

Insula Goto.

**Ethalia polita A. Ad.**

ibid.

Goto.

**Ethalia omphalotropis A. Ad.**

Ann. Mag. Apr. 1863. pag. 266.

Yobuko.

**Euthalia nitida A. Ad.**

ibid.

Yobuko.

**Genus Teinostoma A. Adams.**

**Teinostoma concentricum A. Ad.**

O-shima, Takano-shima.

**Teinostoma radiatum A. Ad.**

O-shima.

**Teinostoma lucidum A. Ad.**

Cfr. Ann. Mag. Nat. Hist. Apr. 1863. pag. 267.

Simoda.

**Genus Calceolina A. Adams.**

**Calceolina pusilla C. B. Adams (Neritina).**

Conch. Contr. pag. 112. *Teinostoma anomalum* H. et A. Adams Gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 123. *Teinostoma pusillum* ibid. App. pag. 615. Ann. Mag. Apr. 1863. pag. 263.

Tanabe. (In arena conchyliophora.)

## Trochidea.

### Genus *Delphinula* Roissy.

#### *Delphinula atrata* Chemn. (*Delphinus*.)

Conch. Cab. vol. 5. pag. 158. Tab. 175. fig. 1729—1731. Reeve Conch. icon. *Delphinula* spec. 4.

Specimen pulcherrimum ex Japonia allatum exstat.

Specimina collectionis nostrae e mari Sinensi et ex insulis Philippinis originem ducunt.

#### *Delphinula formosa* Reeve.

Proc. Zool. Soc. 1842. Conch. syst. vol. 2. Tab. 212. fig. 9. Conch. icon. *Delphinula* spec. 2.

Mare Japonicum.

Species pictura et habitu variabilis. Specimina pulcherrima beatus Albertus Rodatz a litore Africae orientalis quondam retulit.

### Genus *Delphinulopsis* B. Wright.

#### *Delphinulopsis Lesourdi* Wright.

Journ. de Conch. vol. 18. tert. ser. pag. 161. Tab. 3. fig. 1 a. b. c.

Hoc conchylium mirabile hucusque sui generis unicum, clar. C. R. Tatcher ex Japonia nuperrime reportavit. Quamvis animal et operculum incognita sint, tamen haud dubito quin non pertineat ad cochleas *Delphinulae* cognatas.

### Genus *Trochus* Lin.

#### *Trochus Niloticus* Lin.

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1227. Chemn. Conch. Cab. vol. 5. fig. 1605. 1614.

Specimen unum adest magnitudine et ambitu iconi Chemnitzianae 1605 satis respondens.

Testa juvenis Lamarckio erat *Trochus marmoratus*.

Species in oceano Indico haud rara.

#### *Trochus altus* Phil.

Chemn. Conch. Cab. ed. 2. *Trochus* no. 270. Tab. 32. fig. 7. *Trochus turris* Phil. Zeitschr. für Malak. 1846. pag. 102.

Testa turrito-conica apice acuta, rubella, maculis strigisque latis sanguineis et roseis variegata; anfractus undecim planiusculi granorum seriebus nonnullis cincti, prope suturam subplicati et crenati, ultimus acute angulatus; basis plana concentrice costulata, costulae obsoletae rubro maculatae striis incrementi minutis falcatis decussatae; columella arcuata tuberculo crasso terminata, intus plica torta signata; umbilicus obtectus costa obsoleta alba laevi nitente sanguineo maculata circumdatus; apertura subrhombea laevigata nitide margaritacea; epidermis tenuissima cornea.

Mare Japoniae mediterraneum.

Cochlea 42 mill. alta totidemque fere lata, Trocho acutangulo Chemn. (= elato Lam.) propinqua est, sed his notis satis differt: 1. testa tenuiore haud ponderosa, 2. basi plana qua ratione magis convenit cum Trocho maximo Kochii, specie ceteroquin valde diversa, 3. anfractu

ultimo acute angulato non rotundato, inde apertura subrhombea neque rotunda, 4. costa sanguineo maculata umbilicum clausum cingente vix expressa nec non 5. habitu minus elato, nam latitudo altitudini paene aequatur.

Chemnitzius Trochum acutangulum in vol. 5. fig. 1610 optime delineavit, sed ejus nominatio minime apta est. Hanc ob rem Lamarckius fortasse nomen mutavit, quod nostrae speciei multo melius responderet. Specimen a clar. Philippi depictum nostro paululum majus est.

### **Genus Cardinalia Gray.**

#### **Cardinalia virgata Gmel. (Trochus).**

Chemn. Conch. vol. 5. Tab. 160. fig. 1514. 1515. Reeve Conch. icon. Trochus sp. 69.

Tria specimina in collectione exstant; unum ex insulis Philippinis provenit, alterum ex insula Zanzibar Africae orientalis, Carolo Wessel rerum naturalium mercatore Hamburgensi affirmando, tertium inter Mollusca mea Japonica inventum est sine certa indicatione loci natalis. Haec tria specimina ambitu, sculptura et colore aliquo modo variant. Exemplar Japonicum integrum vivide coloratum epidermide tenui hinc illic obductum, basi latissimum est, ita ut diametri linea altitudinem superet.

### **Genus Tectus Montfort.**

#### **Tectus pyramis Born. (Trochus).**

Test. Mus. Caes. Vind. pag. 333. Geeve Bel. Tab. 9. fig. 63. Chemn. Conch. Cab. vol. 5. Tab. 150. figg. 1511—1513. ed. alt. Tab. 1. figg. 1—3. = Trochus obeliscus Gmel. Dunker Moll. Jap. pag. 20.

Portus De-shimae, Nagasaki etc.

Plura specimina exstant jam antea accepta. Cochlea ex insulis Philippinis aliisque regionibus satis cognita.

### **Genus Polydonta Schumacher.**

#### **Polydonta rota Dkr. (Trochus).**

Moll. Japon. pag. 21. Tab. 3. fig. 4.

Specimina nunc exstant integerrima icone nostra paululum majora.

#### **Polydonta chloromphalus A. Adams (Infundibulum).**

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 153. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 92. Tab. 6. fig. 17. 18.

Nagasaki.

Specimen apice laesum in Museo Loebbeckeano Dusseldorpii exstat.

#### **Polydonta squarrosa Lam. (Trochus).**

Anim. sans vert. ed. alt. vol. 9. pag. 137. Chemn. Conch. Cab. vol. 5. Tab. 169. figg. 1627. 29. 30. 32.

Nagasaki. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 92.

Specimina ex insulis Philippinis adsunt; inter nostra Mollusca Japonica haec species desideratur.

**Polydonta Spengleri Chemn. (Trochus).**

Conch. Cab. vol. 5. pag. 92. Tab. 169. fig. 1631. ed. alt. Trochus Tab. 9. fig. 9. Lischke Jap. M.  
Conch. vol. 1. pag. 93. Tab. 6. fig. 19.

Mare Japonicum et Sinense.

Trochum sacellum Phil. varietatem tantum repraesentare ipse autor suspicatus est.

**Polydonta maculata Lin. (Trochus).**

Schröter Einl. vol. 1. pag. 648. Tab. 3. fig. 9. Chemn. Conch. Cab. vol. 5. figg. 1615—18. Phil.  
Conch. Cab. ed. alt. pag. 38. Tab. 8. fig. 2. 3 et seq.

Specimen unum in collectione nostra Molluscorum Japonica inventum est crusta calcarea passim obductum, albo viridique maculatum, basi strigis atro-fuscis pictum. Certus locus natalis desideratur.

**Genus Clanculus Montfort.**

**Clanculus margaritarius Philippi (Monodonta).**

Zeitschr. für Malak. 1846. pag. 100. Trochoidea in Conch. Cab. ed. alt. pag. 74. Tab. 14. fig. 4.  
(Patria non designata est.)

Species elegans Clanculo Pharaonis analoga, modo colore rubido vel fusco, modo cinereo obvenit. Granulorum series nonnullae granis distantibus nigerrimis vel nigris et albis se tangentibus quasi geminatis ornatae sunt.

Inter Mollusca Japonica specimen integerrimum inventum est. Patria, quantum scio, hucusque haud innotuit.

**Clanculus Smithii Wood.**

Trochus Smithii Gray in Wood Ind. Test. Suppl. Tab. 5. fig. 20. A. Adams Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 158.

Haec species in mari Japonico obvenire dicitur. Mihi prorsus ignota est.

**Genus Monodonta Lamarck.**

**Monodonta labio Lin. (Trochus).**

Syst. Nat. ed. 10. pag. 759. Born. Mus. Tab. 12. fig. 7, 8. Chemn. Conch. Cab. ed. 2. Tab. 27. fig. 1—3. Tab. 44. fig. 8. Lamarck Anim. sans vert. vol. 9. pag. 176. Dunker Moll. Jap. pag. 28.

Multa specimina colore et pictura variantia clar. J. Rein ex itinere in Japoniam facto reportavit.

Cochlea in Oceano Indico frequentissima et late diffusa.

**Monodonta australis Lamarck.**

Chemn. Conch. Cab. vol. 11. pag. 165. fig. 1890. 1891. Trochus labeo australis. Dillwyn Cat. 2. pag. 792. Trochus labio var. Monodonta australis Lam. Anim. sans vert. vol. 9. pag. 177.

Specimen minus Japonicum obscure tinctum exstat cum Javanis meis conveniens. Quaeritur num in litore Novae Hollandiae inveniatur.

**Mondonta neritoides Phil. (Trochus).**

Tab. nostra 6. fig. 22. 23.

Zeitschr. für Malak. 1849. pag. 170. Chemn. Conch. Cab. ed. alt. Trochus pag. 303. Tab. 44. fig. 4.  
(non Trochus neritoides Gmel. = Margarita helicina O. Fabr.).

Plura specimina integerrima clar. Satow legit colore coerulesco-nigro tincta lineisque angulatis canescentibus obscuris picta, epidermide tenui olivacea obducta. Operculum tenuissimum pallide corneum lucidum linea angusta anguinea foveaque mediana parva notatum. Fauces vivide margaritaceae leviter sulcatae.

Species in mari Japonico late dispersa; ex. gr. frequentissime in insula Hachijô-shima obvenit una cum Litorina exigua Dkr. lapidibus insidens.

**Monodonta exigua A. Adams.**

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 176.

Haec species a clar. de Siebold ex Japonia quondam reportata, mihi plane incognita est.

Trochus exiguus Mont. = Trochus crenulatus Brocchi ad Zizyphinos pertinet, Trochus crenulatus Lam. = costifer Jonas Trocho pyramidi Born cognatus est, quod hic annotare volui.

**Genus Euchelus Philippi.**

**Euchelus Bronnii Dunker.**

Monodonta (Euchelus) Bronnii Dkr. Malak. Bl. vol. 6. pag. 229. Moll. Jap. pag. 22. Tab. 3. fig. 8. magn. aucta.

Portus De-shimae.

**Euchelus pauperculus Lischke (Trochus).**

Malak. Bl. vol. 19. pag. 105. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 69. Tab. 4. fig. 9—11.

Unum specimen adest iconi et descriptioni citatis plane respondens.

**Genus Zizyphinus Leach.**

**Zizyphinus unicus Dkr. (Trochus).**

Malak. Bl. vol. 6. pag. 288. Moll. Jap. pag. 23. Tab. 3. fig. 3. Reeve Conch. icon. Zizyphinus spec. 8. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 94. vol. 3. pag. 64. Trochus ornatus Reeve Conch. syst. vol. 2. pag. 165. Tab. 218. fig. 13. (non Lam. Deless. Rec. Tab. 35. fig. 3).

Quatuor specimina in collectione nostra exstant.

Clar. Lischke de hac specie concinna l. l. uberius disseruit et rationem inter eam, Trochum Cecillei Phil. et Calliostoma affine Dall. intercedentem exposuit.

**Zizyphinus consors Lischke (Trochus).**

Malak. Bl. vol. 19. pag. 104. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 65. Tab. 4. fig. 2. 3.

Sinus Jedoënsis.

Antecedenti simillimus, sed suturae formatione, anfractibus angulatis et carina superiore tuberculis distantibus ornata ut species propria differre videtur. Operculum corneum multigyratum est.

Exemplar unum tantum vidi in magna Theodori Loebbecke collectione servatum.

*Zizyphinus Japonicus* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 167. Reeve Conch. icon. *Zizyphinus* Tab. 7. fig. 49.

In mari Japonico haud rarus. Plura specimina exstant.

Species concinna colore rubro, coccineo, roseo, spadiceo, cinereo vel olivaceo tincta, interdum strigis maculisve albis vel lineolis tessellatis variegata; apertura subquadrata vivide margaritacea; basis convexa tenuiterque lirata; anfractus planiusculi supra suturam lineis duabus elevatis vel una signati. Varietas quidem obvenit multicolor lineis illis elevatis carens.

*Zizyphinus Jessoënsis* Schrenck (Trochus).

Reisen im Amurl. vol. 2. pag. 353. Tab. 15. fig. 11—18.

Species forma picturaque inconstans.

Unum specimen exstat. Pictura in eo vivida, margarita pulcherrime iridescens.

*Zizyphinus hilaris* Lischke (Trochus).

Malak. Bl. 1871. pag. 41. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 85. Tab. 5. fig. 14. 15. (15 a. magn. aucta).

Nescio an sit Cantharido, generi Montfortiano, melius inserendus.

Unum tantummodo specimen adest cum icone supra laudata plane conveniens.

*Turcica* H. et A. Adams.

*Turcica imperialis* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1863. pag. 507. *Trochus Adamsianus* Schrenck Moll. des Amurl. 1861. vol. 2. pag. 358. Tab. 16. fig. 5. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 67. Tab. 4. fig. 4., var. fig. 5. 6.

Tsusaki in litore Japoniae occidentali, A. Adams, sinus Jessoënsis, Lischke.

Duae varietates exstant, altera colorata typica, altera tota alba.

*Trochus Adamsianus* Schrenck sine dubio ad hanc cochleam pertinet, ut jam exposuit Lischke.

Clar. de Schrenck genus *Turcicae* non comprobavit. Mea opinione tota testae formatio atque indoles tam singulares sunt praesertim respectu habito peristomatis et collumellae biplicatae, ut eodem jure genus proprium in eam fundetur quo in aliis *Trochorum* formis creata sunt genera.

*Turcica concinna* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1863. pag. 508.

Uraga, Adams.

*Turcica Coreensis* Pease.

Proc. Zool. Soc. 1860. pag. 189.

Fretum Coreanum.

*Turcica instricta* Gould (Trochus).

Otia Conch. pag. 245.

Satanomosaki.

Bestiolam huius speciei Gouldianae A. Adams in Ann. and Mag. of Nat. Hist. m. Febr. a. 1864. pag. 143. descripsit.

Praeterea *Turcica monilifera* A. Adams (Proc. Zool. Soc. 1854. pag. 37.) et *T. stellata* A. Adams (Proc. Zool. Soc. 1863. pag. 508.), haec maris Sinensis, illa Australiae innotuerunt.

**Genus Minosia A. Adams.**

**Minosia punctata A. Ad.**

Ann. Mag. Nat. Hist. Nov. 1860. pag. 337.

Mino-shima prope Nippon.

Quaeritur num haec cochleola locum rectum teneat in systemate; secundum descriptionem Adamsianam Zizyphinis cognata esse videtur.

**Genus Alcyna A. Adams.**

**Alcyna ocellata A. Adams.**

Ann. Mag. m. Maji 1860. pag. 408.

Mare Japonicum.

**Alcyna lepida A. Adams.**

l. c.

Mare Japonicum.

Alcynae Elenchorum generi affines sunt.

**Genus Oxystele Phil.**

**Oxystele Koeneni Dkr.**

Tab. nostra 12. fig. 4. 5. 6.

Testa solidula depresso-conica laevigata, apice acutiuscula, imperforata, anfractibus senis convexiusculis sutura distincta sejunctis, ultimo interdum planiusculo instructa; callum paululum cavatum a canaliculo in columellam exeunte cinctum; apertura obliqua subquadrato-rotundata; labrum acutum, intus perviride iridescens; pictura sanguinea et viridis prope suturam et marginem inferiorem strigis maculisve tessellatis albis insignita; basis subconca viridescens rubro strigata; callum umbilici locum tenens album. — Specimen maximum 10 mill. altum, 12 latum.

Mare Japonicum.

Tria specimina exstant.

Species venusta Oxystelen tabularem Kraussii in memoriam reducit. Amico Adolpho de Koenen palaeontologo dicata est.

**Genus Photinula H. et A. Adams.**

**Photinula quaesita A. Ad.**

Ann. Mag. Aug. 1860. pag. 111. Febr. 1864. pag. 140.

Tatiyama, Oki-no-shima.

**Photinula zonata Wood (Trochus).**

Suppl. to the Ind. test. 1828. pag. 17. Tab. 5. fig. 34. = T. cingulatus Mke. Synopsis Moll. pag. 143. (non Brocchi neque Quoy et Gaim.). Trochus Menkeanus Phil. Abb. vol. 1. pag. 13—91. Tab. 3. fig. 6. Trochus zonatus Krauss Südaf. Moll. pag. 97.

Haec cochleola venusta antea e litore tantum Capensi nota, ubi frequens invenitur, a clar. de Schrenck inter Mollusca maris Japonici septentrionalis enumerata est (Amurl. vol. 2. pag. 351.)

Fortasse hoc genus Adamsianum melius Margaritis adjungitur.



**Genus Chlorostoma Swains.**

**Chlorostoma argyrostoma Gmelin (Trochus).**

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3583. Chemn. Conch. Cab. vol. 5. fig. 1562. 1563. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 96. Tab. 7. fig. 3. 4. 5. (icones optima).

Mare Japonicum et Sinense, insulae Philippinae.

Inter plura specimina nonnulla exstant magnitudine eximia habitu et sculptura asperiore et subtiliore variantia. In adultis umbilicus saepius callo crasso viridi vel cinereo-fusco obtectus est. (Chlorostoma turbinatum A. Adams.)

Ceterum conferantur quae de hac specie accurate exposuit clar. Lischke.

**Chlorostoma rusticum Gmelin (Trochus).**

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3572. Chemn. Conch. Cab. vol. 5. pag. 89. fig. 1645. 1646. Dunker Moll. Jap. pag. 21.

Cochlea maris Japonici et Sinensis frequentissima colore aterrimo, atro-purpureo, albo et badio vel atro cinereoque variegata, apud Japanos „Kubo gai“ nominatur.

**Chlorostoma Carpenteri Dunker (Trochus).**

Malak. Bl. vol. 6. pag. 237. Moll. Jap. pag. 21. Tab. 3. fig. 12.

Magnitudine maximopere variat, ipsa aetate perfecta. Novissimo tempore specimina nonnulla accepi maxima et minima plane adulta.

Species vulgaris mari Japonico propria esse videtur.

**Chlorostoma nigerrimum Gmelin (Trochus).**

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3572. Chemn. Conch. Cab. vol. 5. pag. 89. fig. 1647. Dunker Moll. Jap. pag. 21.

Mare Japonicum et Sinense.

Haec species interdum umbilico clauso obvenit. Hanc varietatem olim pro specie propria nomine Trochi distinguendi sejunxi. Cfr. Moll. Jap. pag. 22. Tab. 3. fig. 1.

**Chlorostoma rugatum Gould.**

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 8. pag. 20. Otia Conch. pag. 158.

Hakodate.

Speciei antecedenti cognatum esse dicitur.

**Chlorostoma nigricolor Dunker (Trochus).**

Malak. Bl. vol. 6. pag. 237. Moll. Jap. pag. 22. Tab. 3. fig. 2.

Specimina nonnulla notis praecipuis congruentia saepius ex Japonia accepi.

**Chlorostoma brunneum Philippi (Trochus).**

Zeitschr. für Malak. 1848. pag. 188. Chemn. Conch. Cab. ed. alt. Tab. 43. fig. 19. Dunker Moll. Jap. pag. 22.

Haec species ratione altitudinis et latitudinis quidem paululum variabilis, sed colore et peristomatis formatione constans est.

**Chlorostoma Pfeifferi Philippi (Trochus).**

Zeitschr. für Malak. 1846. pag. 104. Chemn. Conch. Cab. ed. alt. Trochus pag. 152. Tab. 25. fig. 2.  
Trochus Nordmanni Schrenck Mollusken des Amurlandes etc. pag. 349. Tab. 15. fig. 1. 2.  
Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 98.

Specimen illaesum icone Schrenckiana paululum minus exstat.

Haec cochlea habitu et sculptura variat; modo est altior, modo depressa, interdum laevigata, nonnunquam plicis obsoletis costulisque nonnullis transversis in anfractuum parte inferiore notata; color plerumque atro-purpureus, basis planiuscula atro-griseoque strigata. — Chlorostoma achates Gould. (Otia conch. pag. 158) huc pertinere videtur.

**Genus Omphalius Philippi.**

**Omphalius sordidus Phil. (Trochus).**

Zeitschr. für Malak. 1849. pag. 191. Conch. Cab. ed. 2. Trochus pag. 301. Tab. 44. fig. 1. Trochus subfuscescens Schrenck Reisen im Amurl. vol. 2. pag. 350. Tab. 15. fig. 3—10. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 170. vol. 3. pag. 69.

Jedo et Hakodate.

Omphalio (Trocho) fuscescenti, speciei Chilensi, cognatus.

**Genus Monilea Swains.**

**Monilea vitiliginea Menke (Trochus).**

Spec. Moll. Novae Holl. pag. 18. Philippi Conch. Cab. ed. alt. Trochus pag. 176. Tab. 28. fig. 2.

Haec species venusta, quam beatus Preiss Dr. e Nova Hollandia quondam reportavit mecumque communicavit, clar. E. de Martens affirmante pariter in mari Japonico prope Nagasaki obvenit. Conferatur Trochus vitiliginus in opere Lischkeano de Molluscis Japonicis vol. 2. pag. 86.

**Genus Gibbula Leach.**

**Gibbula globularia Schrenck (Trochus).**

Bull. de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersb. vol. 5. pag. 512. Amurl. vol. 2. Moll. pag. 357. Tab. 16. fig. 1—4. magn. nat. et aucta.

Hakodate Lindholm.

Inter nostra Moll. Japonica deest.

Gibbulae Adansoni Payr. et Adriatica Phil. cognatae esse videntur.

**Gibbula cicer Menke in lit. (Trochus).**

Phil. Abb. vol. 1. pag. 13. 91. Tab. 3. fig. 5. Conch. Cab. ed. 2. Trochus pag. 197. Tab. 29. fig. 24. magn. nat. et aucta.

Una cum specie antecedente et in litore Africae australis.

Nescio an sit alio loco melius inserenda.

**Genus Enida A. Adams.**

**Enida Japonica A. Adams.**

Tab. 12. fig. 17. 18.

Mag. Nat. Hist. 1860. pag. 408.

Testa depresso-conica, profunde umbilicata, anfractibus quinis et dimidio vel senis parum convexis costulisque transversis granosis instructa, ultimo carinato et crenato; apertura subquadrata

obliqua; columella paululum reflexa medio sinuata; peristoma laeve argenteo-margaritaceum; labrum tenue intus incrassatum; basis costulis granosis vel subtiliter crenatis ornata; umbilicus pervius; color flavidus maculis fuscis radiantibus variegatus. — Lat. seu diam. max. 10, alt. 6 mill.

Fretum Coreanum prope Mino-shima.

Hanc speciem bellam secundum specimen adumbravi, quod clar. A. Adams Museo zoologico Frankofurtano misit.

Forma ejus Gibbulae quasdam ex gr. Gibbulam (Trochum) Preissianam Phil. in mentem revocat.

Praeterea auctor l. c. duas alias Enidarum species enumeravit, Enidam speciosam et gemmulosam pariter in freto Coreano profundo captas.

Quaeritur num hoc Trochorum genus satis confirmatum sit ut adoptetur.

### Genus Margarita Leach.

*Margarita arctica* Leach.

Thomson's Ann. of Phil. 1819. John Ross Voyage of Discovery app. pag. 61. Cfr. Schrenck l. c. pag. 342.

Mare Jâponicum septentrionale.

Specimina tantum minora exstant.

*Margarita mustelina* Gould.

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 8. pag. 15.

Hakodate, minuenta aestu capta.

### Stomatellacea.

#### Genus Stomatella Lamarck.

*Stomatella articulata* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 30. Sowerby Thes. Conch. vol. 2. pag. 834. Tab. 174. fig. 2.

Plura specimina adsunt.

Hanc speciem beatus H. Cuming primus in Oceano Australiae detexit Aviculae margaritiferae insidentem.

*Stomatella orbiculata* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 31. Sowerby Thes. vol. 2. pag. 837. fig. 23. 24.

Tria specimina exstant sculptura tenuiore et asperiore paululum variantia.

*Stomatella Japonica* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 31. Sowerby Thes. vol. 2. pag. 838. fig. 14. Dunker Moll. Jap. pag. 23.

Portus De-shimae.

*Stomatella splendidula* A. Adams.

Sow. Thes. vol. 2. pag. 838. Tab. 174. fig. 15. 16.

Mare Japonicum.

Dunker, Moll. Jap. mar.

**Genus Niphonia A. Adams.**

*Niphonia pulchella* A. Adams.

Ann. Mag. Nov. 1860. pag. 336.

Fretum Coreanum.

Ad Stomatellacea pertinere videtur.

**Genus Stomatia Helbling.**

*Stomatia phymotis* Helbl.

Abb. Priv. Böhm. 4. pag. 124. *Haliotis imperforata* Chemn. Conch. Cab. vol. 10. pag. 309. fig. 1600. 1601. Testa auriformi, alba, impertusa, rugosa, costata, tuberculata, striata, nodulosa; spira valde exserta; apertura patentissima sinuata; fauce subargentea. — Lamarck anim. sans vert. ed. 2. vol. 9. pag. 19. Sowerby Thes. vol. 2. pag. 841. fig. 48—52.

Specimen adesum inter Mollusca nostra Japonica exstat. Specimina pulcherrima a beato H. Cuming quondam accepi ex insulis Philippinis allata.

Haec cochlea tam magnitudine quam sculptura et colore maximopere variat. G. B. Sowerby Stomatiam australem A. Adams (Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 34), quae mihi incognita est, pro varietate habet. *Stomatia obscurata* Lam. (anim. sans vert. vol. 9. pag. 19., Delessert Rec. Tab. 33. fig. 5.) certe huc pertinet.

*Stomatia rubra* Lamarck (*Stomatella*).

Tab. nostra 6. fig. 11. 12. 13. var.

Anim. sans vert. ed. alt. vol. 9. pag. 16. Enc. Tab. 450. fig. 3. Sowerby Thes. vol. 2. pag. 842. Tab. 175. fig. 53—56. H. et A. Adams Gen. rec. Moll. vol. 1. pag. 436. Tab. 49. fig. 9. 9 a. 9 b.

Specimina tria Japonica exstant.

Insulae Philippinae, fretum Coreanum (H. Cuming).

Stomatiarum nonnullarum testae formam Stomatellae ostendunt, sed incolae utriusque generis differunt; praeterea Stomatiae verae operculo corneo non sunt instructae.

**Genus Gena Gray.**

*Gena lutea* Lin. (*Patella*).

Rumphii Mus. Tab. 40. lit. J. auris marina. *Patella lutea* Linnaei Mus. Lud. Ulr. pag. 692. Syst. Nat. ed. 10. pag. 783. ed. 12. pag. 1260. Testa integra ovato-convexa, striata, vertice submarginali reflexo mucronato. *Stomatella auricula* Lam. anim. sans vert. ed. 2. vol. 9. pag. 17. *Stomatella planulata* ibid. Sowerby Thes. vol. 2. pag. 829. Tab. 173. fig. 1. 2. 3.

Exemplar nostrum Japonicum maximum est. In insulis Philippinis et litore Novae Hollandiae haec species pariter obvenit.

Clar. Sowerby in Thesauro (Tab. 173. fig. 4. 5.) speciem multo minorem longe alienam errans nomine Genae luteae depinxit.

*Gena varia* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 37. Sowerby Thes. vol. 2. pag. 828. Tab. 173. fig. 6. 7. 8.

Mare Japonicum. (Insulae Philippinae).

Inter plura specimina varietas pulcherrima exstat aurantia punctulis albis aspersa.

## Scissurellacea.

### Genus Scissurella A. Adams (d'Orbigny).

Clar. A. Adams (Ann. Mag. Nat. Hist. Nov. 1862. pag. 346.) huius generis tres enumeravit species Japonicas:

Okoshiri, Seto-Uchi. Scissurellam carinatam A. Ad.

Tabu-shima. Scissurellam modestam A. Ad.

Mino-shima. Scissurellam mirandam A. Ad.

Hae tres species ad Schismopen Jeffreysii pertinent, quae foramine parvo supra cissuram instructae sunt.

### Genus Anatomus Montfort.

Clarissimi Adams fratres in „the genera of recent Mollusca“ hoc genus Montfortianum adoptaverunt, posterius autem A. Adams (Ann. Mag. Nat. Hist. Nov. 1862. pag. 347.) genus non comprobavit, nihilo minus tamen nomen illud pro his testis parvis sibi sumpsit. Mea opinione nomen Montforto proprium retinendum est, nam icon typica a clar. Philippi (Conch. Cab. ed. alt. vol. 2, 4.) transscripta — Montfortium comparare mihi haud licuit — generi satis respondet. Itaque Scissurellae Orbignyi eadem sunt cochleolae, sed quaeritur num locum justum teneant in Molluscorum systemate. Woodwardus nomen mutavit in Anatomus.

Species ab Adamsio in Japonia detectae hae sunt:

Mino-shima, O-shima, Goto. Anatomus Japonicus A. Ad.

Iisdem locis. Anatomus lamellatus A. Ad.

Mino-shima. Anatomus turbinatus A. Ad.

Rifunshiri. Anatomus concinnus A. Ad.

Tsu-shima. Anatomus stramineus A. Ad.

## Haliotidea.

### Genus Haliotis Lin.

Haliotis gigantea Chemnitz.

Conch. Cab. vol. 10. pag. 315. Tab. 167. fig. 1610. 1611.

Plurima huius speciei variabilis specimina lecta sunt, e quibus denuo evidenterque elucet, Haliotin discum Reevei et Kamschatkanam Jonasii pro varietatibus tantum habendas esse, quod in

libello meo de Molluscis Japonicis pag. 28. jam docui; pariter clar. Lischke de hac specie uberrime disseruit meamque opinionem comprobavit (Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 101).

Haliotin Sieboldi Reevei (Conch. icon. spec. 32.), ad hoc tempus in Museo Britannico unicam, nunquam vidi. Clar. Reeve ait formam ejus mirabilem Cardii valvam singulam vel Concholepadem in mentem revocare. Haec species mihi est valde dubia, neque longe absum quin credam eam nil repraesentare nisi conformationem Haliotis giganteae monstruosam.

Haliotin giganteam Japoni „Tokobushi“ nominant.

#### Haliotis Japonica Reeve.

Proc. Zool. Soc. 1846. pag. 54. Conch. icon. Haliotis spec. 13.

A clar. de Siebold ex Japonia quondam reportata est.

Clar. Reeve annotat hanc cochleam liris spiralibus aequidistantibus ab Halioti lamellosa maris Europaei distinguendam esse, qua de causa eam pro specie genuina habet eo magis cum locus natalis nimis remotus sit. Sed mea opinione differentia inter utramque cochleam tam levis est, ut speciem Reeveanam pro varietate Haliotis lamellosae Japonica declaraverim, cum plura quoque Mollusca oceani Europaei pariter in aquis Japonicis obveniant.

#### Haliotis supertexta Lischke.

Malak. Bl. vol. 17. pag. 24. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 92.

Plura specimina juvenilia et adulta attulit clar. Rein colore picturaque vivida variantia. Foraminibus ovato-rotundatis subelevatis senis vel septenis, rarius octonis perviis instructa est. Haec species costulis confertis filis quasi supertextis imprimis insignitur. Interdum specimina inveniuntur foraminibus ex parte confluentibus.

#### Haliotis Gruneri Phil.

Zeitschr. für Malak. 1848. pag. 16. Abb. vol. 3. pag. 89. Haliotis Tab. 9. fig. 1.

Specimen exstat jam antea ex Japonia acceptum cum Sinensibus nostrae collectionis conveniens. Pariter tempore novissimo clar. Satow specimina nonnulla misit.

Exemplar originale a clar. Philippi depictum, omnino rufum est, sed specimina haud raro inveniuntur coloribus vividis variegata. Haec pictura simili modo in Halioti diversicolore Reevei observari potest, quae habitu quoque et sculptura Halioti Gruneri respondere videtur. Itaque fortasse jungendae sunt. Si vero res ita se habet, denominatio Reeveana prioritatis causa praeferenda est. Doleo descriptionem Reeveanam nimis brevem et mancarn esse; ex icone tantum iudicium facio.

#### Haliotis exigua Dkr.

Tab. nostra 6. fig. 8. 9. 10.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 69.

Testa parva ovata, plana, medio leviter canaliculata, spiraliter denseque striata et lirata, obsolete plicata, foraminibus rotundis confertis subtubiferis quinque perviis instructa; apex prominulus; spira parva sublateralis; labium planum; area inter marginem et foraminum seriem costata et canaliculata; color griseo-rubescens, fusco vel coccineo-variegatus; margarita vivide iridescens.

Cochlea parvula 22 mill. lata, liris spiralibus striisque transversis clathrata apparet. Pars infra foramina et marginem testae declivis, canaliculo costisque nonnullis cincta est.

Specimina quinque lecta sunt forma et sculpturae indole congruentia. Haec species imprimis testa depressa medio leviter canaliculata insignitur. Haliotin parvam Linnaei (canaliculatam Lamarckii) in mentem revocat, quae vero multo major fit.

Ad Padollos Montforti pertinet, quod quidem genus non adoptaverim.

#### *Haliotis latilabris* Phil.

Zeitschr. für Malak. 1848. pag. 15. Abb. vol. 3. pag. 15—91. Tab. 9. fig. 5.

Insulae Liu-Kiu inter Japoniam et insulam Formosam.

Haec cochlea varietas Hal. ovinae Chemnitzii esse mihi videtur.

#### Genus *Teinotis* H. et A. Adams.

##### *Teinotis asinina* Lin. (*Haliotis*).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 780. Mus. Lud. Ulr. Reg. pag. 685. Syst. Nat. ed. 12. pag. 1256. Rumphii Mus. Tab. 40. fig. E. F. Reeve Conch. icon. vol. 3. *Haliotis* spec. 18. (Icon a specimine magnitudinis inusitatae desumpta est.)

Tria specimina Japonica. In collectione nostra testae e mari Chinensi, ex insulis Java et Philippinis nec non e Nova Hollandia occidentali exstant.

Haec species forma singulari, superficie glabrata, colore plerumque olivaceo, sed pictura admodum variabili, praesertim maculis irregulariter triquetris, lineis undulatis vel pennatis insignita est.

Animal pede longo crasso valde producto a latere membranaceo et reflexo dorsum testae obtegente ab *Halioti* vera differt. Testa, cum a parte illa membranacea vel lacinia tecta sit, semper nitida est et epidermide caret.

### Fissurellacea.

#### Genus *Lucapina* Gray.

##### *Lucapina Sieboldii* Reeve (*Fissurella*).

Tab. nostra 6. fig. 14. 15. var.

Conch. icon. *Fissurella* spec. 102. Sow. Thes. vol. 3. pag. 193. fig. 138.

Hanc speciem antea nomine *Lucapinae Pfeifferi* descripsi (Malak. Bl. vol. 24. pag. 17.), sed comparatione accurata edoctus sum, hanc testam varietatem tantum speciei Reeveanae repraesentare.

Testa oblonga, conoidea, solidiuscula, tota alba, vel maculis sparsis fuscis signata, costis radiantibus compressis imbricatis 10—11, anticis minoribus densis, posticis majoribus distantibus instructa; costulae in interstitiis lineis concentricis elevatis cancellatae; foramen magnum rotundato-ovatum tertiam longitudinis partem tenens, marginem versus anticum inclinatum, intus callo exiguo cinctum; dorsum valde fornicatum; margo subcrenatus. Costae canaliculis radiantibus interne indicantur.

Specimina nostra 18—22 mill. longa *Lucapinam* (*Fissurellam*) calyculatam Sow. (Conch. Ill. fig. 19. 21. Thes. fig. 126. 127.) in mentem vocant, quae vero vertice elevato, foramine paene circulari multo minore, lateribus directe abruptis neque dorso fornicato abunde differt. *Lucapina*

(Fissurella) varicosa Sow., maris Sinensis incola, foramine parvulo circulari costisque obesis et nodosis insignis est.

**Lucapina Ticaonica Reeve (Fissurella).**

Conch. icon. Fissurella spec. 107. Sowerby Thes. pag. 197. Tab. 140. fig. 110.

Unum specimen e mari Japonico exstat cum icone Sowerbyi plane conveniens. Icon Reeveana non satis respondet. Haec species dorso fornicato, foraminis formatione e sculptura exquisita cancellata insignis est.

Antea ex insulis Philippinis tantum innotuit.

**Genus Macroschisma Swains.**

**Macroschisma maximum A. Adams.**

Patella macroschisma Chemn. Conch. Cab. vol. 11. pag. 184. Tab. 197. fig. 1923. 1924. Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 202. Fissurella macroschisma Humphrey. Sowerby Conch. Ill. fig. 39. Thes. Conch. vol. 3. Fissurellidae pag. 205. fig. 216. 217.

Species colore et picturae indole variabilis, plerumque atro- et rubro-radiata, interdum rosea utrinque strigata, vel tota rosea, vel nigrescens.

Hakodate. Unum specimen exstat.

**Macroschisma dilatatum A. Adams.**

Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 202. Sowerby Thes. Conch. vol. 3. pag. 206. fig. 220.

Testa radiatim striata postice quadricostata, rosea utrinque albo-strigata; foramen magnum in testa media incipiens.

Tria specimina.

**Macroschisma Sinense A. Adams.**

Proc. Zool. Soc. 1855. pag. 122. Sowerby Thes. Conch. vol. 3. pag. 250. fig. 219.

Unum specimen nigrescens.

Hoc genus Swainsonianum in Patellam macroschisma Chemn. (Fissurellam macroschisma Sow.) fundatum, testa scutiformi elongata, radiatim striata, antice elevata emarginata vel sinuata et perforatione magna ovata vel lanceolata insigne est. Animal Cumingio auctore permagnum larvaeforme. Apertura analis marginem versus anteriorem testae magis approximata est quam in reliquis Fissurellaceis. H. et A. Adams Rec. Moll. vol. 1. pag. 449. A. Adams Ann. and Mag. Aug. 1860. pag. 111. Anno 1867 idem auctor animal primus delineavit et fusius descripsit. (Conf. Proc. Zool. Soc. 1867. pag. 312. Tab. 19. fig. 28.) Swainsonius male dicit Machrochisma, pariter vitiosa est scribendi ratio Macrochisma, cum hoc vocabulum a *μακρὸς* et *τὸ σχίσμα* derivetur ideoque non pro feminino adhiberi debeat.

**Genus Cemoria Leach.**

**Cemoria nobilis A. Adams.**

Ann. Mag. Dec. 1860. pag. 422. Sowerby Thes. Conch. vol. 3. pag. 208. Tab. 245. fig. 6—9.

Testa conoidea solida, costis radiantibus crassis aequidistantibus striisque inter costas con-



centricis instructa; apex acutus resupinatus subcentralis; foramen antice angustum, postice sulco longo terminatum; septum crassiusculum; latus internum radiatim sulcatum; margo crenato-dentatus.

Species magna fere pollicaris.

Insula Okoshiri.

### **Genus *Cranopsis* A. Adams.**

*Cranopsis pelex* A. Ad.

Ann. Mag. Apr. 1860. pag. 302.

Mino-shima in freto Coreano.

*Cranopsis pileolus* A. Ad.

Ibid. Aug. 1860. pag. 120.

Fretum Coreanum.

Praecedente specie minor, utrinque compressa. Vertex subspiralis et deflexus.

### **Genus *Zeidora* A. Adams.**

*Zeidora calceolina* A. Ad.

Ann. Mag. Apr. 1860. pag. 302. Sow. Thes. vol. 3. pag. 209. Tab. 245. fig. 3.

Mino-shima.

*Zeidora reticulata* A. Ad.

Ann. Mag. Apr. 1862. pag. 298. Sow. Thes. vol. 3. pag. 209. Tab. 245. fig. 1. 2.

Mino-shima.

Hoc Fissurellaceorum genus mirabile Emarginulas parvulas repraesentat septo Crepidulae instar praeditas. Utraque species hucusque tantum innotuit.

### **Genus *Rimula* Defrance.**

*Rimula Cumingii* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 227. Sow. Thes. vol. 3. pag. 210. Tab. 245. fig. 1.

Unum tantum exemplar exstat.

### **Genus *Puncturella* Lowe.**

*Puncturella noachina* Lin. (Patella).

Mant. Plant. pag. 551. Jeff. Brit. Conch. vol. 3. pag. 257. Tab. 6. fig. 2. Corea Shells Linn. Society's Journ. Zool. vol. 14. pag. 422.

Mare Japonicum.

De lata huius speciei diffusione conf. Jeff. Brit. Conch. vol. 3. pag. 258.

**Genus Emarginula Lam.**

*Emarginula Adamsiana* Sow.

Thes. vol. 3. pag. 214. Tab. 246. fig. 27. 28.

Mare Japonicum.

*Emarginula scabriuscula* A. Ad.

Proc. Zool. Soc. 1851. pag. 83. Sow. Thes. vol. 3. pag. 213. fig. 36.

Mare Japonicum.

*Emarginula Japonica* Sow.

Thes. vol. 3. pag. 216. Tab. 246. fig. 43. 44.

Mare Japonicum.

*Emarginula solidula* Costa.

Phil. Enum. Moll. Sic. vol. 1. pag. 115. Tab. 7. fig. 14. Sow. Thes. vol. 3. pag. 214. Tab. 246. fig. 47. 48.

Hanc speciem clar. Weinkauff Conch. des Mittelm. vol. 2. pag. 395. cum *Patella fissura* Linnaei conjunxit.

Cochleola prope Cataniam frequens pariter in mari Japonico obvenire dicitur.

*Emarginula maculata* A. Adams.

Sow. Thes. pag. 214. Tab. 246. fig. 31. 32.

Mare Japonicum.

*Emarginula picta* Dkr.

Malak. Bl. 1860. pag. 226. Moll. Jap. pag. 24. Tab. 3. fig. 15.

Portus De-shimae

Clar. Sowerby hanc speciem cum *Emarginula pulchra* A. Adams ex insulis Philippinis conjunxit (Thes. Conch. vol. 3. pag. 219. Tab. 246. fig. 50. 51.), sed nostra species habitu minore, lateribus compressis et sculptura aliena differre mihi videtur.

Clar. Lischke notas distinguentes inter utramque testam exposuit (Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 70). Cum vero *Emarginulae* variare soleant, sententiae Sowerbyanae ego non repugnabo.

**Genus Scutus Montf. \*)**

*Scutus corrugatus* Reeve (Parmophorus).

Proc. Zool. Soc. 1842. Sowerby Thes. Conch. vol. 3. pag. 220. Tab. 13. fig. 4. Tab. 14. fig. 7. (descriptio brevissima).

Specimen unum adest.

Testa oblonga depressa, solidula, alba, subpellucens, antice emarginata, postice rotundata; dorsum costulis densis undulatis, prope umbonem corrugatis plicisque nonnullis ab apice radiantibus instructum. Apex acutiusculus resupinatus tertiam longitudinis testae partem tenens, sulcis nonnullis incrementi validioribus cinctus. Latus internum, ut in genere solet, laevigatum excepta impressione musculari.

---

\*) melius Scutum.

## Dentaliacea.

### Genus Dentalium Lin.

#### Dentalium Vernedei Hanl.

Sowerby Thes. Conch. vol. 3. pag. 101. fig. 3.

Duo specimina integra adsunt.

Testa permagna crassa, modice arcuata, unicolor eburnea, vel fasciis flavescentibus passim cincta, costellis plurimis densis aequalibus plano-convexis, apicem versus inaequalibus magis prominentibus undique sculpta striisque transversis cancellata; fissura perlonga. — Alt. 133 mill., diam. max. 15 mill.

Dentalium grande Desh. Mém. nat. Par. pag. 365. Tab. 17. fig. 1—3. e stratis telluris tertiariae prope Grignon si non eadem species, certe admodum affinis.

#### Dentalium Japonicum Dkr.

Tab. nostra 5. fig. 2.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 68.

Testa solida alba apicem versus flavescentibus, parum arcuata, costis crassis septenis vel octonis costulisque interpositis instructa, transversim striata; apex integer crassiusculus fissura prorsus carens. — Alt. 72 mill., diam. 6 mill.

Haec species Dentalio Javano Sow. (Thes. Conch. vol. 3. pag. 102. Tab. 1. fig. 12.) haud dissimilis, habitu graciliore, costulisque interpositis crassis, omnino sculptura magis prominente facile distinguitur. Dentalium octogonum multo minus magis arcuatum est.

#### Dentalium Weinkauffi Dkr.

Tab. nostra 5. fig. 1.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 68.

Testa maiuscula crassa, eburnea, arcuatula, superne costulis perspicuis inaequalibus basin versus sensim evanescentibus instructa; apex gracilis fissura parva signatus. — Alt. 86—87 mill., diam. 8 mill.

Hanc speciem, quae Dentalium Tarentinum aliquo modo in mentem revocat, quod vero multo minus est, nullibi descriptam aut depictam inveni.

Clar. Henrico Weinkauff, Molluscorum maris Mediterranei scientissimo scriptori hoc Dentalium dedicatum est.

#### Dentalium octogonum Lam.

Reeve Conch. syst. vol. 2. Tab. 36. fig. 8. icon bona. Sowerby Thes. Conch. vol. 3. pag. 162. fig. 9. etc.

Specimina plura exstant costarum numero variabilia, ceterum plane congruentia. Specimina costis septenis instructa clar. Lischke cum Dentalio hexagono conjunxit. At vero inter haec nostra specimina unum certe inventum est, quod costas novem ostendit, ceteroquin reliquis plane respondens. Praeterea nemo neget differentias graviores inter Dentalia octogonum et hexagonum, si eorum numerus non respicitur, qui est variabilis, non constare, qua de causa Dentalia octogonum et hexagonum mihi saltem ad unam eandemque speciem pertinere videntur. Eodem modo crediderim incolas harum testarum veris differentiis distinguendos non esse, si eos examinandi data fuerit occasio.

Dunker, Moll. Jap. mar.

## Tecturacea.

### Genus *Tectura* Andonin et Milne Edwards.

#### *Tectura patina* Eschscholtz (*Acmaea*).

Zool. Atl. 5. pag. 19. Tab. 24. fig. 7. 8. *Patella* (*Acmaea*) *patina* Midd. Reise vol. 1. pag. 178. Tab. 16. fig. 1—3. = *Acmaea scutum* Eschscholtz = *Patella verriculata* Reeve. De ceteris synonymis conf. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 93.

Species mirum in modum variabilis in aquis septentrionalibus in litore Californiae etc. late dispersa.

Plura specimina Japonica in collectione Molluscorum nostra exstant.

#### *Tectura dorsuosa* Gould (*Acmaea*).

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 7. pag. 162.

Hakodate.

Haec species mihi incognita *Tecturae* antecedenti similis esse dicitur, praesertim varietati, quam Nuttallius *Tecturam* monticulam nominavit.

#### *Tectura testudinalis* Müller.

Zool. Dan. prodr. Hafniae 1776. pag. 237. v. Schrenck Reisen im Amurlande Moll. pag. 249.

Dubito num cochlea nostra vera sit species Mülleri.

#### *Tectura Heroldi* Dkr. (*Patella*).

Moll. Jap. pag. 24. Tab. 3. fig. 19.

Haec cochlea maximopere variat habitu, modo est depressa, modo valde elata, interdum utrinque angustata. Has tres formas pro speciebus genuinis quondam habui et a *Tectura Heroldi* nomine *Patellae* conuli et pygmaeae separavi (Moll. Jap. pag. 24.). Sed clar. Lischke in speciminibus plurimis observavit has varias formas unam in alteram sensim transire. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 96.

#### *Tectura digitalis* Eschsch. (*Acmaea*).

Zool. Atlas Berl. 1829. pag. 20. Tab. 23. fig. 7. 8. Middend. Beitr. zu einer Mal. Rossica vol. 2. pag. 35. Mém. de l'Acad. Imp. de St. Pétersb. vol. 6. pag. 363. Schrenck Amurl. pag. 297.

Hakodate, sinus de Castries

Haec species desideratur.

De *Tecturarum* speciebus ab Eschscholtzio separatis cfr. R. A. Philippi Zeitschr. f. Malak. 1846. pag. 106.

#### *Tectura concinna* Lischke (*Acmaea*).

Malak. Bl. vol. 17. pag. 25. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 93. Tab. 6. fig. 1—6.

Species parum variabilis.

**Tectura Schrenckii Lischke (Acmaea).**

Malak. Bl. vol. 15. pag. 220. Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 107. Tab. 8. fig. 1—4. *Patella grano-striata* Schrenck non Reeve.

Species concinna forma picturaeque indole constans ab antecedente satis diversa.

Plura specimina prope Hakodate lecta exstant.

**Genus Scutellina Gray.**

**Scutellina pulchella Lischke.**

Malak. Bl. vol. 18. pag. 41. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 100. Tab. 6. fig. 20—23.

Nagasaki.

**Genus Lepeta Gray.**

**Lepeta caeca Müll. (Patella).**

Prodr. Zool. Dan. pag. 237. Tab. 12. fig. 2. Midd. Reise vol. 1. pars 1. pag. 183. Tab. 16. fig. 6. Jeff. Brit. Conch. vol. 3. pag. 252. Tab. 5. fig. 6.

*Patellae candida* Couth. et *cerea* Möll. huc pertinent.

Mare Japoniae septentrionale.

Unum specimen exstat.

**Patellacea.**

**Genus Patella Lin.**

**Patella saccharina Lin.**

Syst. Nat. ed. 10. pag. 781. Mus. Lud. Ulr. pag. 690. Dunker Moll. Jap. pag. 24.

Specimina minora exstant.

Species satis frequens ambitu quidem variabilis, sed costarum formatione facile cognoscenda. *Patella lanx* Reeve (Conch. icon. Pat. spec. 82.) sine dubio huc pertinet. At vero *Patelloida stellaris* Q. et G. Astr. vol. 3. pag. 356. Tab. 71. fig. 1—4, quam Adamsius cum nostra specie conjunxit, valde abhorret.

**Patella nigro-lineata Reeve.**

Conch. icon. Pat. spec. 43 a. b. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 111. Tab. 8. fig. 5—11. vol. 2. pag. 103. Tab. 7. fig. 1—6.

Clar. A. Adams in „Japanese species of Patellidae“ (Ann. and Mag. of Nat. Hist. Ser. 4. vol. 2. 1868. pag. 369.) hanc speciem nomine *Patellae elegantis* Phil. (Abb. vol. 3. pag. 33. Tab. 2. fig. 2.) enumeravit, quae vero testa valde aliena differt, pariter *Patellam grano-striatam* Reevei et *Patellam aeruginosam Middendorffii* pro synonymis habet, quae cum specie, de qua hic est sermo, nullo modo jungendae sunt.

De *Patella nigro-lineata* in mari Japonico frequentissima pictura admodum variabili semper quidem nigro- vel fusco-lineata clar. Lischke uberrime disseruit optimasque icones adjecit.

*Patella toreuma* Reeve.

Conch. icon. Pat. spec. 69. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 109. Tab. 8. fig. 12—15. vol. 2. pag. 102. Tab. 6. fig. 12.

Plura specimina exstant prope Nagasaki et Tokio lecta.

*Patella amussitata* Reeve.

Conch. icon. Pat. spec. 83. Schrenck Nordjap. Moll. pag. 30. Tab. 14. fig. 4. 5. var. elata. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 109. vol. 2. pag. 100. Tab. 6. fig. 7—11.

Plura specimina exstant iisdem locis collecta.

Clar. Lischke hanc speciem maris Japonici vulgatissimam accuratius tractavit ejusque synonymiam emendavit.

*Patella clypeaster* Lesson.

Zool. Voy. de la Coquille pag. 419. Reeve Conch. icon. vol. 8. spec. 38. ibid. spec. 15. nomine *Patellae cupreae*. *Patella argentata* Sow. Zool. of Cap. Beechey's Voy. Moll. pag. 148. Tab. 39. fig. 7.

Haec species singularis in litore Chilensi ex. gr. prope Arauco aliisque locis haud rara, pariter in sinu Californiano invenitur. Clar. de Schrenck eam pro cochlea quoque Japonica prope Hakodate lecta enumeravit. Inter Mollusca nostra Japonica desideratur.

*Patella stellaeformis* Reeve.

Proc. Zool. Soc. 1842. Conch. Syst. Tab. 136. fig. 3.

*Patella pentagona* Born. (Test. Mus. Caes. Vind. pag. 421. Tab. 18. fig. 4. 5.), quam Reeveus serius citavit (Conch. icon. Pat. spec. 48.), non respicienda est, cum species valde dubia et monstrosa esse videatur. De synonymis vitiosis ab Adamsio l. c. pag. 369. allatis conferatur Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 114.

Unum specimen clar. Satow misit.

*Patella pallida* Gould.

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 7. pag. 162. Pat. *Lamanonii* Schrenck Reisen und Forsch. im Amurl. vol. 2. pag. 303. Tab. 14. fig. 6—9. (optime descripta et depicta).

Mare Japonicum septentrionale.

Species insignis testa solida valde elata oblique conica, costis scabris inaequalibus ab apice acutiusculo radiantibus instructa. Color natus lacteus est, sed saepius subviridis invenitur e Con-fervis ortus.

Plura specimina exstant, habitu valde variantia prope Hakodate lecta.

Praeterea clar. Adams l. c. ut species Japonicas *Patellas* testudinariam et rusticam Linnaei enumeravit. Illa in nostra Molluscorum Japonicorum collectione desideratur. Quod vero attinet ad *Patellam rusticam* Lin. (Mus. Lud. Ulr. pag. 694. = *Patella* (Lepas) indica Mart. Conch. Cab. vol. 1. fig. 49.) notandum est, hanc speciem magnam hucusque in Africae tantum australis litore, *Patellarum* multarum regione eximia, repertam esse, quapropter num determinatio Adamsiana recta sit dubitaverim, eo magis, cum *Patellam* piperatam Gould et *Luzonicam* Reeve, species valde diversas cum ea conjunxerit. De *Patella rustica* maxima inter scriptores est confusio. Ut mea fert opinio Schroeterus hanc speciem Linnaeanam recognovit et Reeveus eam in Conch. icon. fig. 8. optime illustravit.

**Patella exarata Nuttall.**

Jay's Catal. of Shells ed. 4. pag. 101. Reeve Conch. icon. vol. 8. spec. 47. Schrenck Amurl. vol. 2. pag. 302.

Hakodate Lindholm, litus Californianum Baskerville.

Ad hanc nostram cochleam certe pertinet *Patella Mazatlanica* Gray (Beechey's Voy. pag. 148. Tab. 39. fig. 12.).

Specimen Japonicum adest incerti loci natalis margine interno argenteo-margaritaceum, latere externo costis radiantibus elevatis nodosis et rugosis aterrimis instructum.

**Chitonacea.**

**Genus Lophyrus Poli.**

*Lophyrus Coreanicus* Adams et Reeve (Chiton).

Conch. icon. vol. 4. Chiton. spec. 128. Voy. Samar. Moll. Tab. 15. fig. 9. v. Schrenck Reisen etc. pag. 281. Tab. 13. fig. 1—6.

Archipelagus Coreanus lapidibus insidens, Belcher, Hakodate Lindholm.

*Lophyrus Albrechti* Schrenck (Chiton).

Bullet. de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersb. vol. 5. pag. 511. Reisen etc. pag. 283. Tab. 13. fig. 7—17. Hakodate.

**Genus Callochiton Gray.**

*Callochiton fuliginatus* Adams et Reeve (Chiton).

Conch. icon. vol. 4. Chiton spec. 174.

Fretum Coreanum Belcher.

**Genus Lepidopleurus Risso.**

*Lepidopleurus Lindholmii* Schrenck (Chiton).

Bull. de l'Acad. des sciences de St. Pétersb. vol. 5. pag. 511. Reisen etc. pag. 288. Tab. 12. fig. 9—16. Hakodate (Lindholm).

**Genus Leptochiton Gray.**

*Leptochiton Middendorffii* Schrenck (Chiton).

Bullet. St. Pétersb. vol. 4. pag. 408. Reisen etc. pag. 278. Tab. 12. fig. 1—8.

Sinus de Castries.

*Leptochiton scrobiculatus* Midd. (Chiton).

Bullet. St. Pétersb. 6. pag. 121.

Mare Japonicum septentrionale.

**Leptochiton Mertensii Midd. (Chiton).**

Bullet. St. Pétersb. 6. pag. 118.

Hakodate.

**Leptochiton lividus Midd. (Chiton).**

Bullet. St. Pétersb. 6. pag. 120.

Mare Japonicum septentrionale.

**Leptochiton concinnus Gould (Chiton).**

Proc. of the Bost. Soc. of Nat. Hist. vol. 7. pag. 164. Schrenck Reisen etc. pag. 599.

Hakodate.

**Genus Tonicia Gray.**

**Tonicia Brandtii Midd. (Chiton).**

Bull. de l'Acad. de St. Pétersb. vol. 6. no. 8. Reise in den äussersten Norden etc. vol. 1., 1. pag. 174.  
Tab. 15. fig. 1—6.

Mare Japonicum septentrionale, insulae Schantaricae etc.

**Tonicia Merekii Midd. (Chiton).**

Bullet. St. Pétersb. 6. pag. 120.

Mare Japonicum septentrionale.

**Tonicia Eschscholtzii Midd. (Chiton).**

Bullet. St. Pétersb. 6. pag. 118.

Mare Japonicum septentrionale.

**Tonicia Sitchensis Midd. (Chiton).**

Bullet. St. Pétersb. 6. pag. 121. (non Reeve).

**Genus Chiton Lin.**

**Chiton spiniger Sow.**

Sow. Mag. Nat. Hist. 1840. pag. 287. Proc. Zool. Soc. 1841. Reeve Conch. icon. vol. 4. spec. 75.

Hakodate Schrenck. (Insulae Philippinae.)

**Genus Chaetopleura Schuttl.**

**Chaetopleura Japonica Lischke (Chiton).**

Chiton Japonicus Lischke Mal. Bl. 1873. pag. 22. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 71. Tab. 5. fig. 8—11.

Nagasaki.

**Genus Mopalia Gray.**

**Mopalia Stimpsoni Gould (Chiton).**

Proc. of the Bost. Soc. of Nat. Hist. vol. 7. pag. 165.

Hakodate, Liu-Kiu.



**Genus Catharina Gray.**

*Catharina submarmorea* Midd. (Chiton).

Bull. de l'Acad. de St. Pétersb. Tab. 6. no. 8. Reise etc. vol. 1. pars 1. pag. 178. Tab. 14. fig. 7—10.  
Tab. 15. fig. 7. 8. Schrenck Reisen etc. pag. 276.

Una cum *Tonica Brandtii* satis frequens.

**Genus Cryptochiton Gray.**

*Cryptochiton Stelleri* Midd.

Beitr. zu einer Mat. Ross. 1. pag. 37. et 93. Tab. 1. fig. 1. 2. Chiton Sitkensis Reeve Conch. icon.  
vol. 4. spec. 55.

Specimina maxima ultra 200 mill. longa et unum parvulum exstant.

Mare Japonicum septentrionale, litus Kamschatkanum etc., litus Californianum (Monterey).

**Genus Amicula Gray.**

*Amicula Pallasii* Midd. (Chiton).

Bull. de l'Acad. de St. Pétersb. 6. pag. 117. Reise etc. vol. 1. pars 1. Moll. pag. 163. Tab. 13. fig. 1—9.  
Tab. 14. fig. 1—6.

Hanc speciem auctor uberrime tractavit et rationem inter eam et species huius generis  
quae sequuntur, optime exposuit.

Mare Japonicum septentrionale.

*Amicula Emersoni* Couth.

Boston Journ. of Nat. Hist. vol. 2. pag. 83. Tab. 3. fig. 10. Reeve Conch. icon. vol. 4. spec. 62.

Una cum antecedente.

*Amicula amiculata* Pallas (Chiton).

cfr. Midd. Nov. Act. Acad. Petrop. 11. 235—7. Tab. 7. fig. 26—30. Reise etc. 1, 1. pag. 170. Reeve  
Conch. icon. spec. 59.

*Amicula vestita* Sow. (Chiton).

De his specibus cognatis cfr. Midd. l. c. pag. 170. et seq.

**Genus Acanthochiton Risso.**

*Acanthochiton scutiger* Ad. et Rye. (Chiton).

Conch. icon. spec. 178.

Fretum Coreanum.

*Acanthochiton Selandicus* Quoy et Gaim. (Chiton).

Astrol. vol. 3. pag. 400. Tab. 73. fig. 5—8. Reeve Conch. icon. spec. 58. Schrenck Nordjap. Moll.  
pag. 273.

Hakodate.

**Acanthochiton hirudiniformis Sow. (Chiton).**

Reeve Conch. icon. spec. 54.

Fretum Coreanum (Belcher).

**Acanthochiton rubro-lineatus Lischke (Chiton).**

Mal. Bl. 1873 pag. 24. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 73. Tab. 5. fig. 12.

Nagasaki.

**Acanthochiton achates Gould (Chiton).**

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 7. pag. 165.

Hakodate.

Praeterea Tilesius jam anno 1824 in Mém. de l'Acad. Imp. St. Pétersb. vol. 9. tres Chitonum species in litore Kamschatkano et in insulis Kurilis obvias descripsit, mihi prorsus ignotas; sunt Chiton giganteus, setosus et muricatus.

**Actaeonacea.**

**Genus Actaeon Montfort.**

**Actaeon giganteus Dkr.**

Tab. nostra 2. fig. 8. 9. cum particula magnitudine aucta delineata.

Testa ovato-turrita, alba, interdum flavidula, subsolida transversim regulariterque costata, anfractibus octonis convexis sutura perspicua divisio instructa, ultimo dimidiam altitudinem aequante; apertura ovata; labrum subincrassatum intus sulcatum; columella sinuata plica valida munita; rima umbilici loco a margine columellae paulum reflexo semiobtectata; apex obtusiusculus laevigatus.

Plura specimina exstant, maximum 31 mill. altum, 14 latum. Testa solidula costis regularibus superne planis obsoleteque striatis cincta est; in anfractu ultimo costae numerantur 22—26. Sulci costis illis angustiores per vitrum spectati, striati et passim cancellati apparent.

Haec cochlea eximia antea per errorem inter Odontostomias enumerata est. (Malak. Bl. vol. 24. pag. 71).

Inter species fossiles nonnullae cum specie nostra comparabiles sunt.

**Genus Kleinella A. Adams.**

**Kleinella cancellaris A. Adams\*).**

Ann. and Mag. Apr. 1860. pag. 302.

Fretum Coreanum.

---

\*) Rectius cancellata.

*Kleinella sulcata* A. Adams.

Ann. and Mag. Apr. 1862. pag. 295.

Mare Suwonado.

**Genus Myonia A. Adams.**

*Myonia Japonica* A. Adams.

Ann. and Mag. 1860 (m. Maji). pag. 406.

Fretum Coreanum.

*Myonia virgo* A. Adams (antea Agatha).

Ann. and Mag. Dec. 1860. pag. 422.

Fretum Coreanum.

*Myonia scitula* A. Adams.

Ann. Mag. Sept. 1861. pag. 242.

Mino-shima.

**Genus Leucotina A. Adams.**

*Leucotina Niphonensis* A. Adams.

Ann. and Mag. 1860. (m. Maji) pag. 407.

Niphon et fretum Coreanum.

*Leucotina exarata* A. Adams.

Ann. and Mag. 1860. (m. Dec.) pag. 421.

Tabu-shima.

*Leucotina insculpta* A. Adams.

Ann. and Mag. Aug. 1861. pag. 138.

Fretum Coreanum.

*Leucotina punctata* A. Adams.

ibid. pag. 139.

Tabu-shima.

*Leucotina sulcata* A. Adams.

Ann. and Mag. Sept. 1861. pag. 241.

Corea.

Kleinellae, Myoniae et Leucotinae ab Adamsio cum Actaeonaceis junguntur.

**Genus Buccinulus Plancus.**

*Buccinulus fraterculus* Dkr.

Tab. nostra 13. fig. 21. et 22. magn. aucta, fig. 23. magn. nat.

Testa parva solida, ovato-oblonga, subcylindrica transversim aequaliterque sulcata, cinereo-vel fusco-balteata et punctata, fasciis duabus albis cineta; spira conica apice obtusiusculo terminata;

Dunker, Moll. Jap. mar.

columella plicis binis albis instructa, antica majore bipartita sinu profundo a minore postica sejuncta; apertura antice incrassata dilatata; labrum acutum.

Haec species 12 mill. longa, 5 lata, Buccinulo solidulo (Bullae solidulae Linnaei) plane analoga, sed multo minor et gracilior est. Specimina tria exstant.

Buccinulus strigosus Gould (Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 7. pag. 141. Otia Conch. pag. 114.) si non eadem species, certe valde affinis est. Cochleola nomine Tornatellae strigosae a clar. Lischke (Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 104. descripta et Tab. 5. figg. 12. 13.) depicta, ad speciem Gouldianam pertinere videtur. Cochleola nostra multo major et gracilior est; praeterea fasciae albae tantum duae neque tres et sulci transversi 30—32 neque 20—21 in ultimo ejus anfractu numerantur.

## Aplustracea.

### Genus Hydatina Schum.

*Hydatina physis* Lin. (Bulla).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 727. Mus. Lud. Ulr. pag. 587. Bulla virgata Martyn Univ. Conch. fig. 11. Lam. anim. sans vert. ed. 2. vol. 7. pag. 670. Quoy et Gaimard Voy. de l'Astr. Tab. 26. fig. 1—3.

Specimen minus adest.

Clar. Möreh in Cat. Yoldi pag. 136. hanc speciem (vel Hydatinam filosam Schumacheri) ab Hydatina (Bulla) virgata Mart. ut speciem propriam separavit. Comparatione inter specimina insularum Antillarum et iis, quae ex oceano Indico proveniunt, diligenter facta, nullum invenire potui discrimen. Hanc cochleam Japani „Omu gai“ nominant.

De lata huius speciei diffusionem geographicam conf. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 114. Nuperrime amicus Eduardus Geisse eam in insula quoque St. Vincent Africae occidentalis legit.

*Hydatina albo-cincta* v. d. Hoeven (Bulla).

Tydschr. voor Gesch. en Phys. vol. 6. pag. 246. Tab. 10. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 566. Tab. 120. fig. 17. 18.

Specimen magnificum 48 mill. longum cum antecedente captum est, quod fasciis pallide fuscis neque cinerascentibus insignitur.

*Hydatina inflata* Dkr.

Tab. nostra 2. fig. 14. 15. 16.

Malak. Bl. vol. 24. 1877. pag. 69.

Testa magna inflata et globosa, umbilicata, tenuicula, subpellucida, cinereo-pallideque fusca, strigis longitudinalibus densissimis balteoque unico albo linea fusca bipartito in inferiore cochleae parte signata, fascia alba lata juxta umbilicum; spira profunde immersa; latus internum lacteum.

Cochlea permagna 44 mill. alta totidemque lata.

Haec Hydatinarum species umbilico vel rima umbilici a lamina columellae vix oblecta, spirae formatione totaque forma insignis est.

Mare Japoniae mediterraneum prope Wakayama.

### Genus *Bullina* Fér.

*Bullina lineata* Wood (Bulla).

Ind. Test. Suppl. Tab. 3. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 563. Tab. 120. fig. 2. *Bulla undata* Brug. = *nitidula* Sol. = *elegans* Mke.

Tria specimina variae aetatis lecta sunt. Praeterea hanc cochleolam concinnam ex insulis Antillis et Australia quondam accepi.

*Bullina scabra* Chemn. (Bulla).

Conch. Cab. vol. 10. pag. 118. fig. 1352. 1353. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 563. Tab. 120. fig. 1.

Mare Japonicum teste Cuming.

Haec species desideratur.

### Cylichnacea.

#### Genus *Cylichna* Lovén.

*Cylichna semisulcata* Dkr.

Tab. nostra 13. fig. 7. 8. magn. nat. fig. 9. particula magn. aucta.

Testa cylindrata, solidula, utrinque rotundata, alba epidermide pallide fusca vestita, per longitudinem tenerrime denseque rugata, basi transversim sulcata; labrum acutum subrectum; apertura ut in genere solet antice dilatata; columella rimata. — Alt. 18, diam. max. 8 mill.

Mare Japonicum, sed locus natalis certus ignotus.

Specimen tantum unum sed integrum exstat.

*Cylichna Japonica* A. Ad., in freto Coreano obvia, nostrae speciei certe simillima est, sed sulcis transversis totam testam tegentibus rugisque exiguis deficientibus satis differre mihi videtur. At contra inter *Cylichnam* arachin Quoy et Gaim. quam pariter in freto Coreano detexit clar. Adams, et Japonicam, discrimen gravius invenire non potui.

Praeterea clar. A. Adams in commentatione: On some new species of Cylichnidae etc. in Ann. and Mag. of Nat. Hist. Febr. 1862. pag. 150. enumeravit species quae sequuntur:

*Cylichnam Japonicam* A. Ad.

Fretum Coreanum.

*Cylichnam proximam* A. Ad.

Tsu-shima.

*Cylichnam venustulam* A. Ad.

Mino-shima.

*Cylichnam rimatam* A. Ad.

Fretum Coreanum.

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Tabu-shima. | <i>Cylichnam latiusculam</i> A. Ad. |
| Tsu-shima.  | <i>Cylichnam lepidulam</i> A. Ad.   |
| Mino-shima. | <i>Cylichnam consobrinam</i> A. Ad. |
| Tsu-shima.  | <i>Cylichnam parallelam</i> A. Ad.  |
| Mino-shima. | <i>Cylichnam assimilem</i> A. Ad.   |
| Tsu-shima.  | <i>Cylichnam pumilam</i> A. Ad.     |
| Tsu-shima.  | <i>Cylichnam candidulam</i> A. Ad.  |
| Mino-shima. | <i>Cylichnam ineditam</i> A. Ad.    |

Exceptis his speciebus novis — ne dicam de fossilibus — 20—22 *Cylichnarum* nomina nunc edita sunt. Postero tempore fortasse species quaedam si modo accuratius comparatae erint pro varietatibus tantum declarentur.

### Genus *Utriculus* Brown.

*Utriculus Cécillei* Phil. (Bulla).

Zeitschr. für Malak. 1844, pag. 164. Sow. Thes. Conch. vol. 2, pag. 572. Tab. 120, fig. 22.

Specimen unicum exstat plane conveniens cum eo, quod amicus Philippi quondam dono mihi dedit, quodque e mari Sinensi provenit.

Clar. Sowerby l. c. mare Mexicanum nominat, certe errore ductus.

### Genus *Tornatina* A. Adams.

*Tornatina exilis* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6, pag. 222. Moll. Jap. pag. 25. Tab. 2, fig. 14, magn. aucta.

Portus De-shimae.

*Tornatina delicatula* A. Ad.

Ann. Mag. Nat. Hist. Febr. 1862, pag. 153.

Mino-shima.

Respectu habito spirae obtusae subtruncatae et apicis mamillaris *T. pusillae* Pfr. quidem affinis est, sed statura longiore graciliore et apertura antice magis producta differt.

*Tornatina succincta* A. Ad.

l. c. pag. 154.

Tsu-shima, Awa-shima.

Species mihi incognita. Auctor annotat eam *Tornatinae truncatae* Ad. affinem, sed longiorem et indistincte fasciatam esse.

Praeterea Adamsius Museo Senckenbergiano has tres species ut incolas Maris Japonici misit:

**Tornatinam volutam Quoy et Gaim.**

Voy. de l'Astr. Tab. 26. fig. 33—35.

(Insula Guam.)

**Tornatinam fusiformem Adams.**

Thea. Conch. vol. 2. pag. 570. Tab. 121. fig. 37.

(Mare Sinense.)

**Tornatinam truncatam Adams.**

Linn. Trans. 5. 1. Tab. 7. fig. 5. Cfr. Phil. Enum. Moll. Sic. vol. 1. pag. 123. Tab. 7. fig. 19. nomine  
Bullae semisulcatae, vol. 2. pag. 96.

(Satis frequens est in arena littorum Siciliae. Phil.)

**Genus Volvula A. Adams.**

Cfr. A. Adams on new species of Mollusca from the Seas of China and Japan in Ann.  
Mag. Nat. Hist. Febr. 1862. pag. 154.

**Volvula opalina A. Ad.**

Mino-shima.

**Volvula spectabilis A. Ad.**

Tabu-shima.

**Volvula cylindrella A. Ad.**

Mino-shima.

**Volvula ovulina A. Ad.**

Mino-shima.

**Volvula radiola A. Ad.**

Tabu-shima.

**Volvula attenuata A. Ad.**

Tsu-shima.

**Volvula rostrata A. Ad.**

**Volvula eburnea A. Ad.**

**Volvula mucronata Phil.**

Hae species tres postremae in indice supra citato desiderantur, sed Adamsius eas ad Museum  
Senckenbergianum misit ut cochleas Japonicas sine certa quidem indicatione loci natalis.

**Bullacea.**

**Genus Bulla Lin.**

**Bulla ampulla Lin.**

Inter Mollusca nostra Japonica Bullae testa exstat unica, quae specimen Bullae ampullae  
Lin. juvenile repraesentare videtur.

**Genus Haminea Leach.**

*Haminea cymbalum* Quoy et Gaim. (Bulla).

Voy. de l'Astr. Zool. vol. 2. pag. 362. Tab. 26. fig. 26. 27. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 580. Tab. 124. fig. 90.

Nagasaki. Birileff.

Species late dispersa. Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 105.

Praeterea enumerantur:

*Haminea rotundata* A. Ad.

*Haminea brevissima* A. Ad.

*Haminea pygmaea* A. Ad.

*Haminea succinea* Conr.

*Haminea strigosa* A. Ad.

Cfr. Ann. and Mag. Nat. Hist. Febr. 1862. pag. 155. et 156.

**Genus Scaphander Montfort.**

Clar. Adams loco supra citato sex huius generis species novas breviter descripsit, quae nominantur:

Mino-shima. *Scaphander Japonicus* A. Ad.

Mino-shima. *Scaphander Cumingii* A. Ad.

Mino-shima. *Scaphander elongatus* A. Ad.

Mino-shima. *Scaphander sulcatus* A. Ad.

Fretum Coreanum. *Scaphander dilatatus* A. Ad.

Tsu-shima. *Scaphander Sieboldii* A. Ad.

Tsu-shima.

Hae species sine mensuris breviter descriptae nullibi, quantum scio depictae sunt.

**Genus Atya Montfort.**

*Atya naucum* Lin. (Bulla).

Mus. Lud. Ulr. pag. 586. Dkr. Moll. Jap. pag. 25.

Portus De-shimae.

*Atya scrobiculata* A. Adams.

Ann. and Mag. Nat. Hist. Febr. 1862. pag. 158.

Tabu-shima.

Species parvula aperturae formatione insignis, quae utrinque acuminata est.

Huic generi adjuncta sunt subgenera sic dicta quae sequuntur:

**Subgenus Roxania Leach.**

Testa solida ovata, transversim lineato-punctata.



*Roxania punctulata* A. Ad.

Mino-shima.

*Roxaniae Cranchii* Leach. affinis.

Subgenus *Alicula* Ehrenb.

Testa subcylindracea, transversim striata.

*Alicula translucens* A. Ad.

l. c. pag. 159.

Portus Hamiltoni.

*Aliculae succisae* Ehrenbergi e mari rubro cognata est.

*Alicula secalina* A. Ad.

l. c.

Tsu-shima.

*Alicula volvulina* A. Ad.

l. c.

Tsu-shima.

Subgenus *Sao* H. et A. Adams.

Testa pyramidata aut piriformis, postice attenuata, antice gibbosa.

*Sao folliculus* A. Ad.

l. c. pag. 160.

Tabu-shima.

*Sao phiala* A. Ad.

l. c.

Mino-shima.

*Sao elliptica* A. Ad.

l. c.

Tsu-shima.

Genus *Smaragdinella* A. Adams.

*Smaragdinella Sieboldi* A. Ad.

Ann. and Mag. Apr. 1864, pag. 310.

Takano-shima.

Haec species Japonica a *Smaragdinellis* viridi, glauca et minore secundum descriptionem Adamsianam satis differt.

Philinacea.

Genus *Philine* Ascanias.

*Philine scalpta* A. Adams.

Ann. and Mag. Nat. Hist. 1862, vol. 9, pag. 160. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3, pag. 76, Tab. 5, fig. 15, 16.

Sinus Jedoënsis, Tsu-shima, fretum Coreanum.

Haec species Adamsiana sine icone promulgata a clar. Lischke recte illustrata esse mihi videtur.

**Philine Japonica Lischke.**

Malak. Bl. vol. 19. pag. 105. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 77. Tab. 5. fig. 13. 14.

Sinus Jedoënsis.

**Philine crenata A. Adams.**

l. c. pag. 160.

Tsu-shima, Fretum Coreanum.

**Philine striolata A. Adams.**

l. c. pag. 161.

Tsu-shima.

**Philine Coreanica A. Adams (Bulla).**

Sowerby Thes. Conch. vol. 2. pag. 601. Tab. 125. fig. 166. Voy. Samar. Moll. pag. 65. Tab. 18. fig. 3.

Archipelagus Coreanus.

**Genus Laona A. Adams.**

**Laona zonata A. Ad.**

Ann. and Mag. Nat. Hist. m. Apr. 1865. pag. 324.

O-shima, Yobuko.

**Aplysiacea.**

**Genus Dolabella Lam.**

**Dolabella scapula Mart. (Patella).**

Univ. Conch. Rumphii Mus. Tab. 40. lit. N. Dolabella Rumphii Cuv. Ann. du Mus. 5. pag. 437.  
Tab. 29. fig. 1. Lamarck anim. sans vert. ed. 2. vol. 7. pag. 699.

Testa magna exstat prope Wakayama lecta epidermide cornea glaberrima nitente obducta.

**Genus Aplysia Lin. \*)**

**Aplysia marmorea A. Adams.**

Ann. and Mag. Nat. Hist. Aug. 1861. pag. 140.

Portus Hamiltoni.

**Aplysia marginata A. Adams.**

l. c.

Portus Hamiltoni.

Inter Aplysias H. et A. Adams fratres Aplysiae speciem nomine marginatae Blainv. jam enumeraverunt. Gen. of rec. Moll. vol. 2. pag. 34.

---

\*) In Linnaei Syst. Nat. editione duodecima Laelysia legitur, sed scribi debet *ἀπλυσία*. Literam L error typographicus praefixit.

## Umbrellacea.

### Genus Umbrella Lam.

#### Umbrella Indica Lam.

Anim. sans vert. vol. 7. pag. 573. Umbrella Chinensis Chemn. Conch. Cab. vol. 10. fig. 1645. 1646.

Specimen minus Umbrellae cujusdam inter Mollusca mea Japonica exstat, quod huc referendum esse arbitror, cum notis primariis ejusdem universe respondeat si quidem statura multo minor non respicitur. Testae huius generis inter se simillimae difficile distinguendae sunt nisi forte ipsum animal adest ut comparetur.

Mörchio affirmante nomen „Operculatum laeve“ Linnaei (Mus. Tess.) Umbrella Lamarckii antiquius est. Museum Tessinianum inspicere haud licuit.

## Heteropoda.

### Genus Janthina Lam.

#### Janthina fragilis Lam.

Trochus janthinus Chemn. Conch. Cab. vol. 5. pag. 57. Tab. 166. fig. 1577. 1578.

Sinus Jedoënsis.

De synonymis et de lata huius speciei diffusione geographica conf. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 169. vol. 3. pag. 52.

#### Janthina balteata Reeve.

Conch. icon. Janthina spec. 11.

Sinus Jedoënsis.

Conf. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 168. vol. 3. pag. 53.

#### Janthina globosa Swains.

Zool. Ill. vol. 2. Tab. 85.

Sinus Jedoënsis.

Conf. Lischke locis laudatis.

## Siphonariacea.

### Genus Siphonaria Blainville.

#### Siphonaria atra Quoy et Gaim.

Voy. de l'Astr. Zool. vol. 2. pag. 337. Tab. 25. fig. 41. 42. Reeve Conch. icon. Siphonaria Tab. 3. sp. 14. = Siph. Coreënsis Ad. et Reeve Voy. Samar. Moll. pag. 69. Tab. 13. fig. 2. Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 105.

Tria Specimina exstant prope Tokio lecta.

Haec species sculptura satis constans, sed colore picturaque variabilis est.

Dunker, Moll. Jap. mar.

**Siphonaria cochleariformis Reeve.**

Conch. icon. Siphonaria Tab. 6. fig. 28. Dkr. Moll. Jap. pag. 18. Lischke l. l. pag. 106.

Portus De-shimae.

Praeterea clar. de Schrenck Siphonariam siphonem Sow. ut cochleam Japonicam prope Hakodate lectam enumeravit (Amurl. vol. 2. pag. 306). Cum vero Siphonarias exiguam Sow. acutam, albicantem, punctatam, Selandicam et plicatam Q. et G. pro varietatibus cum illa specie conjunxerit et insuper specimina mihi desint ut comparentur, dijudicare nequeo num haec conjunctio sit recta.

**Conchifera. Pholadea.**

**Genus Barnea Risso.**

*Barnea fragilis* Sow. (Pholas).

Thes. Conch. vol. 2. pag. 488. fig. 92. 93.

Specimen integrum 63 mill. longum prope Nagasaki lectum exstat.

**Genus Zirphaea Leach.**

*Zirphaea crispata* Lin. (Pholas).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 670. Forbes et Hanley Hist. of Brit. Moll. vol. 1. pag. 114. etc. Cfr. Schrenck Amurl. Moll. pag. 595.

Haec species omnibus nota praesertim in aquis septentrionalibus obvia etiam in mari Japonico inventa est ex. gr. in litore insulae Sachalien.

**Genus Jouannetia Desmoulins.**

*Jouannetia Cumingii* Sow. jun. (Triumphalia).

Proc. Zool. Soc. 1849. pag. 161. Tab. 5. fig. 3. 3 a. G. B. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 502. Tab. 106. figg. 56. 57.

Testa globosa crassiuscula valvis inaequalibus canaliculatis, striis concentricis antice minutim serratis, postice in lamellas confertas transeuntibus instructa, valva dextera appendicula calcarea triplicata obtuse lingulata margine laminata insignis, valva vero sinistra appendicula prorsus carens, linea rotundata terminata.

Clar. Desmoulins primus hoc Pholadeorum genus mirabile in speciem fossilem, Pholadem semicaudatam (Bullet. d'hist. nat. de la Soc. Linn. de Bord.) jam anno 1828 fundavit. Posterius G. B. Sowerby Triumphaliam creavit Pholadem globosam Quoy et Gaim. pro specie typica respiciens (On a new genus of Pholadidae in Proc. of the Zool. Soc. of Lond. 1849. pag. 160). Denique eodem anno Conrad in Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 4. pag. 156, huic generi nomen „Pholadopsis“ proposuit.

Beatus Cuming nostram speciem Corallia perforantem in Philippinarum insula Zebu invenit. Tria specimina Japonica adsunt.

### Genus *Parapholas* Conrad.

#### *Parapholas penita* Conrad. (*Pholas*).

Journ. of the Acad. of Nat. Sc. of Philad. pag. 237. Tab. 18. fig. 7. = *Pholas concamerata* Desh.  
Rev. Zool. 1839. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 497. Tab. 106. fig. 67. 68. *Parapholas penita* P.  
P. Carpenter Proc. Zool. Soc. 1856. pag. 210.

Prope Tokio lecta est in lapide tofoso griseo insidens. (Sta Barbara California.)

#### *Parapholas piriformis* Dkr.

Tab. nostra 14. fig. 7.

Testa ventriosa piriformis postice hians, sulcis duobus tripartita; pars antica maxima linea transversa sinuata bipartita, superne minutim denseque undato-striata, inferne paene glabra; pars postica convexa, attenuata pariter striata; dorsum conchae scutis calcareis quaternis, duobus anticis posticis multo brevioribus obtectum; epidermis cornea, a primo sulco incipiens, ultra marginem posticum extensa.

Duo specimina congruentia exstant, alterum maius 35 mill. longum.

Hanc speciem nullibi descriptam inveni.

Primo obtutu *Pholadem* quadrizonalem *Spengleri* in memoriam vocat, sed accuratius inspecta notis certis facile distingui potest.

### Genus *Martesia* Leach.

#### *Martesia striata* Lin. (*Pholas*).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 669. = *Pholas pusilla* ibid. pag. 670. Synonyma bene exposuit G. B. Sowerby in Thes. Conch. vol. 2. pag. 494; pariter S. Hanley Ill. and enl. edit. of Lam. spec. of Shells pag. 7.

Specimina tria minora exstant.

Species in Mari Germanico, Mediterraneo, in Antillis insulis, in litore Americae centralis, in Philippinis insulis aliisque regionibus late dispersa, plerumque ligna fluctuantia, sed alia quoque corpora perforat. Naufragio facto anno 1844 multa cerae fragmenta in mari natantia prope Habanam lecta sunt hac specie penitus repleta.

### Gastrochaenacea.

#### Genus *Gastrochaena* Spengler.

#### *Gastrochaena grandis* Desh. (*Chaena*).

Tab. nostra 14. fig. 10. 11.

Proc. Zool. Soc. 1854. pag. 330.

Unicum specimen Japonicum adest.

H. Cuming hanc speciem, maximam sui generis ex Philippinarum insula Zebu quondam reportavit; pariter in litore Californiae invenitur.

Clar. Deshayes l. c. viginti *Gastrochaenarum* species ad collectionem Cumingianam insignem pertinentes descripsit, sed icones et indicium magnitudinis earum desiderantur, ita ut hae conchulae

ex parte inter se simillimae ex his solis descriptionibus cum aliqua certitudine determinari nequeant.

### Genus *Clavagella* Lam.

#### *Clavagella ramosa* Dkr.

Tab. nostra 16. fig. 1. testa a dorso visa valvam irregularem externam cum tubo coalitam ante oculos ponens; fig. 2. latus oppositum oblique collocatum, ita ut fissura profunda disci ramulique cavi perspici possint.

Testa fistulata vel tubuliformis recta, alba, opaca, tenuis, ramulis laevibus cavis irregulariter dichotomis coronata; ramuli nonnulli laminis tenuibus parietes transversos formantibus instructi. Discus minimus fissura mediana profunda divisus. Valva interna libera, in nostro specimine manca, valvae *Clavagellae coronatae* Desh. aliquo modo respondere videtur, valva altera cum fistula coalita irregularis.

Concha mirabilis inter species hucusque notas *Clavagellae coronatae* Desh. e stratis telluris tertiariae fossili proxima est, sed fissurae formatione nec non vaginis foliaceis carentibus differt.

Apud Japanos „Hama Kōorhama mo-men“ appellatur.

*Clavagellae* quae corallia vel rupes penetrare solent, plerumque a sede sua removeri nequeunt nisi diffractae, sed nostra species locis arenosis vivit ut arenula cum granis augitae et particulis micae commixta, quibus fistula hic illic obducta est, satis docet. Similem ergo vitae degendae rationem sequitur ac *Aspergilla*, quibuscum *Clavagellae* cognatae sunt.

### Genus *Aspergillum* Lam.

#### *Aspergillum vaginiferum* Lam.

Anim. sans vert. vol. 6. pag. 21.

Inter Mollusca Japonica fragmentum huius speciei giganteum exstat vaginis tribus foliaceis instructum. Apertura ovata subcompressa in eo 48 mill. longa est. Clarissimo Loebbecke affirmante in Museo Amstelodamensi specimen asservatur brachii longitudine.

Haec species e mari rubro satis nota est.

## Solenacea.

### Genus *Solen* Lin.

#### *Solen grandis* Dkr.

Proc. Zool. Soc. 1861. pag. 418. Nov. Conch. pag. 71. Tab. 24. fig. 5. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 141.

*Philippinae insulae* Dkr. Nagasaki Lischke.

#### *Solen linearis* Chemnitz.

Conch. Cab. vol. 11. pag. 198. fig. 1931. 1932. Wood. Ind. Test. pag. 12. Tab. 3. fig. 5.

Specimina tria exstant nondum adulta. Haec concha singularis pariter in insulis Philippinis et Nicobaricis obvenit.

**Solen corneus Lam.**

Anim. sans vert. vol. 6. pag. 54. Delessert Rec. Tab. 2. fig. 2. Phil. Abb. vol. 3. pag. 44. Solen Tab. 2. fig. 2.

Specimina nostra Japonica cum iconibus supra citatis plane conveniunt. Solen corneus est species late dispersa, quae in insulis Philippinis, Java, mari rubro aliisque in terris obvenit.

Clar. de Schrenck Solenem strictum Gould (Proc. Bost. Nat. Hist. vol. 8. pag. 26. Otia Conch. pag. 165) huc referendum esse arbitratus est. De hac specie certe dijudicare nequeo.

**Solen Gouldii Conrad.**

Tab. nostra 16. fig. 11.

Amer. Journ. of Conch. vol. 3. App. pag. 28 = Solen gracilis Gould non Phil. Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 123.

Nagasaki, Hakodate Gould.

Haec species insignis, quantum scio, nondum depicta est, quam ob rem iconem hic offero a specimine integerrimo maris Chinensis desumptam.

Quamvis descriptio Gouldiana a Lischkeo repetita, partibus omnibus non plane respondeat huic specimini, tamen determinationem rectam habeo. Quod attinet ad extremitatem anticam acutam oblique truncatam Solenem Timorensem Dkr. (Nov. Conch. pag. 9. Tab. 3. fig. 2.) in mentem vocat, sed species de qua hic est sermo, sulculo quamvis angustissimo tamen perspicue expresso insignitur. Ceterae proprietates conchae ex icone nostra satis elucent.

**Praeterea**

**Solen sicarius Gould.**

Proc. Bost. Nat. Hist. vol. 3. pag. 214. Un. St. Exp. 1. 1. Exp. pag. 387. Tab. 33. fig. 501.

litoris Americae borealis, etiam in mari Japonico obvenire dicitur. Formatione cardinis et toto testae habitu haec species ad genus quod sequitur pertinet.

**Genus Ensis Schum.**

**Ensis Krusensternii Schrenck (Solen).**

Reisen und Forschungen im Amurlande vol. 2. Zool. pag. 594. Tab. 25. fig. 9—12.

Insula Sachalien et sinus prope Hakodate (Schrenck).

Haec species admodum variabilis est, ut e descriptione et iconibus supra citatis elucet. Specimen unicum in nostra Molluscorum Japonicorum collectione exstat, certa quidem indicatione loci natalis carens.

**Genus Cultellus Schum.**

**Cultellus attenuatus Dkr.**

Proc. Zool. Soc. 1861. pag. 422. Nov. Conch. pag. 72. Tab. 24. fig. 4.

Duo specimina Japonica exstant majus et minus. Pariter ad Philippinas insulas invenitur.

**Genus Ensiculus H. Adams.**

**Ensiculus cultellus Lin. (Solen.)**

Mus. Lud. Ulr. pag. 474. Syst. Nat. ed. 12. pag. 1114. Rumph. Mus. Tab. 45. fig. F. Chemn. Conch. Cab. vol. 6. pag. 52. fig. 36. 37. Lam. anim. sans vert. vol. 6. pag. 56. Ensiculus cultellus H. Adams. Proc. Zool. Soc. 1860. pag. 369.

Tria specimina juniora lecta sunt. In insulis Amboinis et Philippinis haud rarus invenitur, semper in litore arenoso, ut omnes Solenaceorum species.

**Ensiculus marmoratus Dkr. (Cultellus).**

Tab. nostra 7. fig. 24.

Proc. Zool. Soc. 1861. pag. 423. „Testa ovato-oblonga, subarcuata, utrinque rotundata, fragilis, nitida, tenuissime striata, albida, subpellucida, colore sublivido marmorata, epidermide tenerrima diaphana vestita.“

Forma paene eadem atque in Ensiculo (Cultello) livido Dkr. (l. c. pag. 423) sed minor. Philippinae insulae (H. Cuming). Specimen depictum e mari Japonico originem ducit.

**Ensiculus Philippianus Dkr. (Cultellus).**

Tab. nostra 7. fig. 23.

Ztschr. für Malak. vol. 24. pag. 68.

Testa ovato-oblonga, subarcuata, antice rotundata et paulo erecta, postice producta attenuata, concentrice obsoleteque striata paene glabra, nitida, fragilis, albida maculis irregularibus fuscis aspersa et marmorata, epidermide tenuissima nitida vitrea obducta. Cardo valvae sinistrae tridentatus, dentes mediani vel primarii bini lamellae anticae affixi, dens posticus longus bifidus, dens alterius valvae medianus erectus cum lamella postica coalitus; impressio musculi antici ovato-oblonga opaca cum linea pallii angulo acuto conjuncta, impressio postica irregularis. — Specimen quod exstat maximum jam antea acceptum 52 mill. longum est, specimina reliqua multo minora sunt.

Haec species a Solene cultello Linnaei testa minore tenuiore postice attenuata differt. Dedicata est amicissimo Amando Philippi.

Ensiculi genus Solenum formant bene terminatum Cultellis proximum. Omnes quae innoverunt species pictura marmorata vel aspersa, cardinis structura umbonumque situ statim dignoscuntur.

**Genus Aulus Oken.**

**Aulus costatus Say (Solen).**

Journ. of the Acad. of Nat. Sc. of Phil. vol. 2. pag. 315. Schrenck Nordjap. Moll. pag. 590.

Schrenckio teste haec species in litore insulae Sachalien, prope Hakodate aliisque maris pacifici regionibus septentrionalibus obvenit.

**Aulus pulchellus Dkr.**

Ztschr. f. Malak. 1852. pag. 58. Nov. Conch. pag. 20. Tab. 6. fig. 4. 5.

Hanc conchulam concinnam et peculiarem in mari Japonico vulgatissimam clar. de Schrenck (Reisen und Forschungen im Amurlande vol. 2. Zool. pag. 590.) pro Aulo (Solene) costato juniore declaravit, quod comprehendere non possum, cum utraque species plurimum differat.

Plura specimina adsunt, maximum 37 mill. longum.



**Aulus sodalis Gould (Machaera).**

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 8. 1861. Otia Conch. pag. 165.

qui ad Hakodate reperitur, mihi ignotus est. Conferantur quae de hac specie et de Aulo pulchello Clar. Lischke protulit. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 124.

**Aulus minimus Gmel. (Solen).**

Syst. Nat. 13. pag. 3227. Chemn. Conch. Cab. vol. 6. pag. 43. Tab. 5. fig. 31 a. b. „Minutissima leguminum, testa alba, diaphana, soleniformi, fragilissima, utrinque hians et rotundata, intus costa transversali a cardine ad marginem decurrente.“

Mare Japonicum.

Sine dubio Solen albidus Adams et Reeve ex Archipelago Coreano huc pertinet. Cfr. Voy. Samarang Moll. pag. 84. Tab. 23. fig. 15.

**Genus Macha Oken.**

**Macha divaricata Lischke.**

Tab. nostra 7. fig. 26.

Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 142. Tab. 10. fig. 1. 2.

Specimina juniora et adulta exstant sculptura exquisita perspicua insignia, quae strias subimbricatas postice coarctatas et crassiores in costas rugosas divaricatas transeuntes optime exhibent.

Cum icones supra citatae respectu habito rugarum divergentium non satis respondeant naturae, haec concha iterum delineata est.

**Genus Siliquaria Schumacher.**

**Siliquaria constricta Lam. (Solen).**

Tab. nostra 7. fig. 25.

Anim. sans vert. vol. 6. pag. 59. Wood Ind. Test. pars. 1. pag. 14.

Specimina adulta et juvenilia adsunt Japonica cum Chinensibus plane convenientia.

Testa alba, tenuis, oblonga, subrecta, laeviuscula obsoleteque striata, antice et postice rotundata, canali plano ab umbonibus ad marginem ventris oblique decurrente constricta vel coarctata. Epidermis cornea tenuis et membranacea in extremitatibus testae sublamellosa, margines conchae excedens.

Haec species ad Novaculinas Bensoni Siliquariarum sectionem pertinet, quae in aquis semisalsis vivere solent. Exemplaria collectionis meae Sinensia minora sunt.

Solen constrictus Chemn. vel coarctatus Gmel. Macharum generi inserendus est.

**Saxicavacea.**

**Genus Saxicava Fleuriau de Bellevue\*).**

**Saxicava arctica Lin. (Mya).**

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1113. Myt. rugosus Lin. ibid. pag. 1156. Solen minutus Lin. etc.

Plura specimina Japonica exstant. Hanc concham admodum variabilem, in omnibus paene aquis salsis obviam clar. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 134 uberrime tractavit.

\*) De synonymis huius generis cfr. H. et A. Adams gen. of rec. Moll. vol. 2. pag. 349.

**Genus Panopaea Ménard de la Groye.**

**Panopaea Japonica A. Adams (Glycymeris).**

Proc. Zool. Soc. 1849. pag. 170. Moll. Tab. 6. fig. 5.

Testa subelliptica valde inaequilatera, concentrice plicata, tota alba, subpellucens, tenuis ac fragilis, utrinque inaequaliter hians; umbones tumidi porrecti; plicae subdistantes undatae. Cardo tenuissimus universe spectatus Panopaeis respondet, pariter pallii linea postice sinu profundo signata. Nihilo tamen minus negari nequit hanc concham ab indole et forma Panopaeorum usitata satis abhorrere.

Specimen minus adest. Ad Jedo et Hakodate invenitur. Gould hanc conchulam apte Panopaeam fragilem nominavit. cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 104.

**Panopaea generosa Gould.**

Otia conch. pag. 165. Expl. Exped. fig. 507 a. b.

Mare Japonicum septentrionale.

Pariter fossilis invenitur prope Tokio. Cfr. Brauns Geology of the environs of Tokio pag. 36.

**Myacea.**

**Genus Mya Lin.**

**Mya arenaria Lin.**

Syst. Nat. ed. 10. pag. 670. ed. 12. pag. 1112. Chemn. Conch. Cab. vol. 6. pag. 3. (ornam.) et Tab. 1. fig. 3. 4. Mya Japonica Jay Rep. on the shells coll. by the Jap. Exp. under the comm. of Perry pag. 292. Tab. 1. fig. 7. 10.

Specimina huius conchae Japonica iis multo minora esse solent, quae frequentissima in mari Germanico obveniunt, ceterum nulla ratione differunt. Chemnitzius vir bonus more suo simplici hanc speciem optime tractavit.

**Mya truncata Lin.**

Syst. Nat. ed. 10. pag. 670. ed. 12. pag. 1112.

Haec species pariter in mari Japonico invenitur. De distributione utriusque speciei geographica cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 138.

**Corbulacea.**

**Genus Corbula Bruguière.**

**Corbula erythron Lamarek.**

Anim. sans vert. vol. 6. pag. 138. Reeve Conch. icon. Corbula spec. 4.

Jedo, Nagasaki, Jokohama.

Specimen integrum et valvae singulae exstant.

Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 186.

*Corbula pallida* Hinds.

Proc. Zool. Soc. 1843. Reeve Conch. icon. *Corbula* spec. 4.

Antecedenti simillima, sed minor. Singula valva exstat fortasse huc pertinens.

*Corbula bifrons* A. Adams.

Ann. Mag. Nat. Hist. 1860. pag. 412.

Seto-Uchi, Goto, Mino-shima. Fretum Coreanum.

„Testa tumida, ovata, valva sinistra inaequilateralis, antice rotundata, postice subangulata, in margine ventris undulata; valva dextera magna, alba, convexa, liris concentricis confertis irregularibus saepe dichotomis instructa; valva sinistra tenuiter striata sublaevis, lineis elevatis radiantibus rufis circiter 10 ornata.“ Ratio dimensionis desideratur.

Praeterea cl. Adams annotat valvas conchae forma, sculptura-atque colore tam diversas esse, ut, nisi inveniantur adhaerentes, facile pro diversis speciebus haberi possint.

*Corbula venusta* Gould.

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 8. pag. 25. v. Schrenck Reisen im Amurlande pag. 583. Tab. 25. fig. 1—4.

Hakodate. Fortasse cum *Azaris* jungenda est.

*Corbula cuneata* Hinds.

Moll. Voy. Sulph. Tab. 20. fig. 6. A. Adams Ann. Mag. Nat. Hist. 1868. pag. 365.

Mososeki, Kuro-shima.

Hae tres species mihi incognitae sunt.

**Genus Azara d'Orbigny.**

*Azara Amurensis* Schrenck (*Corbula*).

Reisen im Amurlande pag. 534. Tab. 25. fig. 5—8.

Mare Japonicum septentrionale, praesertim fretum de Castries et aquae semisalsae fluminis Amur.

*Azara labiata* Maton (*Mya*).

Trans. Lin. Soc. pag. 326. *Potamomya labiata* Hinds.

Duo specimina Japonica exstant cum icone Reeveana (Conch. icon. *Corbula* spec. 28) a specimine ex insula Singapore desumta, plane convenientia. Clar. d'Orbigny affirmante haec concha pro loci natalis indole maximopere variat, qua de causa *Azaram* vel *Potamomyam* nimbosam Sowerbyi nec non ochreatam Hindsii cum ea jungendas esse putat. Sed mea opinione hae conchae separari debent, cum toto habitu nimis differant. Praeterea *Azara* nimbosea strigis nigricantibus angulatis insignita est. Non longe absum quin credam, *Azaram* nimbosam, quae in aquis nonnullis Brasiliae semisalsis haud raro obvenit, ex. gr. in ostiis fluminis La Plata, a clar. d'Orbigny cum nostra specie confusam esse.

Dunker, Moll. Jap. mar.

**Genus *Cryptomya* Conrad.**

*Cryptomya elliptica* A. Adams (Sphenia).

Tab. nostra 7. fig. 17. valva sinistra magn. naturali, fig. 18. magn. aucta, fig. 19. eadem valva a latere interno spectata.

Testa transversa subaequilatera paene elliptica, antice rotundata, postice oblique paululum truncata, alba, tenuis, concentrice striata, antice laevigata, postice costulis radiantibus notata; epidermis tenuissima, pallide flava pellucida; impressio pallii irregularis margini ventris subparallela; dens carinis antice fissus. — Long. 12, altit. circiter 8 mill.

Mososeki; etiam prope Sydney teste clar. Strange.

Cfr. Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 88. Ann. and Mag. Nat. Hist. Nov. 1868. pag. 366.

*Cryptomya truncata* Gould. Otia Conch. pag. 163.

*Cryptomya Mindoroënsis* Ad. et Rve. (Mya).

Voy. Sam. Moll. pag. 82. Tab. 23. fig. 13. Adams in Ann. and Mag. Nov. 1868. pag. 366.

Akasi et Mare Mindoroëse.

Inter Mollusca nostra Japonica haec species desideratur.

*Cryptomya decurtata* A. Adams (Sphenia).

Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 88. Ann. and Mag. Nov. 1868. pag. 366.

Kuro-shima.

Pariter deest.

**Genus *Eucharis* Récluz.**

*Eucharis Gouldii* A. Adams.

Tab. nostra 9. fig. 7. 8. valvae dextera et sinistra fig. 10. 11. eadem a latere interno visae, fig. 9. valva dextera magnitudine aucta delineata.

Testa ovato-subtrigona, convexa, concentrice rugoso-striata, antice subgranosa, alba, opaca; umbones tumidi antrorsum valde inclinati, carina obtusa ad latus posticum decurrente insigniti; cardo valvae dexterae dente unico crasso cum fovea ligamenti adjacente instructus, dentes valvae sinistrae duo, posticus foveolatus. — Long. 9 mill.

Seto-Uchi, Yobuko, Mososeki.

Cfr. Ann. Mag. Apr. 1864. pag. 309. Nov. 1868. pag. 366.

Singulae tantum valvae exstant.

*Eucharis Stimpsoni* A. Adams.

Ann. and Mag. Apr. 1864. pag. 310. Nov. 1868. pag. 366.

Testa ovata vel subelliptica, interdum postice subangulata, modice convexa, alba, opaca, concentrice rugoso-striata granulisque confertis hispida; umbones parvi, porrecti, submediani. — Long. 12—14, altit. 10 mill.

Singulae tantum valvae exstant ambitu variabiles.

*Eucharis Recluzi* A. Adams.

Ann. Mag. Apr. 1864. pag. 309. ibid. Nov. 1868. pag. 366.

Yobuko.

Species compressa subquadrato-ovata, postice dilatata et rotundata.

**Anatinacea.**

**Genus Anatina Lam.**

*Anatina Japonica* Lischke.

Malak. Bl. vol. 19. pag. 107. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 101. Tab. 9. fig. 7—10.

Sinus Jedoënsis Lischke.

Plura specimina huius conchulae ob tenuitatem testae admodum fragilis iterum atque saepius ex Japonia allata sunt omnibus partibus iis respondentia, quae loco citato exacte jam tractavit auctor.

Praeterea Reeveus alteram Anatinarum speciem in Conch. icon. fig. 5 nomine *Anatinae flexuosae* descripsit, quae pariter in Oceano Japonico obvenire dicitur.

**Genus Lyonsia Turton.**

*Lyonsia navicula* A. Adams et Reeve.

Zool. of the Voy. Sam. Moll. pag. 83. Tab. 23. fig. 11. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 103.

Litus insulae Kiusiu.

*Lyonsia saxicola* Baird, quam clar. Lord primus in insula Vancouver detexit (Proc. Zool. Soc. 1863. pag. 70) pariter in mari Japonico obvenire dicitur, sed Adamsius eam pro varietate tantum *Lyonsiae naviculae* habet, quam quidem sententiam Baird von approbat. Ego de hac re certe judicare nequeo, cum exemplaria Americana desint.

*Lyonsia Norvegica* Chemn. (Mya).

Conch. Cab. vol. 10. pag. 345, Tab. 170. fig. 1647, 1648. *Lyonsia Norvegica* Forbes and Hanley Brit. Moll. H. et A. Adams Rec. Moll. vol. 2. pag. 362. Tab. 96. fig. 3. Middendorff Reise pag. 264. Tab. 24. fig. 8—11.

Sinus Schantaricus.

*Lyonsia rostrata* Lischke.

Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 102. Tab. 9. fig. 13.

Litus Japoniae meridionale.

*Lyonsia ventricosa* Gould.

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 8. pag. 23.

Hakodate.

E descriptione Gouldiana elucere mihi videtur hanc speciem *Lyonsiae rostratae* quidem affinem, sed diversam, esse.

**Lyonsia praetenuis Dkr.**

Tab. nostra 7, fig. 13.

Testa longe ovata, convexa, inaequilatera, antice rotundata tumida, postice producta oblique truncata, compressa, praetenuis, fragilissima, albida, pellucens, costulis aequalibus ab umbonibus tumidis usque ad marginem ventris radiantibus instructa; epidermide vitrea nitida supra marginem prominula vestita; margo dorsi posticus rectus declivis, margo ventris postice subsinuatus. — Long. testae 22 mill. Long. alt. et crass. ratio circiter numeris 100, 62, 40 respondet.

Duo specimina integerrima prope Wakayama in mari Japoniae mediterraneo lecta exstant.

Haec conchula antecedenti et rostratae certe admodum affinis est, sed ambitu alieno, umbonum situ et formatione ab utraque specie satis differre mihi videtur.

**Genus Neaera Gray.**

Specierum huius generis in Japonia repertarum hae nominantur:

**Neaera elegans Hinds.**

Proc. Zool. Soc. 1843. pag. 76. Neaera Moluccana Ad. et Rve. Voy. Sam. Moll. pag. 84. Tab. 23, fig. 4. A. Adams Ann. Mag. Nov. 1868. pag. 366.

Mino-shima (insulae Moluccenses).

**Neaera nobilis A. Ad.**

Ann. Mag. Nat. Hist. 1864. m. Mart. pag. 207. ibid 1868 pag. 366.

Mino-shima.

**Neaera Hindsiana A. Ad.**

ibid. 1864 pag. 207. 1868. pag. 366.

Goto.

**Neaera nasuta A. Ad.**

ibid.

Satanomosaki.

**Neaera (Rhinomya) Philippinensis Hinds.**

Proc. Zool. Soc. 1843. Ann. Mag. N. H. 1864. pag. 207. 1868. pag. 367.

Uraga, Kino-o-shima.

**Neaera (Rhinomya) rugata A. Ad.**

Ann. Mag. N. H. 1864. pag. 207. Nov. 1868. pag. 367.

Tabu-shima.

**Neaera (Cardiomya) Gouldina Hinds.**

Proc. Zool. Soc. 1843. pag. 77. Ann. Mag. Nov. 1868. pag. 367.

Uraga, Goto, Tsu-shima.

In subgenere Cardiomya A. Ad. testa inaequalis, radiatim striata est, valva dextera dente laterali postico prominente excellit. — His adjicienda est

**Neaera nitida** Ad. et Rve. (Poromya).

Voy. Samar. Moll. pag. 83. Tab. 23. fig. 3.

Specimen integerrimum Japonicum icone laudata paululum majus adest.

Litus Borneense Adams et Reeve.

**Genus Leiomya** A. Adams.

**Leiomya adunca** Gould (Neaera).

Neaera adunca Otia Conch. pag. 162. Ann. Mag. N. H. m. Mart. 1864. pag. 208.

Seto-Uchi, Hakodate.

**Genus Theora** H. et A. Adams.

**Theora lubrica** Gould.

Tab. nostra 7. fig. 20. 21. fig. 22. magn. aucta.

Gould. Otia conch. A. Adams l. c. pag. 209.

Testa ovata, postice attenuata et paulum hians, compressiuscula, tenerima, nitidissima, hyalina, sublactea; umbones exigui perparum prominentes; latus internum lamina vel costa parva ab umbonibus ad anticam valvarum partem decurrente insigni. Cardinis structura ut in genere solet. — Long. 10 mill. Long. altit. et crass. ratio numeris 100, 60, 35 respondet.

Plura specimina congruentia adsunt.

Hakodate A. Adams.

Haec species Theorae nitidae Gouldii e portu Jacksoniano (Otia conch. pag. 162. et Angas on Australian Mollusca in Proc. Zool. Soc. 1867 pag. 914) similis esse videtur, quae vero laminula interna caret.

Quantum scio quinque tantummodo species hucusque innotuerunt. Ut Japonicas Adamsius enumeravit

**Theoram iridescentem** Hinds (Neaeram).

Proc. Zool. Soc. 1843. pag. 78.

**Theoram fragilem** A. Adams (Neaeram).

Proc. Zool. Soc. 1855. pag. 226.

**Theoram nitidam** Gould.

Otia conch. pag. 162. Cfr. A. Adams Ann. Mag. Nat. Hist. 1864. pag. 209.

At vero Adamsius speciem de qua hic est sermo pro typo subgeneris sic dicti habet, quod Endopleuram nominavit ob costulam internam ab umbonibus utriusque valvae ad latus anterius oblique extensam.

**Genus Myodora** Gray.

**Myodora triangularis** A. Adams.

Tab. nostra 7. fig. 11. 12.

Testa triangularis, solidula, plano-convexa, alba, costis concentricis crassis subundatis paene aequalibus cincta, utrinque laevis et rectangula, umbonibus acutis submedianis antrorsum inclinatis

instructa; margo ventris aequaliter curvatus; margo dorsi postice perparum fornicatus, antice sub-sinuatus; valva sinistra dextera paululum convexior; latus internum submargaritaceum. Cardinis structura Myodoris respondet: valva sinistra utrinque fossula instructa est, ut lamellam valvae oppositae recipiat. Valvulae 10 mill. longae, vix 8 altae sunt.

Hanc speciem concinnam clar. Adams nomine Myodora triangularis quondam misit, sed nullibi eam descriptam vel depictam inveni. Myodora trigona Reeve Conch. icon. vol. 2. spec. 2. certe simillima est, quae vero statura minore et margine antico truncato differt.

## Mactracea.

### Genus Trigonella Da Costa.

#### Trigonella sulcataria Desh. (Mactra).

Proc. Zool. Soc. 1853. pag. 15. Reeve Conch. icon. Mactra spec. 5.

Plura specimina a clar. J. Rein et E. Satow ad Tokio collecta exstant, 74—78 mill. longa. Plerumque multo minor concha invenitur.

Testa turgidula, cinereo-flava, saepius ut in Mactraceis solet, strigis radiantibus pallide fuscis picta est. Umbones depressiusculi laeves interdum violacei, albo radiati, plerumque vero pallide fuscis vel fusco-violacei. Epidermis flavide cornea, tenuis, sed firma. Descriptio Deshayesii a specimine collectionis Cumingianae unico sine indicatione patriae desumpta, in Conchyliologia iconica repetita est.

Haec concha in Mari Japonico satis frequens, ab incolis consumitur et „assari“ nominatur.

#### Trigonella ornata Gray (Mactra).

Ann. and Mag. Nat. Hist. 1837. pag. 371. Reeve Conch. icon. Mactra spec. 58.

Specimen unicum adest pictura languida.

Concha maris Chinensis frequens.

#### Trigonella spectabilis Lischke (Mactra).

Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 120. Tab. 11. fig. 1. 2.

Specimen minus exstat, sed icon citata exemplar maximum repraesentat 114 mill. longum.

#### Trigonella veneriformis Desh. (Mactra).

Proc. Zool. Soc. 1853. pag. 15. Reeve Conch. icon. Mactra spec. 2.

Specimina plura exstant prope Jedo lecta ab icone Reeveana decedentia, sed melius convenientia cum descriptione Deshayesiana. Praeterea jam antea clar. Lischke specimen mecum communicavit postice magis attenuatum ex parte zonis fuscis pictum. Specimina collectionis meae et colore et ambitu variant; plerumque cinerea sunt umbonibus violaceis vel fuscis. Specimina quoque inveniuntur prorsus alba, modo sunt ovato-globosa, subquadrangula, modo subtrigona.

Exemplaribus multis huius conchae tam colore, quam forma variabilis diligenter et accurate comparatis, nunc opinione ducor Mactram quadrangularem Deshayesii ad Mactram veneriformem pertinere, cum certis limitibus ab ea separari nequeat. Utraque concha formas refert



extremas unius ejusdemque speciei. Nuperrime specimina misit clar. E. Satow. In urbe Tokio ad mercatum venit, nam cibus suavis esse dicitur.

*Trigonella lurida* Phil. (Mactra).

Abbild. und Besch. vol. 3. pag. 136. Tab. 3. fig. 3.

Insulae Lieu-Kien.

*Trigonella Crossei* Dkr.

Tab. nostra 7. fig. 1. 2. 3. 4. varr.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 74.

Testa ovato-trigona, compressiuscula, inaequilatera, concentrice tenerrimeque striata, marginem versus ventris sulcata, fusco cinereo-vel violacea vel albida, rarius striga lata fusca ab umbonibus ad latus posticum decurrente signata; umbones nitidissimi atro-violacei vel purpurascens; lunula areaque lanceolatae, distincte non terminatae, concinne sulcatae; sinus pallii breviculus non plane perspicuus; color internus plerumque violaceo-fuscus.

Concha parva ad summum 24 mill. longa, tenuicula nitida, compressiuscula, antice brevis subtruncata, postice producta subcarinata, aliquo modo Latonas in mentem revocat.

Decem specimina a clar. J. Rein prope Tokio lecta sunt colore quidem variantia, ceteroquin vero congruentia.

Nulla mihi nota est species comparabilis.

Hanc conchulam concinnam in honorem clar. H. Crosse nominavi, viri de scientia Molluscorum optime meriti.

*Trigonella Bonneau Bernardi* (Mactra).

Journ. de Conch. 1858. pag. 92. Tab. 2. fig. 2.

Fretum Tataricum.

Species singularis subrotunda inflata.

*Trigonella straminea* Dkr.

Tab. nostra 7. fig. 5. 6.

Testa ovato-rotundata, utrinque subcarinata tenuicula, modice convexa, striis incrementi concentricis tenuissimis, nonnullis fortioribus, instructa, epidermide straminea vel lutescente sericea induta; umbones prominuli mediani antrorsum inclinati; sinus pallii conspicuus mediam testam non attingens; color sub epidermide albus, interne subroseus.

Haec species costulis tenuibus vel carinis obsoletis ab umbonibus utrinque decurrentibus insignis, antecedenti cognata est, sed valvis plano-convexis, haud inflatis, ambitu alieno nec non sinu pallii multo profundiore differt.

Unum tantum specimen in mari Japonico lectum exstat, sed sine indicatione certa loci natalis.

*Trigonella Sachalinensis* Schrenck (Mactra).

Mollusken des Amurlandes pag. 575. Tab. 23. fig. 3—7. Mactra Lühdorfii Dkr. Nov. Conch. pag. 60.

Tab. 20. fig. a. b. c. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 132.

Hakodate, insula Sachalein etc.

### Genus *Spisula* Gray.

*Spisula Grayana* Schrenck (*Macra*).

Reisen im Amurlande vol. 2. Moll. pag. 572. = *Macra ponderosa* Phil. Abbild. und Beschr. vol. 1. pag. 165. Tab. 1. fig. 1. (icon optima).

Mare Japoniae septentrionalis.

Conferatur Schrenck l. c., ubi haec species uberius tractata est adjunctis suis synonymis.

### Lutrariacea.

#### Genus *Tresus* Gray.

*Tresus Nuttalli* Conrad (*Lutraria*).

Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. vol. 7. 1837. pag. 235. Tab. 18. fig. 1.

Huius speciei pergrandis et late dispersae unum specimen exstat cum icone Middendorffii (Beitr. zu einer Malacoz. Rossica vol. 3. pag. 66. Tab. 19. fig. 1—4) satis congruens. Clar. Reeve hanc concham spectabilem bis descripsit et delineavit primo denominatione *Macrae maximae* (Conch. icon. vol. 8. spec. 4), iterumque pro *Lutraria maxima* Middendorffii (ibid. *Lutraria* spec. 18). Ex his iconibus a speciminibus giganteis desumptis elucet hanc speciem habitu et extremis lineis admodum variabilem esse.

Clar. Gray hanc testam singularem pro genere separato habet (H. et A. Adams Gen. of rec. Moll. vol. 2. pag. 381) et ego consentio; sed vocabulam „*Tresus*“ nullo modo derivari potest.

Ceterum conferantur, quae de hac specie optime jam exposuit Lischke (Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 136).

#### Genus *Merope* H. et A. Adams.

*Merope Aegyptiaca* Chemn. (*Macra*).

Conch. Cab. vol. 11. pag. 218. fig. 1955. 1956. Reeve Conch. icon. *Macra* spec. 112.

Plures valvae ex Japonia allatae sunt. Specimina nonnulla ex insulis Java et Nicobar accepi.

Testa ovato-oblonga, valde inaequilatera, antice tumidula rotundata, postice producta paululum compressa, tenuis, lactea, subpellucens, concentrice obsoleteque rugosa, costulis radiantibus confertis inaequalibus et subacutis instructa; area antica laevis, postica strigillis divaricatis sub vitro tantum conspicuis signata; latus internum leviter sulcatum; margo crenatus; sinus pallii permagnus profundus linguaeformis; epidermis tenuis pallide cornea decidua.

Specimina majora 44 mill. longa sunt. Reeveus more suo exemplar giganteum depinxit.

*Macra rugosa* Indiae orientalis Chemnitzii (Conch. Cab. vol. 6. pag. 238. fig. 237) pariter huc pertinere videtur.

A *Macra rugosa* Chemnitzii (Conch. Cab. vol. 6. fig. 236), quae in litore Lusitaniae et Hispaniae invenitur, nostra species valvis multo minoribus tenuioribus, pellucidibus interne obsolete costatis, area antica tantum costulis carente, area postica lineolis divaricatis instructa satis differt.

Clar. Gray in *Macram* rugosam proprium genus fundavit „*Eastonia*“ nominatum, sed nullum inter *Meropen* et *Eastoniam* discrimen gravius invenire possum.

**Genus Lutraria Lam. \*)**

**Lutraria maxima Jonas.**

Zeitschr. für Malak. 1844. pag. 34. Reeve Conch. icon. vol. 8. Lutraria spec. 11. = Lutraria larga Reeve.

Specimina Japonica et Sinensia exstant, quae docent hanc speciem paululum variabilem esse, quamvis omnia valvis planis ceterisque notis primariis inter se conveniant. Ceterum non est maxima sui generis species, nam Lutraria elliptica Lam. (Mactra lutraria Linnaei) eandem magnitudinem attingit, nisi forte fit major.

**Lutraria arcuata Desh. \*\*)**

Zool. Proc. 1854. pag. 70. Reeve Conch. icon. vol. 8. Lutraria spec. 6.

Duo specimina Japonica adultum et junius, quod epidermide pallide cornea tenui pellucente indutum est, exstant.

Exemplar majus postice valde hians, ab icone Reeveana paululum recedit ambitu. (Insulae Philippinae H. Cuming).

**Lutraria Sieboldi Desh.**

Proc. Zool. Soc. 1854. pag. 71. Reeve Conch. icon. vol. 8. Lutraria spec. 15.

Japonia H. Cuming. Insula Vancouver Kellett.

Haec species desideratur.

**Genus Raëta Gray.**

**Raëta rostralis Desh. (Mactra).**

Proc. Zool. Soc. 1854. pag. 69. Reeve Conch. icon. vol. 8. Mactra spec. 119.

Unum specimen exstat huius speciei parvulae, tenuissimae, perfragilis, subvitreae. Testa est ovato-trigona, subaequilatera, antice rotundata turgidula, postice rostrata subcompressa, paululum hians, concentrice plicata obsoleteque striata; plicae in antico latere sunt prominentiores; cardo dentibus lateralibus longis compressis instructus; fossula ligamenti parva; lunula plana cordiformis linea leviter impressa terminata. — Testa 20 mill. longa est ejusque long., alt. et crass. ratio fere his numeris respondet: 100, 66, 50.

Quamvis clar. Deshayes dentes laterales brevissimos nominaverit, tamen descriptio ejus omnibus partibus reliquis specimini nostro omnino respondet; pariter icon Reeveana, specimen originale collectionis Cumingianae exhibens, et locus conchulae natalis optime quadrant.

**Raëta pellicula Desh. (Mactra).**

Proc. Zool. Soc. 1854. pag. 68. Reeve Conch. icon. vol. 8. Mactra spec. 124.

Mare Japonicum. Coll. Cuming.

Inter Mollusca nostra deest.

---

\*) Clar. Philippi scripsit Lutaria, nam hoc nomen genericum sine dubio a luto derivari debet.

\*\*) Lutraria arcuata Mayeri est species telluris tertiariae.

## Genus *Caecella* Gray.

### *Caecella Chinensis* Desh.

Proc. Zool. Soc. 1854, pag. 334. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1, pag. 133. Tab. 10, fig. 5, 6.

Specimina juniora atque adulta ambitu variantia exstant. Clar. Deshayes undecim *Caecellae* species l. c. distinxit. Cum vero hae testae variare videantur, dubitatio aliqua mihi remanet an omnes sint species genuinae. Icones earum nullibi invenire potui, excepta quidem *Caecella turgida* (H. et A. Adams gen. of rec. Moll. Tab. 102, fig. 5).

## Tellinacea.

### Genus *Psammobia* Lam.

#### *Psammobia bipartita* Phil.

Zeitschr. für Malak. 1849, pag. 166. Chemn. Conch. Cab. vol. 6, pag. 100, Tab. 10, fig. 92. *Tellina* Gari Linnaei. *Tellina amethystea* — non *amethystina* ut clarissimi Adams fratres scripserunt. — „Testa ovata, valde compressa, transversim striata, sed striae anomaliae longitudinales secant transversales“. *Psammobia coerulescens* Lam. Anim. sans vert. vol. 6, pag. 174, pariter Reeve Conch. icon. *Psammobia* spec. 60.

Specimen integrum pulchrum exstat.

Scriptores nonnulli hanc concham pro *Tellina Gari Rumphii* (Mus. Tab. 45 fig. D) habent, et ipse Linnaeus in Mus. Reg. Lud. pag. 478 iconem *Rumphianam* huc refert, quae quidem nostrae conchae minime respondet. Quamnam *Psammobiarum* speciem Rumphius ante oculos habuerit, omnino certe dici nequit, qua de causa vox barbara „Gari“ haud respicienda est. Cum vero e descriptione Linnaei satis eluceat ipsum auctorem species plures confudisse, cum insuper Lamarckius nomine *Psammobiae coerulescentis* duas conchas diversas conjunxerit, denominationem Philippianam animo non invito adoptavi.

#### *Psammobia occidens* Chemn. (Solen).

Conch. Cab. vol. 6, pag. 74, Tab. 7, fig. 61. *Sanguinolaria occidens* Blainv. Mal. pag. 78, fig. 4. Lam. anim. sans vert. vol. 6, pag. 168. Reeve Conch. icon. *Psammobia* spec. 11. (specimen giganteum).

Specimen minus inter *Mollusca Japonica* exstat.

#### *Psammobia oriens* Desh.

Proc. Zool. Soc. 1854, pag. 318. Reeve Conch. icon. *Psammobia* spec. 1.

Specimen junius adest pictura languida. Inter omnes sui generis species haec *Psammobiae* maximae Desh. proxime accedit.

#### *Psammobia ornata* Desh.

Proc. Zool. Soc. 1854, pag. 323. Reeve Conch. icon. Tab. 4, fig. 26. a. b. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2, pag. 173.

Sinus Jedoënsis. (Insulae Philippinae Cuming.)

*Psammobia corrugata* Desh.

Proc. Zool. Soc. 1854, pag. 324. Reeve Conch. icon. spec. 9.

Exemplaria vivide picta exstant cum icone Reeveana a specimine collectionis Cumingianae originali desumpta optime convenientia, sed suspicor *Psammobiam* maculosam Lamarckii (Anim. sans vert. vol. 6. pag. 174) eandem esse speciem. Sin autem res ita se habet, nomen Lamarckianum antiquius huic speciei servandum est.

*Psammobia radiata* Dkr.

Phil. Abb. vol. 1. pag. 194. Tab. 2. fig. 5.

Specimen minus exstat descriptioni et iconibus jam anno 1845 datis optime respondens.

*Psammobia amethystus* Reeve Conch. icon. spec. 19., anno 1865 edita, eadem species esse videtur. Discrimen gravius invenire non possum; exemplar l. l. depictum statura tantum majore picturaque vividiore differt. Reeveus specimina Molluscorum maxima depingere solebat.

**Genus *Solenotellina* Blainv. \*)**

*Solenotellina Chinensis* Chemn. (Solen).

*Solen diphos Chinensis* Chemn. Conch. Cab. vol. 11. fig. 1933. *Soletellina truncata* Reeve Conch. icon. spec. 9.

Specimen minus exstat Chinensibus respondens. Nullum discrimen inter nostram concham et *Soletellinam* truncatam Reevei invenire possum.

*Solenotellina Boeddinghausi* Lischke.

Malak. Bl. 1870. pag. 26. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 118. Tab. 9. fig. 9. (color in icone nimis vividus).

Specimen unum clar. Lischke benevole mecum communicavit, antecedenti simile, sed ambitu ceterisque notis diversum.

*Solenotellina violacea* Lam. (Solen).

Anim. sans vert. vol. 6. pag. 60. *Psammobia violacea* Desh. Enc. méth. vers vol. 3. pag. 852. Deless. Rec. Tab. 2. fig. 5. Phil. Abb. vol. 1. pag. 97. *Psammobia* Tab. 1. fig. 2. *Soletellina Cumingiana* Desh. M. S. Mus. Cum. Reeve Conch. icon. spec. 4. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 131.

Specimen unum adest cum Javanis et Chinensibus omni ratione conveniens.

Non intelligo quare de causa Deshayesius hanc speciem ex Oceano Indico satis cognitam non recognoverit nomineque novo oneraverit et Reeveus eum temere secutus sit.

*Solenotellina diphos* Lin. (Solen).

Mant. pag. 544. Chemn. Conch. Cab. vol. 6. pag. 68. Tab. 7. fig. 53. 54. *Solen rostratus* Lam. anim. sans vert. vol. 6. pag. 61. *Soletellina radiata* Blainv. = *Psammobia rostrata* Desh. Enc. méth.

Specimen minus inter Mollusca nostra Japonica exstat.

Hanc speciem etiam in aquis semisalsis vivere dicunt.

---

\*) Emend. pro *Soletellina*. Scriptores nonnulli pro *Solenotellina* nomine *Hiatula* Modeer anno 1793 creato utuntur, sed hoc genus pervarias complectitur Molluscorum bivalvium testas.

*Solenotellina moesta* Lischke.

Malak. Bl. 1872. pag. 107. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 99. Tab. 8. fig. 4. 5. 6.

Unum specimen adest icone supra citata paululum majus.

*Solenotellina atrata* Desh.

Desh. M. S. Coll. Cum. Reeve Conch. icon. spec. 14.

Testa tenuis paene elliptica, parum inaequilatera, convexa, antice producta rotundata, postice brevior subattenuata, striis incrementi concentricis obsoletis instructa, intus extusque fusco-violacea, radiis duobus pallidioribus postice signata, epidermide olivacea evanida induta; cardo utriusque valvae bidentatus, denticuli erecti truncati vel subbifidi; linea pallii margini parallela, cum sinu lato angulo obtuso conjuncta; impressiones musculares leves; umbones subacuti depressi paene mediani; ligamentum breve erectum. — Speciminum quae exstant maximum 38 mill. longum est ejusque longitudinis, altitudinis et crassitudinis ratio numeris 100, 62 et 36 respondet.

Specimina nostra prope Tokio lecta sunt.

Haec species antecedenti cognata est, sed forma tumidiore ambitu magis elliptico et lineae pallii conformatione differt.

Cum descriptio Reeveana admodum manca haud sufficiat, concham hic accuratius adumbravi. Teste H. Cuming et in insulis Philippinis invenitur.

*Solenotellina olivacea* Jay. (Psammobia).

Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 131. vol. 3. pag. 98. Tab. 8. fig. 7—12.

Plura specimina ambitu paululum variantia exstant juniora et adulta; in junioribus pictura vividior esse solet quam in adultis.

Haec et species sequentes habitu suo singulari propriam formant Solenotellinarum sectionem.

*Solenotellina Japonica* Desh.

Desh. M. S. Mus. Cum. Reeve Conch. icon. spec. 16.

Ex Japonia eam quondam retulit clar. Siebold.

Antecedenti simillima est, sed latere testae antico multo longiore constanter differre videtur. Inter nostra Mollusca Japonica desideratur.

*Solenotellina Nuttallii* Conr. (Sanguinularia).

Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. 1837. vol. 7. pag. 2. pag. 230. Tab. 17. fig. 6. = Psammobia decora Hinds. etc. Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 98.

Sinus Jedoënsis, Hakodate, San Diego, California.

**Genus Tellina Lin.**

Tellinae multiplices in omnibus maribus plus vel minus salsis tam calidis quam frigidis obviae, a nonnullis scriptoribus in varia genera et subgenera distribuuntur, quae vero, cum satis non sint fundata certisque finibus separari nequeant, hic non curavi.

*Tellina perna* Spengler.

De synonymis conf. Hanley Monogr. in Thes. Conch. vol. 1. pag. 236.

Concha pictura et colore variabilis. Inter Mollusca nostra Japonica specimen rufescens albo radiatum exstat. Varietatem radiis aurantiis vivide pictam clar. Desh. Tellinam egregiam nominavit Proc. Zool. Soc. 1854. pag. 366.

Insulae Philippinae, Java etc.

*Tellina vulsella* Chemn.

*Tellina rostrata* seu *vulsella* Conch. Cab. vol. 6. pag. 113. Tab. 11. fig. 105. *Tellina rostrata* Gmel. nec Lin. Reeve Conch. icon. spec. 56. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 113.

Tria specimina vivide rosea et unum album umbonibus subroseis exstant.

*Tellina pulcherrima* Sowerby.

Tank. Cat. App. pag. 3. Tab. 1. fig. 1. Hanley Thes. Conch. vol. 1. pag. 226.

Species inter Tellinam asperrimam et rastellum Hanleyi quasi intermedia, ab hac squamis erectis ex parte spiniferis anticam quoque partem testae tenentibus, ab illa vero area mediana squamis carente satis diversa est.

Specimen illaesum exstat. Pariter in insulis Philippinis obvenit.

*Tellina secta* Conrad.

Journ. Acad. Nat. Soc. Phil. vol. 7. pag. 2. 1837. pag. 257. Hanley Thes. Conch. vol. 1. pag. 327. fig. 245. 248. Philippi Abb. vol. 1. pag. 90. *Tellina* Tab. 4. fig. 2. *Tellina ligamentina* et Japonica Desh. Conf. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 96.

Species late dispersa pro aetate et patria habitu vel lineis extremis umbonumque situ admodum variabilis.

Specimen maximum quod exstat 50 mill. longum, 32 altum est. Testa collectionis nostrae gigantea Californiana 70 mill. aequat. In uno specimine epidermidis particula residua conspici potest cornea, tenerrima, fragilis et caduca.

Clar. S. Hanley hanc speciem uberius tractavit l. c. Icon. 245. duplicem exhibet carinam.

*Tellina truncata* Jonas.

Philippi Abb. vol. 1. pag. 71. *Tellina* Tab. 1. fig. 2. Hanley in Thes. Conch. vol. 1. pag. 325. Tab. 62. fig. 198. Reeve Conch. icon. *Tellina* spec. 33.

Specimen Japonicum exstat Sinensibus a beato Jonas quondam acceptis respondens.

*Tellina Galatea* Lam. (*Psammobia*).

Anim. sans vert. vol. 6. pag. 173. = *Tellina sericina* Jonas in Phil. Abb. vol. 1. pag. 71. *Tellina* Tab. 1. fig. 1.

Specimen minus adest. (Mare Chinense).

*Tellina diaphana* Deshayes.

Proc. Zool. Soc. 1854. pag. 364. Reeve Conch. icon *Tellina* spec. 302. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 113.

Haec testa a *Tellina capsoide* Lamarckii imprimis statuta minore magis curta et triangulari sulcisque radiantibus vix conspicuis quidem diversa, tamen varietas tantum minor speciei Lamarckianae esse videtur, cum notae allatae nimis leves sint et exiguae, ut pro specie genuina habeatur.

Exstat specimen illaesum a clar. J. Rein lectum. *Tellina capsoides* typica in Philippinis insulis haud raro occurrit.

*Tellina ovalis* Sowerby (*Tellinides*).

Tankerv. Cat. App. pag. 3. Hanley descr. Cat. pag. 73. Tab. 13. fig. 56. *Solen ex albido radiatus* Chemn. Conch. Cab. vol. 6. pag. 71. Tab. 7. fig. 57. 58. *Solen striatus* Gmel. Syst. Nat. pag. 3227. non *Tellina striata* Chemn. *Tellina tridentata* Anton Wiegman. Arch. 1837. Reeve Conch. icon. *Tellina* spec. 105.

Specimen pulchrum e Mari Japonico exstat. (Insulae Nicobaricae et Philippinae.)

Cum vocabulum „*ovalis*“ aliam significationem habeat quam *ovatus* (forma ovi), melius *ovata* nominaretur nostra concha, nisi species quaedam fossilis a Sowerby hoc nomine jam insignita esset.

*Tellina nasuta* Conrad.

Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. vol. 7. pars 2. pag. 258. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 115.

Mare Japonicum septentrionale.

San Diego Nuttall teste Conrad.

*Tellina inconspicua* Broderip et Sowerby.

Zool. Journ. vol. 4. pag. 363. Beechey's Voyage Tab. 41. fig. 6. Hanley in Thes. Conch. vol. 1. pag. 317. fig. 120. Reeve Conch. icon. spec. 148.

Mare Japonicum septentrionale.

Specimina nostra optime in icones supra laudatas quadrant. Testa eorum concentrice striata, opaca, apicibus incarnatis paululum erosa, epidermide cornea lamellosa vestita. *Tellinae solidulae* Pulteney cognata est.

*Tellina Jedoënsis* Lischke.

Malak. Bl. vol. 19. pag. 106. 1873. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 92. Tab. 9. fig. 1—3.

Specimina minora exstant e sinu Jedoënsi.

*Tellina inquinata* Deshayes.

Proc. Zool. Soc. 1854. pag. 357. Reeve Conch. icon. *Tellina* spec. 164. = *Tellina incongrua* Martens. Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 117. Tab. 10. fig. 12. 13. vol. 3. pag. 95.

Jokohama et Nagasaki.

Singulas valvas attulit clar. J. Rein.

Species ambitu variabilis.

*Tellina praetexta* Martens.

Ann. and Mag. of Nat. Hist. vol. 16. pag. 430. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 130. vol. 2. pag. 113. Tab. 10. fig. 14.

Singulae valvae prope Nagasaki lectae exstant.

Clar. L. de Schrenck hanc speciem cum *Tellina pallide rosea* Chemn. confudit. Amurl. Moll. pag. 555.



*Tellina nitidula* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 236. Moll. Jap. pag. 27. Tab. 3. fig. 14. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 129.  
Portus De-shimae (Nuhn), Yokohama (Martens), Nagasaki.  
Haec species primo in specimina juniora fundata, nunc plane adulta exstat.

*Tellina rhomboides* Quoy et Gaimard.

Voy. de l'Astr. vol. 3. pag. 502. Tab. 81. fig. 4—7. Sow. Thes. vol. 1. pag. 304. Tab. 58. fig. 92. 96.  
97. = *clathrata* Desh.

Sinus Jedoënsis.

Variat colore pallide gilvo, aurantio vel roseo; strigis radiantibus interdum ornata est.

*Tellina pallidula* Lischke.

Malak. Bl. vol. 18. pag. 42. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 114. Tab. 10. fig. 6. 7. 7a.  
Nagasaki.  
Plura specimina attulit clar. J. Rein.

*Tellina rutila* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6. pag. 236. Moll. Jap. pag. 27. Tab. 3. fig. 6. (color nimis opacus est).  
Portus De-shimae, Nagasaki etc.  
Plura specimina exstant.

*Tellina iridella* Martens.

Ann. and Mag. Nat. Hist. 1865. pag. 431. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 114. Tab. 10. fig. 8. 9.  
Specimina tria exstant.

*Tellina iridescens* Benson (*Sanguinolaria*).

Ann. Nat. Hist. 1842. vol. 9. Hanley in Thes. Conch. vol. 1. pag. 286. Tab. 58. fig. 88. = *Tellina*  
*carnea* Phil. Zeitschr. f. Malak. 1844. Lischke vol. 3. pag. 93.

*Tellina minuta* Lischke.

Malak. Bl. vol. 19. pag. 106. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 94. Tab. 9. fig. 4—6.  
Sinus Jedoënsis.

*Tellina nux* Hanley.

Proc. Zool. Soc. 1844. Thes. Conch. vol. 1. pag. 251. Tab. 56. fig. 33. Dunker Moll. Jap. pag. 27.  
Portus De-shimae.  
Testa parvula inter Mollusca Japonica portus De-shimae a me l. c. commemorata, ad hanc  
speciem Hanleyanam pertinere videtur.  
Praeterea ut *Tellinae Japonicae* hae enumerantur species:

*Tellina compressissima* Reeve.

Conch. icon. spec. 328.  
Mare Japonicum.

*Tellina lenticularis* Sowerby.

Reeve Conch. icon. spec. 342.

Species insignis *Tellinae remiei* Lin. (= *sulcatae* Lam.) affinis, in Museo Britannico exstat.

*Tellina venulosa* Schrenck.

Bullet. de l'Acad. imp. des Sc. de St. Pétersb. vol. 4. pag. 412. Reisen und Forsch. im Amurlande vol. 2. Moll. pag. 556. Tab. 22. fig. 2—5.

Haec species magna et insignis l. c. accurate descripta, prope Hakodate, in insulis Kurilis aliisque locis collecta, mari Japonico septentrionali propria esse videtur. Quantum scio in aliis regionibus nondum inventa est.

*Tellina edentula* Brod. et Sow.

Zool. Journ. vol. 4. pag. 363. Beechey's Voy. Tab. 41. fig. 5. et Tab. 44. fig. 1. Middendorff Reise vol. 2. pag. 259. Tab. 21. fig. 1. Schrenck Amurl. pag. 564.

Fretum Beringii, litus occidentale insulae Sachalien etc.

Haec concha satis variabilis esse videtur, ut ex iconibus citatis concludi potest. In collectione nostra Molluscorum Japonica non exstat.

*Tellina Japonica* Desh.

Proc. Zool. Soc. 1854. pag. 356.

Mare Japonicum. Coll. Cuming.

Species mihi incognita.

*Tellina frigida* Hanley.

Proc. Zool. Soc. 1844. Sowerby Thes. Conch. vol. 1. pag. 327. Tab. 59. fig. 119.

Litus Kamschatkanum.

*Tellina lata* Gmel.

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3237. no. 48. Lovén Ind. Moll. lit. Scand. occid. hab. pag. 41. Midd. Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens vol. 1. pag. 257. Schrenck Amurland vol. 2. Moll. pag. 561. (non *Tellina lata* Quoy et Gaim.).

Mare Japonicum septentrionale.

De variis formis a clar. de Middendorff ad hanc speciem relatis certe judicare nequeo, cum specimina mihi desint.

*Tellina lutea* Gray.

Ind. Test. Suppl. Tab. 1. fig. 3. Hanley Thes. Conch. vol. 1. pag. 306. Tab. 59. fig. 103. Tab. 65. fig. 249. Midd. Reise vol. 1. pars 1. pag. 258. Tab. 21. fig. 2. 3. Schrenck Amurl. Moll. pag. 563.

Mare Japoniae septentrionale.

Cum desideretur haec species, nil habeo quod adjiciam.

*Tellina solidula* Pulteney.

Cat. Dorset. pag. 29. Schrenck Amurl. vol. 2. Moll. pag. 566. cfr. Hanley in Thes. Conch. vol. 1. pag. 318.

Omnes hae species septentrionales in opere Schrenckiano uberrime tractatae sunt.

### Genus *Gastrana* Schumacher.

*Gastrana Yantaiensis* Crosse et Debeaux (*Fragilia*).

Journ. de Conch. vol. 11. 1863. pag. 78. ibid. pag. 255. Tab. 9. fig. 2. Reeve Conch. icon. Tellina spec. 295.

Species testa valde crassa ovato-trigona irregulari, rugosa et sublamellosa insignis, l. c. fusius descripta est cum inquisitione anatomica clar. Fischer adjuncta.

Frequens in sinu Yan-tai dicto Chinae septentrionalis inter lapides excavatos et detritos invenitur. Specimen nostrum ex Japonia allatum, 39 mill. longum est.

Concham quam clar. de Schrenck Amurland vol. 2. Zool. pag. 559. Tab. 22. fig. 6. 7. errore captus nomine Tellinae Bruguierei Hanl. descripsit et delineavit, ad hanc nostram speciem pertinere videtur.

Nomen genericum „*Fragilia*“ Deshayesii, in Tellinam fragilem Linnaei fundatum, huic speciei minime respondet, praeterea male formatum et denominatione Schumacheri multis annis junius est.

Haec *Gastranae* species Petricularum vitam degere videtur discrepans cum Tellinis veris.

### Genus *Lucinopsis* Forbes et Hanley.

*Lucinopsis divaricata* Lischke.

Malak. Bl. vol. 19. pag. 108. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 90. Tab. 7. fig. 12—14.

Plura specimina exstant.

Descriptioni Lischkeanae nihil habeo quod adjiciam.

*Lucinopsis decussata* Philippi (*Venerupis*).

Enum. Mollusc. Sicil. vol. 1. pag. 22. Tab. 3. fig. 5. vol. 2. pag. 20.

Tria specimina exstant cum mediterraneis convenientia.

Haec concha habitu paululum variabilis est.

## Donacea.

### Genus *Donax* Lin.

*Donax semigranosus* Dkr.

Tab. nostra 7. fig. 14. 15. latus internum et externum. fig. 16. pars truncata posterior magnitudine aucta delineata.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 68. *Donax* Dysoni Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 112. vol. 3. pag. 91. non *Donax* Dysoni Desh. Proc. Zool. Soc. 1854. pag. 353.

Testa trigono-cuneata, antice attenuata et paulum compressa, tenerrime radiatimque striata, paene laevis, postice perbrevis abrupte declivis, utrinque obtusangula, sulcis radiantibus rugisque transversis granosa, intus extusque alba vel latere tantum interno colore violaceo, roseo aut flavescente tincta; ligamentum ut in genere solet, breviculum; epidermis pallide cornea, tenerrima, decidua. Cardinis structura nil singulare offert. Crenulae marginales latus anticum versus oblitteratae postremo evanescent.

Dunker, Moll. Jap. mar.

Plura specimina exstant exacte congruentia 16—17 mill. longa.

Hanc speciem clar. Lischke l. c. pro *Donace Dysoni* tractavit; in *Conchyliologia iconica* et in *Thesauro Conchyliorum* desideratur.

*Donaci Saigonensi* Crosse (*Journ. de Conch.* 1864. pag. 323. Tab. 13. fig. 7.) respectu habito sculpturae quidem affinis est, sed testa brevior trigono-cuneata, antice magis attenuata totoque ambitu alieno differt. Pariter *Donax Dysoni* Desh. (*Proc. Zool. Soc.* 1854. pag. 353.) ambitum offert alienum et sculpturam quamvis similem tamen diversam. Clar. Sowerby hanc speciem cum *Donace incarnato* Chemn. conjunxit, quod comprobaverim.

***Donax bicolor* Gmel.**

*Syst. Nat.* pag. 3265. *Lamarck Anim. sans vert.* ed. 2. vol. 6. pag. 243. *Reeve Conch. icon.* *Donax* spec. 28.

*Specimen fusco-violaceum* exstat. Ad *Latonas Schumacheri* pertinet.

**Scrobiculariacea.**

**Genus *Leptomya* A. Adams.**

*Leptomya cochlearis* Hinds. (*Neaera*).

*Proc. Zool. Soc.* 1844. pag. 98. A. Adams in *Ann. and Mag. etc.* Mart. 1864. pag. 203.

Goto, Seto-Uchi.

*Leptomya adunca* Gould.

*Scrobicularia* (Capsa) *adunca* Gould *Otia conch.* pag. 167. A. Adams l. c.

Tsu-shima.

**Genus *Jacra* H. et A. Adams.**

*Jacra Japonica* A. Adams.

*Ann. and Mag. Nat. Hist.* Apr. 1864. pag. 308.

Oki-no-shima.

Haec et *Jacra Seychellarum* A. Adams (*Gen. of rec. Moll.* vol. 2. pag. 409) hucusque solae innotuerunt.

**Genus *Semele* Schumacher.**

*Semele Zebuensis* Hanley (*Amphidesma*).

*Illustr. Cat. of rec. Shells* Tab. 12. fig. 7. *Reeve Conch. icon.* vol. 8. *Amphidesma* spec. 25. (*Semele* n. gr. *gratiosam* A. Adamsii clar. Reeve pro eadem concha habet.)

Species forma oblongo-ovata compressiuscula, inaequilatera, parte antica valde producta costisque concentricis densis lamelliformibus nec non interstitiis minutissime radiatimque striatis sub vitro tantum conspicuis bene designata.

Duo specimina exstant aequalia.

**Semele Sinensis A. Adams.**

Proc. Zool. Soc. 1853. pag. 95. *Amphidesma Sinensis* (melius *Sinense*) Reeve Conch. icon. vol. 8. *Amphidesma* spec. 23.

Inter specimina nostra Japonica unum adest minus intus maculis roseis aspersum.

**Semele Hanleyi Angas.**

Proc. Zool. Soc. 1878. pag. 859. Tab. 54. fig. 1.

Mare Japonicum Belcher. Coll. Hanleyana.

**Semele Californica A. Adams.**

Proc. Zool. Soc. 1853. pag. 96. Reeve Conch. icon. vol. 8. *Amphidesma* spec. 19. Schrenck Amurland Moll. pag. 569. Tab. 22. fig. 10.

Frétum Tataricum, California.

Specimen minus et detritum huc pertinere videtur.

## **Paphiacea.**

**Genus Paphia Lamarck.**

*Paphia striata* Chemn. (*Mactra*).

Chemn. Conch. Cab. vol. 6. fig. 222. 223.

Valvulae singulae detritae exstant.

Genus *Paphiae* anno 1799 a Lamarckio creatum, postea ab auctore ipso *Crassatellis* injunctum est, quae vero toto habitu ac indole differunt. Teste Mörch nostra concha est *Donax candidus* Spengleri apud Schroeterum (Einl. vol. 3. pag. 106. Tab. 8. fig. 5). Quamvis icon aliquo modo respondeat, tamen verba Schroeteri „testa tenuis et fragilis“ minime quadrant.

**Genus Donacilla Lamarck.**

*Donacilla picta* Dkr.

Tab. nostra 7. fig. 7—10. varr.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 68.

Testa parvula, crassiuscula, ovato-oblonga, subtrigona, valde inaequilatera, utrinque rotundata, striis incrementi obsoletis instructa, diversicolor, modo alba, modo carnea, plerumque radiis olivaceis vel prasinis vivide picta, rarius fascia carnea lata mediana signata; color internus albus vel carneus; epidermis tenuis cornea.

Specimina plura exstant; majora 13 mill. longa sunt eorumque ratio dimensionum fere haec est: 100, 60, 38.

Species concinna picturaque singularis *Donacillam* corneam Polii e Mari Mediterraneo in mentem revocat, quae quidem multo major est. Cardii et impressionum structura eadem est atque in hac specie.

**Genus Ervilia Turton.**

*Ervilia Japonica* A. Adams.

Cfr. Ann. Mag. Nat. Hist. Mart. 1862. pag. 224.

Tsu-shima.

**Venerinacea.**

**Genus Venus Lin.**

*Venus toreuma* Gould.

Proc. of the East. Soc. of Nat. Hist. vol. 3. pag. 277. 1850. Otia conch. pag. 84. Expl. exped. Moll. pag. 419. Tab. 37. fig. 537. *Venus crebrisulca* Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 728. Tab. 161. fig. 187—189. (non Lam.). *Venus Jukesii* Desh. Cat. of the Conchifera in the Brit. Mus. 1853. pag. 100. cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 121.

Duo specimina minora exstant detrita et decolorata. Specimen Ceylonicum integerrimum vivide coloratum clar. Roberto de Schlagintweit debeo.

*Venus Jedoënsis* Lischke.

Jahrb. der deutsch. Malakoz. Ges. vol. 1. pag. 57. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 84. Tab. 7. fig. 1—9.

Specimina nonnulla e sinu Jedoënsi retulit clar. J. Rein. Animal apud Japonos est cibus magni aestimatus.

*Venus lamellaris* Schumacher (*Antigona*).

*Venus cancellata* var. Chemn. Conch. Cab. vol. 6. Tab. 29. fig. 306. 307. *Venus reticulata* var. Lam. *Venus* (*Dosina*) *Lamarckii* Gray. *Venus subrostrata* Reeve Conch. syst. vol. 1. Tab. 68. fig. 4.

Unicum specimen eximiae magnitudinis exstat 48 mill. longum. Concha e mari Sinensi satis nota.

*Venus resticulata* Sowerby.

Thes. Conch. vol. 2. pag. 706. Tab. 153. fig. 23.

Specimen nostrum inter Mollusca Japonica inventum, cum descriptione et icone supra laudatis satis convenit. Inter conchas nonnullas, quae ad divisionem Veneris puerperae Linnaei pertinent, difficillima est distinctio.

*Venus reticulata* Lin.

Syst. nat. ed. 10. pag. 687. Mus. Lud. Ulr. Reg. pag. 503. Chemn. Conch. vol. 6. fig. 382—384. = *Venus corbis* Lam.

Hanc speciem in Philippinis insulis haud raram, clar. Lud. Hassenpflug, navarchus celetis, cujus praematuram mortem intime lugeo, ex Japonia reportavit et mecum communicavit.

**Genus Mercenaria Schumacher.**

*Mercenaria Stimpsoni* Gould.

Otia Conch. pag. 169.

Hakodate teste A. Adams Veneridae in Ann. and Mag. Nat. Hist. 1869. pag. 230.

**Genus Gemma Deshayes.**

**Gemma Totteni Dkr.**

*Venus gemma* Totten Sil. Journ. Tab. 26. fig. 2. Gould Rep. Invert. Mass. pag. 88. fig. 51.

Haec conchula ex America boreali notissima, teste A. Adams maris quoque Japonici incola est. Sinus Aniwa. (Cfr. Ann. et Mag. Nat. Hist. 1869. pag. 230.)

**Genus Cryptogramma Mörch.**

**Cryptogramma squamosa Lin. (Venus).**

Sow. Thes. Conch. Tab. 156. fig. 83. 84.

Cap. Nomo, Kiusiu. A. Adams l. c. pag. 230.

**Cryptogramma Roemeri Dkr. (Venus).**

Moll. Jap. pag. 26. Tab. 3. fig. 10.

Specimina plura iterum lecta sunt strigis radiantibus fuscis plus minusve vividis ornata; color areae lunulaeque pariter fuscus est. In nonnullis costae perspicue eminent geminatae costa simplici sejunctae.

Haec concha antecedenti proxima semper constans et aequabilis esse videtur.

Cryptogrammae divisionem concharum Venerinacearum constituunt bene terminatam.

**Genus Chione Megerle de Mühlfeldt.**

**Chione marica Lin. (Venus).**

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1130. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 719. Tab. 157. fig. 107—110. (*Venus marica* Bornii est *V. granulata* Gmel. ex oceano Americano.)

Specimen unum adest Japonicum quod expalluit. Varietatem coloris et picturae ex Andamanis insulis accepi cum icone Sowerbyana 109 plane convenientem.

**Chione crenifera Sow. (Venus).**

Wood Suppl. (Hanley) Tab. 16. fig. 30. A. Adams Ann. and Mag. 1869. pag. 230. = *Venus Portesiana* Orb.

Seto-Uchi. Adams.

**Chione intersecta Sow. (Venus).**

Thes. Conch. Tab. 155. fig. 59. 60. Ann. Mag. 1869. pag. 230.

Seto-Uchi. Adams.

Haec et concha antecedens inter Mollusca Japonica mihi desunt. Quaeritur num recte determinatae sint ab Adamsio.

**Chione (Chamelea) striata Chemnitzii (Venus).**

Conch. Cab. vol. 6. pag. 358. Tab. 34. fig. 365. 366.

Unicum tantum specimen exstat decoloratum et adsum. Cum hac specie pervariabili jungendae sunt Veneres literata Chemn. Conch. Cab. fig. 364. (non literata Linnaei), *V. Japonica*

Gmel. (Syst. Nat. pag. 3279.), *V. tristis* Lam. (Del. Rec. Tab. 11. fig. 3.) et *elegantina* Lam. Pariter *Venus Labuana* Ad. et Rve. Sam. pag. 79. Tab. 21. fig. 16. nil est nisi varietas nostrae conchae insignis.

*Chione astartoides* Beck. (Venus).

Phil. Abb. vol. 3. pag. 35. (61.). Venus Tab. 9. fig. 4. Cfr. Schrenck Reisen im Amurl. Moll. pag. 529. Mare Japoniae septentrionale, litus Groenlandiae.

*Chione (Circumphalus) foliacea* Philippi (Venus).

Abb. vol. 2. pag. 107. Venus Tab. 5. fig. 1. *Chione foliacea* Desh. in Brit. Mus. Cat. Conchif. pag. 122. = *Anaitis foliacea* Roem. = *Venus tiara* var. Sow. etc. Lischke Jap. M. C. vol. 3. pag. 85.

Specimina complura lecta sunt, quae Africanis ex insula Zanzibar et Mari rubro a beato Alberto Rodatz quondam reportatis plane respondent.

*Chione (Circumphalus) isabellina* Phil.

Zeitschr. für Malakoz. 1848. pag. 189. (Venus) Abb. et Beschr. vol. 3. pag. 39. 83. Tab. 10. fig. 5. Veneri quae sequitur affinis. Mare Chinense et Japonicum.

*Chione (Circumphalus) calophylla* Phil. (Venus).

Wieg. Arch. f. Naturg. 1836. Tab. 8. fig. 2. *Chione lamellata* A. Adams non Lam. Mare Chinense et Japonicum. Unum specimen exstat.

*Chione (Timoclea) cardioides* Lam. (Venus).

Anim. sans vert. vol. 6. pag. 345.

Huc quoque pertinent *Veneres* asperima et intersecta Sowerbyi, pariter *Cytherea cardilla* Lamarckii ut Deshayesius docet in anim. sans vert. vol. 6. pag. 328.

Oki-no-shima. A. Adamsio teste (Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 4. vol. 3. pag. 231.). Antea nusquam alibi nisi in America inventa est.

*Chione (Timoclea) histrionica* Brod. et Sow. (Venus).

Sow. Thes. Conch. Tab. 155. fig. 52.

Hakodate teste A. Adams l. l. Nonne varietas praecedentis?

*Chione (Marcia) quadrangularis* Ad. et Rve.

Voy. Samarang pag. 79. Tab. 24. fig. 7.

Archipelagus Coreanus.

**Genus *Cytherea* Lamarck.**

*Cytherea (Meretrix) lusoria* Chemnitz.

*Venus lusoria* Japonica Chemn. Conch. Cab. vol. 6. pag. 337. Tab. 32. fig. 340. *Cytherea lusoria* Lam. inclusa *Cytherea fusca* Koch. Phil. Abb. vol. 1. Tab. 3. fig. 1.

Plura specimina typica exstant Japonica atque Chinensia valde inaequilaterialia postice elongata et attenuata; sed haec forma minime est stabilis cum saepissime mutetur in habitum



*Cythereae* vel *Meretricis petechialis* Lamarckii. Clar. Lischke adeo opinatur ipsam *Venerem* meretricem cum *Venere lusoria* jungendam esse, quod ego quidem non concesserim, cum haec species quod sciam testa valde tumida multo crassiore, omnino tota forma ac facie differat. *Cytherea petechialis* typica interdum ad magnitudinem eximiam pervenit; specimina 105—110 mill. longa prope Nagasaki haud raro in mercatum veniunt; est enim haec concha Japonis cibus magni aestimatus, qui „Hamaguri“ nominatur. Rumphio teste in ea Crustacea saepissime inveniuntur ad genus *Pinnoteræ* pertinentia.

*Cytherea meretrix* Lin. (*Venus*).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 686. Chemn. Conch. Cab. vol. 6. Tab. 33. fig. 347. 348. et „varietates conchae Veneris, quae Meretrix seu impudica vocatur“ ibid. figg. 349. 350. 352. pariter *Cytherea castanea* Lam. Chemn. Tab. 33. fig. 351. Has omnes testas in figuris hic laudatis bene depictas ad unam eandemque speciem pertinere mihi persuasissimum est.

Exstant in thesauro conchyliorum nostro multa specimina in Japonia, China et insulis Andamanis lecta.

*Cytherea morphina* Lam.

Anim. sans vert. vol. 6. pag. 300. Chemn. Conch. Cab. vol. 6. fig. 358.

Nagasaki, Simoda, Yokohama, teste A. Adams l. c. pag. 231. Non longe absum quin credam, hanc speciem pariter nil esse nisi varietatem *Cythereae meretricis*.

**Genus Gomphina Mörch.**

*Gomphina donacina* Chemn. (*Venus*).

Conch. Cab. vol. 10. pag. 231. fig. 1983. 1984. (icones quidem mediocres, quae vero sufficiunt) nec *Venus donacina* Gmel., quae ad Meroën pertinet. *Venus semicancellata* Koch. *Venus aequilatera* Sow. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 120.

Magna speciminum series exstat huius conchae satis cognitae tam pictura quam colore variabilis. Specimina pleraque inveniuntur pictura reticulata radiisque tribus obscurioribus signata, interdum maculis nigrescentibus vel lineis fuscis angulatis aut fulguratis ornata. Color fundi albidus est vel griseus, rarius rubescens.

Conferantur quae clar. Lischke de *Venere* vel *Gomphina donacina* l. l. jam disseruit.

*Gomphina melanaegis* Röm.

Malak. Bl. 1861. pag. 157. Dunker Nov. conch. pag. 40. Tab. 12. fig. 12. 13.

Haec species in singulam tantum valvam l. c. primo depictam fundata est. Posterius specimen majus completum paullo discrepans clar. Lischke (Jap. M. Conch. vol. 3. Tab. 7. fig. 10. 11.) depinxit. Nunc vero multa specimina juvenilia et adulta ex parte forma gigantea adsunt non solum colore et picturae indole, sed etiam generatim ac universe spectata *Veneri donacinae* tam similia, ut pulli saltem primo obtutu permutari queant, eo magis cum exemplaria quoque *Gomphinae melanaegis* juniora obveniant in latere postico paene cancellata. Si vero testae utriusque speciei plane adultae exstant, *Gomphina melanaegis* umbonibus magis prominentibus, latere dorsi antico excavato, postico minus angulato sulcisque concentricis crassioribus semper differt. Pictura plerumque eadem est atque in *G. donacina*. Raro obveniunt quoque specimina prorsus alba vel flavescentia.

Speciminum quae exstant maximum 97 mill. longum magnitudine multo superat iconem Lischkeanam.

Adnotandum hic est Venerem aequilateram Sow. (Thes. Conch. vol. 2. pag. 739. Tab. 159. fig. 168. 169.) concham pariter ex Japonia allatam, pullis quibusdam nostrae speciei tam similem esse, ut eam pro varietate ejusdem declaraverim. Si vero res ita se habet, quod minime dubito, nomen Sowerbyanum, antiquius, etsi in specimen juvenile fundatum, prioritatis causa praeferendum est. At contra clarissimi Schrenck et Lischke Venerem aequilateram cum specie antecedente junxerunt. Specimina mea iconibus Sowerbyanis supra laudatis optime respondent.

Haec et quae antecedit species genus Venerinacearum constituunt singulare bene terminatum, sed quaeritur num hoc loco apte collocatum sit.

### Genus Tivela Link.

#### *Tivela damaoides* Gray (Trigona).

Wood Suppl. Venus fig. 17. Sow. Thes. Conch. vol. 2. Tab. 127. fig. 7. 8. 9. *Cytherea ponderosa* Koch. Phil. Abb. vol. 1. Tab. 1. fig. 1.

Oki-no-shima teste A. Adams l. c. pag. 231. Concha Japanorum pauperes alimento utuntur.

#### *Tivela radiata* Sow. (Cytherea).

Proc. Zool. Soc. 1835. pag. 23. Thes. Conch. vol. 2. pag. 615. Tab. 128. fig. 28—31.

Singulae valvae minores exstant sine indicatione loci natalis. Clar. de Schrenck annotat (Reisen im Amurl. Moll. pag. 544.) hanc speciem in America centrali haud raram a clar. de Nordmann in freto Tatarico detectam esse.

### Genus Callista Poli.

#### *Callista limatula* Sow. jun. (Cytherea).

Thes. Conch. vol. 2. pag. 640. Tab. 136. fig. 200. 201. (locus natalis non indicatus est).

Plura specimina juniora exstant Japonica pictura qua solet concha pallidiore. Specimina collectionis nostrae ex Amboinis insulis allata, colore multo vividiore, lunula areaque castaneis insignita sunt. Testa integra nitidissima est.

#### *Callista festiva* Sow. (Cytherea).

Thes. Conch. vol. 2. pag. 625. Tab. 130. fig. 72 = *Cyth. amoena* Phil. in lit.

Specimen unicum, Sinensibus plane respondens.

#### *Callista Chinensis* Chemn. (Venus).

Conch. Cab. vol. 11. pag. 227. Tab. 202. fig. 1976. *Cytherea pacifica* Dillw. cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 122.

Plura specimina exstant juniora et adulta pictura pallidiore insignita: in aliis striae concentricae obsoletae, in aliis fortiores praesertim latus anticum versus. Specimen Chinense magnum collectionis nostrae colore multo vividiore excellit, specimen alterum habitu insolite curto insignitum est.

*Callista squalida* Sow. (Cytherea).

Proc. Zool. Soc. 1835. pag. 23. Thes. Conch. vol. 2. pag. 629. Tab. 131. fig. 87—89.

Schrenckio teste haec species, ex America centrali satis nota, etiam in mari Japonico septentrionali invenitur. Cfr. Reisen im Amurl. Moll. pag. 538.

*Callista pannosa* Sow. (Cytherea).

Proc. Zool. Soc. 1835. pag. 47. Thes. Conch. vol. 2. pag. 635. Tab. 133. fig. 140—142. = *Cyth. lutea* Koch. Schrenck l. c. pag. 543.

Haec species antea e litore Chilensi et Peruano tantum nota a clar. de Nordmann pariter in Japonia septentrionali detecta est.

*Callista inflata* Sow. (Cytherea).

Thes. Conch. Tab. 133. fig. 127. 128.

Specimen exstat quod expalluit.

*Callista indecora* Phil. (Cytherea).

Abb. u. Beschr. vol. 3. pag. 74. Tab. 9. fig. 7. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 634. Tab. 136. fig. 179.

Duo specimina juniora adsunt certe ad hanc speciem bene terminatam pertinentia. Clar. Philippi eam cum *Callista rudi* Polii (vel *Cytherea Venetiana* Lamarckii) jam comparavit quae ipsi est simillima.

Clar. Adams inter *Callistas* Japonicas et „*Venerem* vel *Cytheream*“ tellinæformem Phil. ipsius Philippi auctoritate errans enumeravit, nam Philippio patria ejus prorsus ignota erat.

**Genus *Sunetta* Link.**

*Sunetta excavata* Hanley (Cytherea).

Proc. Zool. Soc. 1842. pag. 123. Ill. Cat. of rec. Shells pag. 109. Tab. 15. fig. 19. *Cuneus excavatus* Desh. *Meroë excavata* Sow. Thes. Tab. 126. fig. 13. 14. = *Cyth. menstrualis* Menke\*) = *Meroë magnifica* Reeve.

Plura specimina exstant juniora et adulta, unum giganteum 75 mill. longum, 60 altum. Haec species pro aetate satis variat ambitu; interdum est subquadrata ideoque suspicor *Meroën* subquadrata Sow. l. c. fig. 9. varietatem huius conchae juvenilem esse. Plerumque epidermide fusca tenui denudata est.

Synonyma huius conchae ad hoc tempus ex Japonia tantum notae, bene exposuit clar. Lischke in Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 110.

**Genus *Circe* Schumacher.**

*Circe scripta* Lin. (Venus).

Mus. Lud. Ulr. Reg. pag. 507. testa lentiformi compressa striata postice angulo recto angulata. Syst. Nat. ed. 10. pag. 689. ed. 12. pag. 1135. Rumphii Mus. Tab. 43. fig. C. *Chama literata*

---

\*) Haec aliaque nomina obscoena et odiosa, quae maximam partem ex aetate Linnaeana originem ducunt, mea opinione e scientia conchylologica nostrae aetatis prorsus expellenda sunt.

rotunda Rumphii Chemn. Conch. Cab. vol. 7. pag. 31. Tab. 40. fig. 420—426. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 651. Tab. 139. figg. 38—43.

Hae omnes icones optime quadrant in specimina nostra Japonica. Magna huius conchae mutabilis copia docet Circeen scriptam et Cytheream undatinam Lamarckii certis finibus haud separari posse. Pariter Circeen (vel Cytheream) numulinam Lamarckii a clar. A. Adams l. c. pag. 132. commemoratam pro varietate tantummodo Circes scriptae habendam esse suspicor.

*Circe divaricata* Chemn. (Venus).

Conch. Cab. vol. 6. pag. 317. Tab. 30. fig. 316. Venus discors Spengl. in Schröt. Einl. vol. 3. pag. 199. Tab. 8. fig. 11. Cytherea testudinalis Lam. anim. sans vert. vol. 6. pag. 325. Cyth. aequivoca Sow. (non Chemn.).

Tria specimina exstant.

*Circe aequivoca* Chemn.

Conch. Cab. vol. 11. pag. 229. Tab. 202. fig. 1980. = Cytherea placunella Lam. anim. sans vert. vol. 6. pag. 325.

Simidsu, A. Adams.

Unicum specimen inter Mollusca Japonica exstat, certa loci natalis indicatione carens.

*Circe dispar* Chemn. (Venus).

Conch. Cab. vol. 11. fig. 1981. 1982.

Specimina Japonica minora adsunt pictura pallida, paulum decolorata; majora Ceylonica clar. Rob. de Schlagintweit ex itinere suo reportavit et mecum communicavit.

Cum hac specie certe Cythereae muscaria et pulicaris Lam. jungendae sunt, quae vix varietates repraesentant.

*Circe gibbia* Lam. (Cytherea).

Hanc speciem pariter ut concham Japonicam enumeravit clar. A. Adams l. c. pag. 233. Cytherea ranella Lamarckii est status ejusdem speciei juvenilis; valvae aetate proveciore tumescunt.

**Genus Lioconcha Mörch.**

*Lioconcha fulminea* Bolten.

Chemnitzii Conch. Cab. vol. 6. pag. 369. 370. Mörch Cat. Yold. 2. pag. 26.

Specimen unicum adest.

Haec species saepius pro varietate Veneris (Cythereae) castrensis Linnaei habita est et hodie habetur, sed pictura aliena formaque magis cordiformi constanter differre mihi videtur. Certe est Cytherea ornata Lamarckii (Anim. sans vert. vol. 6. pag. 309.), quam Deshayes cum Cytherea castrensi Lin. conjunxit.

*Lioconcha ornata* Dillw.

Cat. 1. pag. 184. = castrensis var. Chemn. Conch. vol. 6. fig. 379—381 = Cytherea picta Lam. anim. sans vert. 6. pag. 309.

Specimen unicum grande exstat.

### Genus *Dosinia* Scopoli.

#### *Dosinia Japonica* Reeve (Artemis).

Conch. icon. Artemis spec. 17. Sowerby Thes. Conch. Tab. 143. fig. 60. Lischke Moll. Jap. vol. 1. pag. 127. A. Adams l. c. pag. 233.

Hakodate, Jedo etc.

Inter specimina complura unum exstat giganteum fere 90 mill. longum tam habitu quam sulcis concentricis remotioribus et sculptura crassiore a forma usitata discrepans. Sine dubio illa varietas insignis huc pertinet, quam clar. Lischke in Moll. Jap. vol. 3. pag. 88. jam commemoravit.

Haec concha vulgaris a Japonis „Suji-gahi“ nominatur.

Specimina juniora *Dosinae* Roemeri Dkr. simillima sunt, quae vero species area lunulaque roseis nec non sinu pallii paulum diverso, quod sciam, constanter distingui potest.

#### *Dosinia Troscheli* Lischke.

Malak. Bl. vol. 21. pag. 24. Jap. M. Couch. vol. 3. pag. 89. Tab. 8. fig. 1. 2. 3.

Ad litora Japoniae meridionalis invenitur.

#### *Dosinia bilunulata* Gray (Artemis).

Analyst. Quart. Journ. 1838 pars 24. pag. 309. Hanl. Enlarged edit. of Lamark's spec. of Shells pag. 107. Tab. 15. fig. 44. Reeve Conch. icon. spec. 22. Roem. Monogr. *Dosinia* pag. 83. Tab. 16. fig. 1.

Tria specimina illaesa exstant radiis latis fuscis interruptis ornata.

Hanc concham speciosam et mirabilem clar. Siebold primus ex Japonia attulit. Conf. Roemeri Monogr. pag. 83.

#### *Dosinia biscocta* Reeve (Artemis).

Conch. icon. spec. 55. Adams Veneridae l. c. pag. 233.

Japonia Siebold. Seto-Uchi, Moseki A. Adams.

#### *Dosinia Gruneri* Phil. (Artemis).

Zeitschr. für Malakoz. 1848. pag. 132. Phil. Abbild. vol. 3. pag. 23. Tab. 8. fig. 2.

Unicum specimen exstat jam antea ex Japonia acceptum. Specimen Sinense, quod beato Cuming debeo, plane respondet.

#### *Dosinia laminata* Reeve (Artemis).

Conch. icon. spec. 41.

Unicum specimen adest icone Reeveana paulo minus. Concha pariter in Mari Sinensi, Japonico et in Philippinis insulis invenitur.

#### *Dosinia Sieboldii* Reeve (Artemis).

Conch. icon. spec. 39. Roem. Mon. pag. 56. Tab. 16. fig. 4.

Japonia Siebold. Cl. Adams l. c. p. 233 hanc speciem cum Venere prostrata Linnaei (errore typographico rostrata) conjunxit, quae vero habitum offert longe alienum.

*Dosinia sericea* Reeve (Artemis).

Conch. icon. spec. 36. Roem. Mon. pag. 69.

Seto-Uchi. A. Adams l. c. pag. 233.

*Dosinia angulosa* Phil. (Artemis).

Abb. vol. 2. pag. 229. Tab. 6. fig. 1. (1847). *Artemis penicillata* Reeve Conch. icon. spec. 32. (1850), pariter Adams l. c. pag. 234.

Clar. Philippi Art. subquadrata Hanl. (Enlarged edit. of Lamarck's species of shells Tab. 15. fig. 39) cum signo interrogationis huc refert, sed haec species ad *Cyclinas* pertinet, quod jam docuit Roemer Mon. pag. 74.

Tsu-shima. Adams.

*Dosinia Traillii* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1855. pag. 223.

Malacca Dr. Traill, Yoko-hama A. Adams.

Hanc speciem mihi prorsus ignotam *Dosinia* Gruneri affinem esse affirmat clar. Adams.

*Dosinia histrio* Gmel. (Venus).

Art. lirata Sow. Thes. vol. 2. pag. 675. Tab. 144. fig. 85. cfr. Roemer Monogr. pag. 33. Pariter *Artemis scabra* Phil. Zeitschr. für Malak. 1849. pag. 19. huc pertinere videtur. Clar. Adams eam pro specie genuina habet.

Goto. A. Adams.

*Dosinia gibba* A. Adams.

Tab. nostra 8. fig. 4. 5. 6.

Testa orbicularis subcordata tumida, parum inaequilatera, lutescenti-alba, solida, concentricè costellata, costellae subdistantes marginem versus anticum et posticum subdichotomae; umbones tumidi porrecti; area angusta; lunula magna cordiformis sulco levi terminata; ligamentum immersum; sinus pallii ut in *Dosiniis* solet lingulatus usque ad mediam testam extensus. — Long. 20 mill. Long., alt., crass. ratio numeris 100, 90, 50 respondet.

Tatsumi. (Cfr. Veneridae found in Japan Ann. and Mag. Nat. Hist. 1869. pag. 234.)

Icones nostrae a specimine desumtae sunt, quod ipse auctor instituto Senckenbergiano Frankofurtano miserat.

Praeterea clar. Adams l. l. inter *Dosinias Japonicas* *Dosiniam* meam *Isocardiam* enumeravit mihi tantum e sinu Guineensi notam.

*Dosinia orbiculata* Dkr.

Tab. nostra 8. fig. 12. latus externum, 13. l. internum, 14. tergum.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 69.

Testa ambitu paene circulari, convexiuscula inaequilatera, liris concentricis densis non exacte regularibus ad umbones tenerrimis vix conspicuis, marginem versus sensim elevationibus instructa; color externus et internus albus paene flavescens; umbones subacuti, prominuli, laeviusculi et nitidi, vix intorti, in  $\frac{2}{3}$  longitudinis siti; lunula paululum porrecta cordiformis sulco profundo

terminata; area angusta vix conspicua; ligamentum angustum ut in genere solet immersum; sinus pallii profundissimus admodum erectus, ultra medium testae extensus. — Long. 27 mill., totidemque altit.

In collectione Molluscorum Japonica unum tantum specimen inventum est sine certa indicatione loci natalis.

Haec species inter omnes mihi notas, fossiles non exclusas, habitu paene exacte circulari insignis, imo etiam Dosiniam circularem Roemeri hac ratione superat, quae postice subangulata est, ne dicam de aliis differentiis.

### Genus *Cyclina* Desh.

#### *Cyclina orientalis* Sowerby (Artemis).

Thes. Conch. vol. 2. pag. 661. Tab. 144. fig. 79. = *Cyclina pectunculus* Roem.

Specimen magnificum huius conchae Japonicae exstat in collectione conchyliorum Loebbeckei Dusseldorpi 71 mill. latum, 69 altum, paene rotundatum, valde inflatum. — Haec species, generis sui maxima, epidermide luteo-aurantia nitida tenui sed firma obducta est.

#### *Cyclina Chinensis* Chemnitz (Venus).

Conch. Cab. vol. 10. pag. 356. fig. 1663. *Cyprina tenuistria* Lam. anim. s. vert. vol. 6. pag. 291. *Artemis Chinensis* Reeve Conch. icon. spec. 6.

Species ambitu, magnitudine et colore variabilis plerumque cordata vel oblique subquadrata et inflata est, rarius minus convexa ambitu paene circulari, ut specimen Jokohamense docet a clar. Pöhl navarcho quondam acceptum. Specimina Chinensia exstant in collectione nostra gigantea, Japonica a clar. J. Rein reportata, multo minora sunt.

*Cyclina intumescens* Roemeri (cfr. Dkr. Novit. conch. pag. 49. Tab. 16. fig. 1. 2. 3) multis exemplaribus nunc comparatis mea quidem opinione nil est nisi varietas nostrae speciei.

#### *Cyclina flavida* Deshayes.

Cat. Conchif. Brit. Mus. pag. 31.

Tsu-shima A. Adams. Specimina Chinensia haud differunt.

### Genus *Clementia* Gray.

#### *Clementia papyracea* Gray.

*Venus papyracea* Gray in Wood Suppl. Tab. 2 fig. 8. = *Venus hyalina* Phil. Abb. vol. 3. pag. 39. 83. Tab. 10. fig. 6.

Nova Hollandia Sow., Philippinae insulae H. Cuming.

Specimen unum exstat in collectione Molluscorum Japoniae sine certa loci natalis indicatione.

Praeterea clar. A. Adams in Ann. and Mag. Nat. Hist. m. Martii 1869 pag. 234 *Clementiam* similem Sow. (Thes. Conch. vol. 2. pag. 700. Tab. 151 fig. 154) cum signo quidem interrogationis nec non *Clementiam* Moretonensem Desh. (Proc. Zool. Soc. 1853. pag. 18) pro conchis Japonicis enumeravit, mihi prorsus ignotas.

**Genus Tapes Megerle de Mühlfeldt.**

**Tapes exaratus Philippi (Pullastra).**

Abb. vol. 2. pag. 109. Venus Tab. 5. fig. 6. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 680. Tab. 145. fig. 18.

Kuro-shima teste A. Adams.

In collectione conchyliorum nostra specimina exstant e mari Japonico et sinu Arabico habitu plane congruentia.

**Tapes liratus Philippi (Venus).**

Abb. vol. 3. pag. 76. Venus Tab. 7. fig. 5.

Specimina juniora exstant Japonica pallidiora ceteroquin plane convenientia cum icone supra citata, quae desumpta est a specimine magno collectionis nostrae.

**Tapes sulcarius Lamarck (Venus).**

Anim. sans vert. ed. alt. vol. 6. pag. 354. Sowerby Thes. Conch. vol. 2. pag. 685. Tab. 146. fig. 30. 31. 32.

Concha habitu, sculptura picturaque variabilis. Specimen quod adest ex Japonia unicum, pictura subreticulata pallida et languida maculisque nonnullis majoribus fuscis radiatim ordinatis insigne est. Tapes Dëshayesii Hanley simillimus, sed minor, nescio an sit rectius ut varietas tantum minor cum hac nostra specie jungendus.

**Tapes undulatus Born (Venus).**

Mus. Caes. Vind. pag. 67. Venus rimosa Phil. Abb. vol. 3. Tab. 7. fig. 7. Tapes rimosa Sow. Thes. vol. 2. pag. 682. Tab. 146. fig. 29.

Specimina nondum adulta exstant. Haec species Tapeti textrici Chemnitzii affinis, valvis tenuioribus lineisque rimosis transversis mediam testam tenentibus facile distingui potest.

**Tapes euglyptus Philippi (Venus).**

Zeitschr. f. Malak. 1847. pag. 89. Abb. vol. 3. pag. 76. Tab. 7. fig. 3. (Specimen originale coll. nostrae sine indicatione patriae.)

Specimen alterum exstat ex Japonia (Nagasaki) acceptum. Specimina majora sunt et paululum differunt ambitu.

**Tapes Schnellianus Dunker.**

Cfr. Nov. Conch. pag. 75. Tab. 25. fig. 7. 8. 9.

Litus Japonicum prope Nagasaki. Apud Japanos haec concha „Suri gahama“ nominatur.

**Tapes amabilis Philippi (Venus).**

Zeitschr. f. Malak. 1847. pag. 90. Abb. vol. 3. pag. 75. Tab. 7. fig. 2. Sow. Thes. Tab. 145. fig. 11.

Tria specimina in collectione Loebbeckei Dusseldorpini asservantur, unum curtum et solidum in mea.

**Tapes vernicosus Gould (Pullastra).**

Otia Conch. pag. 168.

Hakodate. Tatiyama (A. Adams. Veneridae found in Japan. pag. 235).

Haec species eximia in nostra collectione deest.



*Tapes Greeffei* Dkr.

Tab. nostra 8. figg. 15. 16. 17.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 67.

Testa ovato-elliptica, ventrosa, antice subattenuata, postice paululum obtusior, in margine ventris regulariter modiceque arcuata, costis crassis rotundatis, nonnullis antice dichotomis, cincta; costae in utroque latere postico abrupte evanidae, ad aream vero fortiter expressae; umbones tumidi laeves; lunula areaque lanceolatae, parum distinctae; ligamentum angustum submersum. Color et pictura variabiles; in fundo rubente, rarius roseo, strigis fuscis vel castaneis, interdum nigrescentibus, angulatis vel flexuosis et subreticulatis radiisque macularum irregularium quaternis plus minusve vividis variegata est concha. Color internus albus, interdum subroseus vel pallide rufescens. Sinus pallii magnus linguaeformis. Epidermis pallide cornea tenuissima sed firma. — Testae adultae 55—58 mill. longae sunt earumque dimensionis ratio numeris 100, 64, 42 respondet.

Multa specimina exstant pulcherrima ex parte a clar. J. Rein ex Japonia reportata; nonnulla pictura pallidior et languida quondam ex Andamanis insulis accepi. Omnia inter se congruunt excepto quidem colore variabili.

Haec concha Tapeti semirugato Phil. (Abb. vol. 3. pag. 76. Tab. 7. fig. 4.) similis est, sed statura tumidiore, ambitu paene elliptico, margine dorsi antico ad lunulam minus cavato, umbonibus subtumidis, area profundiore, costis in margine dorsi haud evanidis, imo valde distinctis constanter differt. *Tapes inflatus* Desh. (Proc. Zool. Soc. 1853. pag. 8. Tab. 19. fig. 3.) pariter affinis, testa multo tumidiore, margine dorsi antico et lunula excavatis, omnino toto habitu et costarum indole aliena, facile distinguitur.

Concha in nonnullis Japoniae regionibus ex. gr. ad Kagoshima frequentissima, incolis nutrimento est; mirandum itaque est eam a conchyliologis ad hoc tempus neglectam fuisse.

Clar. Ricardo Greeff zoologo, amico conjunctissimo, hanc speciem dicatam esse volui.

*Tapes (Cuneus) Philippinarum* A. Adams et Reeve (Venus).

Zool. Voy. Samarang Moll. pag. 79. Tab. 22. fig. 10. *Venus decussata* var. *Japonica* Dunker Moll. Japon. pag. 26. *Venus Indica* Hanl. *Tapes Japonicus* et *semidecussatus* Desh. *Tapes denticulatus* Sowerby Thes. vol. 2. pag. 694. Tab. 150. fig. 114. *Tapes ducalis* Roemeri varietas est concinne lineata. Clar. Adams *Venerem Philippinarum*, *Japonicam* et *Indicam* pro meris speciebus habet.

Testae quae exstant maximae usque ad 60 mill. longae a Venere decussata Europaea Linnaei vix discernendae mihi videntur. Fortasse haec species permutabilis nil est nisi varietas ejusdem. Ad iudicium certum in hac quaestione assequendum bestiolae utriusque conchae Europaeae et Indicae investigentur necesse est.

Clar. Lischke de hac concha, quae Japonis est cibus magni aestimatus, et ab iis „Asari“ nominatur, uberrime jam disseruit in Moll. Jap. vol. 1. pag. 115. et vol. 3. pag. 78.

*Tapes (Cuneus) variegatus* Hanley.

Sowerby Thes. vol. 2. pag. 696. Tab. 151. fig. 133—138.

Specimina minora exstant testa ovato-elliptica compressiuscula, costulis radiantibus subtilioribus subaequalibus ab antecedente facile distinguenda. Specimina collectionis nostrae, quae ex Philippinis et Java insulis originem ducunt, duplo fere majora sunt.

**Tapes (Cuneus) Bruguieri Hanl. (Venus).**

Wood Ind. Suppl. Tab. 15. fig. 59.

quem clar. A. Adams pro concha Japonica enumeravit (l. c. pag. 235.) ex icone tantum mihi notus est.

**Tapes diversus Sow.**

Thes. Conch. vol. 2. pag. 697. Tab. 146. fig. 41. Venus (Murcia) Petitii Desh. Schrenck Reisen im Amurl. Moll. pag. 526.

Haec species e California satis nota Schrenckio teste etiam in aquis Japoniae septentrionalibus obvenit.

**Genus Saxidomus Conrad.**

**Saxidomus purpuratus Sowerby (Tapes).\*)**

Thes. Conch. vol. 2. pag. 692. Tab. 150. fig. 124. 125. (icones in minorem modum redactae). Lischke Moll. Jap. vol. 1. pag. 127. Tab. 9. fig. 4. 5.

Jedo, Hakodate etc.

Praeterea A. Adams Saxidomum aratam Gould (Otia Conch. pag. 168.) in indice Venerinaceorum Japoniae enumeravit (l. c. pag. 235.), speciem e California notam, antecedenti simillimam quae colore tantum purpureo interno deficiente differt. Huc quoque Saxidomus Nuttallii Conr. pertinere videtur.

**Genus Rupellaria Fleur. de Bellev.**

**Rupellaria monstrosa Chemn. (Venus).**

Conch. Cab. vol. 7. pag. 50. Tab. 42. fig. 445. 446.

Duo specimina exstant testa valde irregulari et singulari icone Chemnitziana paulo minora, colore interno purpurascente carentia.

Clar. A. Adams hanc concham prope Tsu-shima et Oki-no-shima invenit lapides fissos et Corallia perforans. Ann. Mag. Nat. Hist. 1869. pag. 236.

**Rupellaria Irus Lin. (Donax).**

Syst. Nat. ed. 10. pag. 683. ed. 12. pag. 1128. (breviter sed optime adumbrata). Venerupis Irus Lam. anim. sans. vert. ed. 2. vol. 6. pag. 163. Cfr. Weinkauff Conch. des Mittelme. vol. 1. pag. 91.

Specimina tria lecta sunt, quae nullo modo a concha Maris Mediterranei separari possunt.

**Rupellaria semipurpurea Dunker.**

Testa oblonga plus minusve truncata, convexa, inaequilatera, solida, alba vel flavidula, lamellis densis elevatis parum regularibus costellisque radiantibus concinne sculpta; umbones parvuli; cardo ut in genere solet utriusque valvae irregulariter bidentatus; color internus antice albus, postice obscure purpureus.

Duo specimina exstant in collectione Molluscorum Japonica sine certi loci natalis indicatione.

Conchula nostra varietatibus quibusdam speciei antecedentis haud dissimilis est, sed testa multo solidiore, sculptura subtiliore et pictura interna purpurea maxime differt.

---

\*) Saxidomus est generis feminini, inde rectius scribitur purpurata.

**Rupellaria insignis** Desh. (Venerupis).

Proc. Zool. Soc. 1853. pag. 6. Tab. 18. fig. 4. Sow. Thes. Conch. vol. 2. pag. 765. Tab. 164. fig. 5. 6.

Clar. D. Brauns lapidem tofaceum detritum in sinu Jedoënsi lectum misit hac specie penitus repletum. Pariter in Nova Seelandia obvenire dicitur.

Praeterea clar. Adams in indice suo pag. 235 etiam has species enumeravit:

**Rupellariam exoticam** Lam. (Venerupin).

Quae mihi est species dubia.

**Rupellariam carditoidem** Lam. (Venerupin).

Delessert Rec. Tab. 5. fig. 3.

antea e Nova Hollandia sola notam et

**Rupellariam macrophyllam** Desh. (Venerupin).

Cat. Conchif. Brit. Mus. pag. 193.

Hae conchae lapides vel Corallia perforantes habitu permutabiles sunt et saepius conformatione quadam monstruosa laborant, quapropter difficile est dijudicatu, utrum formae quaedam sint genuinae, an potius abnormes.

**Genus Petricola** Lam.

**Petricola Japonica** Dkr.

Tab. nostra 9. fig. 4. 5. 6.

Testa solidula luteo-alba, convexa, valde inaequilateralis, antice brevissima aequaliterque curvata, postice producta attenuata, interdum oblique truncata, striis concentricis irregularibus ex parte confluentibus vel subdichotomis postice lamellosis instructa; umbones parvuli rotundati parum porrecti; ligamentum a latere externo vix conspicuum, foveam tenet latam paululum obliquam. Cardinis formatio in icone distincte expressa, universe Petricularum generi respondet. — Specimina majora 23—28 mill. longa sunt.

Frequens invenitur in litore prope Kisenuma Oceani pacifici lapides calcareos crystallinos penetrans, qui ad formationem sic dictam transitionis pertinere videntur.

Inter Petricularum species nullam novi cum his testis singularibus comparabilem.

Genera Petricularum atque Rupelliarum quod attinet ad eorum cardinis structuram, certis finibus separanda esse mihi non videntur. Inquisitiones specierum plurimarum anatomicae ad hunc diem desiderantur.

**Genus Coralliophaga** Blainville.

**Coralliophaga lithophagella** Lam. (Cardita).

Chama coralliophaga Chemn. Conch. Cab. vol. 10. pag. 359. Tab. 172. fig. 1673. 1674. (icones optima sed magnitudine insolita). „Testa cylindrica alba, diaphana, longitudinaliter et transversaliter striata, striis arcuatis transversis, infra subfoliaceis seu imbricatis“. — Cardita dactylus Brug. Dict. no. 13. Chama coralliophaga Dillw. Cat. vol. 1. pag. 220. Coralliophaga carditoides Blainv. Malac. Tab. 76. fig. 3. Lam. Anim. sans vert. vol. 6. pag. 435. Deless.

Dunker, Moll. Jap. mar.

Rec. Tab. 11. fig. 11. var. lata. H. et A. Adams gen. of rec. Moll. vol. 2. pag. 439. Tab. 109. fig. 6. et 6a. (forma typica) *Cypricardia Hornbeckiana* d'Orb.

Haec concha *Corallia* penetrans, jam longo ex tempore in insulis Antillis inventa est. Exemplaria nostra Japonica nihil differunt ab iis, quae beatus Hornbeck in insula Sancti Thomasii quondam legit et mecum communicavit.

### Genus *Trapezium* Meg. de Mühlfeldt.

#### *Trapezium vellicatum* Reeve (*Cypricardia*).

Proc. Zool. Soc. 1843. Conch. icon. vol. 1. spec. 7. (icon a specimine giganteo desumpta est).

Haec concha pro aetate maximopere variat habitu. Specimen vetustum collectionis nostrae multis lamellis obtectum, ambitum exacte reniformem ostendit. Plerumque testa strigis nonnullis fuscis picta et latere interno, praesertim marginem versus posticum colore fusco tincta est; exstant quoque specimina tota alba.

Exemplaria nostra Japonica Chinensibus et iis, quae beatus Cuming ex Philippinis insulis quondam reportavit, omnino respondent.

In indice Adamsiano desideratur.

#### *Trapezium angulatum* Lam. (*Cypricardia*).

Anim. sans vert. vol. 6. pag. 438. Wood Ind. Test. Suppl. Tab. 2. fig. 2. *Chama oblonga* var. Chemn. *Cypricardia oblonga* Sow. Gen. of Shells.

Unum specimen adest speciei ex Philippinis insulis respondens.

Oki-no-shima, in Madreporis degens. A. Adams l. l. pag. 236.

#### *Trapezium rostratum* Lam. (*Cypricardia*).

Anim. sans vert. vol. 6. pag. 439.

Tsu-shima. Ostrearum testas perforans. A. Adams ibid.

Hanc concham cum Deshayesio pro varietate antecedentis declaraverim.

#### *Trapezium liratum* Reeve (*Cypricardia*).

Proc. Zool. Soc. 1843. Conch. icon. *Cypricardia* spec. 1.

Singula valva confracta et adesa exstat, quae fortasse huc pertinet.

## Cardiacea.

### Genus *Cardium* Lin.

#### *Cardium Burchardi* Dkr.

Tab. nostra 15. fig. 4. 5. 6.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 67.

Testa oblique ovata plano-convexa, antice aequaliter arcuata, postice subtruncata, costis 40—42 instructa; costae planae aequales utrinque crenulatae, superne obsolete rugosae paene laeves, costae postremae aream terminantes angustiores crenato-muricatae; sulci — costarum interstitia — angusti et profundi transversim striati; umbones porrecti; cardinis dentes laterales antici in

utraque valva crassi ac longi; color externus flavo-albidus, maculis pallide rufis variegatus; epidermis tenuis pallide cornea; latus internum lacteum, sub umbonibus roseum, margo pallide rufescens. — Specimen quod exstat maximum 71 mill. altum est ejusque alt., long. et crass. ratio numeris 100, 82 et 53 respondet.

In litore prope Sagami Japoniae invenitur.

Hanc speciem singularem, amico Guilielmo Burchard dedicatam, nusquam alibi descriptam aut depictam inveni. Valvis compressiusculis, postice subtruncatis ideoque Limarum quarundam habitum quasi referentibus nec non dente cardinis in utraque valva antico valido potissimum insignitur.

#### *Cardium Californiense* Desh.

Revue Zool. par la Soc. Cuvierienne 1839. pag. 360. Midd. Mal. Ross. vol. 3. pag. 40. Tab. 15. fig. 23—25. Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 144. vol. 3. pag. 125.

Specimina tantum minora exstant. *Cardium corbis* Martyn Univ. Conch. Tab. 80.  
= *Cardium Nuttallii* Conr. species cognata est.

„Ishi-kage gai“ Japanorum.

#### *Cardium arenicola* Reeve.

Conch. icon. vol. 2. spec. 78. *Card. maculosum* Sow. nec Wood.

Specimen nostrum plane convenit cum icone supra laudata a specimine ex insula Ticao Philippinarum desumta.

Reeve male scripsit „arenicolum“.

#### *Cardium exasperatum* Sowerby.

Proc. Zool. Soc. 1840. Conch. Ill. fig. 37. Reeve Conch. icon. vol. 2. spec. 107.

Specimen minus opacum quasi subfossile exstat in Museo Frankofurti ad Moenum a clar. A. Adams nomine *Cardii asperulati* notatum, sed totius structurae indole a *Cardio exasperato* Sowerbyi haud diversum.

Ad *Ctenocardias* H. et A. Adams pertinet.

#### *Cardium modestum* A. Adams et Reeve.

Voy. Samarang. Zool. Moll. pag. 77. Tab. 22. fig. 6.

Species sculptura sua singularis. Testa tenuicula postice subangulata, costis radiantibus minutissimis et area postica perspicue cancellata acute terminata insignis, cinereo-flavescens, strigis nonnullis pallide fuscis evanidis notata. Haec sculptura simili modo in *Protocardiis* invenitur, sed nostra species sinu pallii prorsus caret, ne dicam de margine omnino crenulato.

#### *Cardium muticum* Reeve.

Conch. icon. *Cardium* spec. 32. *Cardium Japonicum* Dkr. Moll. Jap. pag. 28. Tab. 3. fig. 16.  
= *C. papyraceum* Schrenck.

Haec species Japonis est cibus magni aestimatus.

*Cardium apertum* Chemn.

Conch. Cab. vol. 6. pag. 189. Tab. 18. fig. 181—183. *C. rugatum* Gron. Zooph. Reeve Conch. icon. *Cardium* fig. 63. cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 173. vol. 3. pag. 106. ubi synonyma allata sunt.

Quod attinet ad sculpturam et epidermidis indolem *Cardio* mutico simile est, quod vero postice non hiat.

*Cardium liratum* Sowerby.

Proc. Zool. Soc. 1840. Reeve Conch. icon. *Cardium* spec. 12.

Specimen grande ex Japonia allatum est 60 mill. longum, 62 altum, plane conveniens speciminibus a beato Roberto Rodatz navarcho in insula Zanzibar quondam lectis. Clar. H. Cuming hanc concham ex Philippinis insulis reportavit.

Haec species costis radiantibus crassioribus, statura majore nec non maculis rufis vel rosaceis plane deficientibus a *Cardio* pectinato Linnaei vel aeolico Bornii facile distingui potest.

Utraque species sculptura singulari, praesertim costis obliquis anticum testae latus tenentibus notatur. Praeterea accedunt *Cardia* simili structura insignia, aurantiacum scilicet et Kalamantanum (Adams et Reeve Samarang pag. 77) nec non species fossiles: *Cardium* Helveticum Mayer (Verst. des Parsian pag. 34. Tab. 1. fig. 22) aliaeque.

Hae conchae cum *Laevicardiis* Swainsoni plerumque conjunctae, propriam sane et bene distinctam *Cardiorum* divisionem formant, ita ut speciebus supra citatis nomen sic dictum subgenericum imponatur necesse habeam, qua de causa denominatio „*Divergicardium*“ apta et idonea mihi videtur.

*Cardium* liratum a Japonis „Gin-gio“ nominatur.

*Cardium retusum* Lin.

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1121. Reeve Conch. icon. vol. 2. *Cardium* spec. 103.

Specimen minus paululum detritum. Haec species saepius commixta est cum *Cardio* auricula Forskålii multo majore satis diverso (conf. Fauna Arabica pag. 122) ex gr. a Chemnitzio (Conch. Cab. vol. 6. pag. 147) pariter a Gmelino, qui Chemnitzium semper ducem habet et ipsi temere assentire solet.

*Cardium* retusum ad *Lunulicardias* pertinet ob lunulam peculiarem profundissime impressam, divisionem *Cardiaceorum* bene terminatam formantes.

*Cardium Groenlandicum* Chemn.

Conch. Cab. vol. 6. pag. 202. Tab. 19. fig. 198. Schrenck Reisen im Amurl. vol. 2. Moll. pag. 516.

Fretum Tataricum (Lindholm).

De lata huius speciei in aquis arcticis dispersione conf. Schrenck l. l.

*Cardium Bechei* Adams et Reeve.

Tab. nostra 15. fig. 1. 2. 3.

Zool. of the Voyage of H. M. S. Samarang Moll. pag. 78. Tab. 22. fig. 12.

Testa crassiuscula, rotundato-cordata, globosa, postice subtruncata, striis incrementi tenuibus densissimis inaequalibus cincta costisque obsoletissimis plurimis (centenis et nonnullis) radiata; area postica lata cordiformi, costis spinosis 24—26 distincte acuteque terminata insignis; color

externus roseus cingulis nonnullis vividioribus variegatus, costulae pallidiores; color internus albus; margo conchae crenatus, postice roseus. Cardinis structura ut in genere solet. Valva dextera dente mediano valido erecto et curvo munita, sed linea pallii postice leviter sinuata; umbones conchae tumidi porrecti mediam fere testam tenent. Epidermis pallide cornea fibrata, sericeo nitens, tenera atque decidua in area postica plane deest. Testa 63 mill. alta. Alt., longit. et crass. ratio numeris 100, 95 et 70 respondet.

Species pulcherrima delectans costulis striisque minimis minutissime decussata, paene glabrata, postice vero area costata acuteque terminata valde singularis. Excepto Cardio modesto nullum aliud inter species vivas Cardium hucusque mihi innotuit tali structura. At vero inter species telluris tertiariae fossiles nonnullae inveniuntur in postico tantummodo latere perspicue costatae ex. gr. Cardia Hoernesii, Wateleti, fraterculus, parile et semiasperum, quae clar. Deshayes cum Protocardiis conjunxit, sed Protocardiae Beyrichii verae (Cardium hillanum Sow. e formatione cretacea, Philippianum Dkr. e formatione Lias dicta aliaeque) in margine tantum postico crenatae sunt. Nihilo minus tamen nostra concha, quod imprimis urgendum est, propter pallii sinum, etsi leviter expressum, generi Beyrichiano propius accedit quam ullae Cardiorum sectioni, cum marginis formatio sive crenata, sive non crenata, in Molluscis acephalis multo minoris sit momenti.

Unum specimen et singula valva cum epidermide optime conservata in collectione Molluscorum Japonica exstant.

Clarissimi A. Adams et Reeve duas tantummodo valvas singulas minores l. c. commemorant, alteram inter insulas Borneo et Mindanao in profundo maris deprehensam, alteram ex archipelago Coreano captam.

Haec species a Japonis „Kin-gio“ nominatur.

Notandum est pictorem lineam pallii in icone nostra 3 nimis latam et distinctam delineavisse.

## Isocardiacea.

### Genus Isocardia Lam.

*Isocardia tetragona* A. Ad. et Reeve.

Voy. Samar. Moll. pag. 76. Tab. 22. fig. 1.

Mare Japonicum.

*Isocardia Moltkiana* Chemn. (Chama).

Conch. Cab. vol. 7. pag. 105. Tab. 48. fig. 484—487. Voy. Samar. pag. 77. Tab. 22. fig. 3. var. sanguineo-maculata.

Fretum Coreanum.

Haec varietas rarissima inter Mollusca nostra Japonica exstat sine certa indicatione loci natalis.

### Genus Cardilia Desh.

*Cardilia semisulcata* Lam. (Isocardia).

Tab. nostra 8. fig. 1. 2. 3.

Lam. Anim., sans vert. ed. 2. vol. 6. pag. 447. *Cardilia semisulcata* ibid. pag. 450. H. et A. Adams Gen. of rec. Moll. vol. 2. pag. 462. Tab. 112. fig. 6. 6a. Reeve Conch. icon. *Cardilia* spec. 1. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 173. vol. 3. pag. 104.

Singulae valvae et specimen integerrimum epidermide tenuissima obductum exstant.

Animal huius generis ad hoc tempus ignotum est ideoque quaeritur num concha nostra hic recte collocata sit; habitus quidem Bucardiis vel Isocardiis respondet, sed cardinis structura valde singularis aliquo modo Mastracea in mentem vocat.

Tres tantum species recentes vel vivae nunc innotuerunt: nostra Cardilia semisulcata, C. inermis et C. Martini Desh. praeterea fossiles enumeravit Deshayesius Cardiliam Michelotti et C. Michelini. Omnes postice sulcatae sunt.

### Genus *Verticordia* Searles Wood.

*Verticordia Japonica* A. Adams.

Ann. and Mag. Nat. Hist. Mart. 1862. pag. 224.

Insula Goto.

*Verticordia multicostata* A. Adams.

l. c. ibid.

Hoc genus mirabile antea in Gen. of rec. Moll. vol. 2. pag. 531. Trigoniaceis injunctum est, fortasse ob structuram testae ejusque splendorem margaritaceum internum, sed postea A. Adamsius suspicatus est has conchas Bucardiaceis vel Isocardiaceis inserendas esse. — Exigua tantum specierum copia hodie innotuit.

Conf. genus Hippagus J. Lea Contributions to Geology pag. 72. et Philippi Enum. Molluscorum Siciliae vol. 2. pag. 41.

## Chamacea.

### Genus *Chama* Lin.

*Chama imbricata* Brod.

Transact. Zool. Soc. vol. 1. pag. 304. Tab. 39. fig. 2. Reeve Conch. icon. vol. 4. Chama spec. 3.  
Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 126. Tab. 9. fig. 4. var.

Plures valvae juniores in collectione Molluscorum Japoniae exstant coccineae et aurantiae, ex parte purpureae, quae ad hanc speciem pertinere videntur.

*Chama ambigua* Lischke.

Malak. Bl. vol. 17. pag. 28. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 128.

Nagasaki.

Haec species mihi dubia est; fortasse ad praecedentem pertinet.

*Chama semipurpurata* Lischke.

Malak. Bl. vol. 17. pag. 27. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 130. Tab. 8. fig. 1.

Nagasaki.

Species pariter mihi dubia.



*Chama retroversa* Lischke.

Malak. Bl. vol. 17. pag. 28. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 131. Tab. 9. fig. 1—3.

Nagasaki.

*Chama Dunkeri* Lischke.

Malak. Bl. vol. 17. pag. 27. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 128. Tab. 8. fig. 3. 4.

Nagasaki.

Quod hanc attinet ad speciem non longe absum quin credam varietatem tantum esse *Chamae pacificae* Broderipii. In hisce conchis admodum variabilibus et ambiguis lapidibus aliisve corporibus marinis affixis ideoque irregularibus difficillima est terminatio, vel adeo nonnunquam effici plane non potest, nisi plurima exemplaria adsunt ut comparentur.

*Chama aspersa* Reeve.

Conch. icon. vol. 4. Chama spec. 24.

Specimen *Chamae* parvae exstat a clar. J. Rein lectum, quod ad *Chamam* aspersam refero aliqua quidem haesitatione, cum testa ejus diversam formam et picturam offerat, sed indoles sculpturae, quae in determinandis hisce testis variabilibus majoris est momenti quam earum forma et pictura, generatim ac universe respondet.

Valva superior modice convexa, squamis creberrimis angustis fornicatis erectis marginem versus longioribus sub vitro rugulosis, valva vero inferior profunda squamis densis appressis margine latis et lamellatis instructa est. Valvarum margo internus laevigatus, haud crenatus. Color albus; valva superior ad umbonem, qui dextrorsum inclinatur, striga rosea notata.

Praeterea singulae *Chamae* cuiusdam valvae exstant, quae determinari nequeunt; pariter *Chama Japonica* Lam. (Anim. sans vert. vol. 6. pag. 587.) erui non poterat.

## Tridacnacea.

Genus *Tridacna* Bruguière \*).

*Tridacna squamosa* Lam.

Anim. sans vert. ed. 2. vol. 7. pag. 10. Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 160.

Ohosaka, Hiogo.

## Lucinacea.

Genus *Lucina* Brug.

*Lucina contraria* Dkr.

Tab. nostra 13. fig. 12. 13. 14. magn. aucta.

Testa parva, solida, alba, globoso-cordiformis, costulis concentricis irregularibus ex parte contrariis et dichotomis strigillisque minutissimis sub vitro vix conspicuis sculpta, antice paululum porrecta, postice sulco levi notata; umbones prominuli antrorsum inclinati; lunula excavata; liga-

---

\*) Genus *Chametrachaea* Kleinii pervarias complectitur conchas ideoque non est adoptandum.

mentum profunde immersum. Cardinis structura ut in Lucinis veris solet, dentes pro exiguitate valvarum crassiusculi; linea pallii et muscoli bene expressi; margo interne tenerrime crenatus. — Alt. 9 mill., latit. 8 totidemque fere crass.

Specimen unicum integerrimum prope Tokio lectum exstat.

Haec conchula sculptura singulari insignis est.

#### *Lucina divergens* Phil.

Abb. vol. 3, pag. 103. *Lucina* Tab. 2, fig. 4. *Lucina* fibula Ad. et Ree. Voy. Sam. Moll. pag. 80. Tab. 24, fig. 5. (spec. grande). Reeve Conch. icon. *Lucina* spec. 33. = *L. ramulosa* Gould Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 3, pag. 255. *Lucina* fibula Dkr. Moll. Jap. pag. 23.

Specimina tantum minora exstant in portu De-shimae lecta.

#### *Lucina Pisidium* Dkr.

Malak. Bl. vol. 6, pag. 227. Moll. Jap. pag. 28. Tab. 3, fig. 9. = *Lucina parvula* Gould. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2, pag. 132.

Portus De-shimae, Nagasaki etc.

Cum specie praecedente ad *Codokias* Scop. pertinet.

#### *Lucina quadrisulcata* Orb.

Voy. dans l'Amer. mérid. Moll. pag. 584. = *Lucina* (*Tellina*) *divaricata* Chemn. (non *Tellina* *divaricata* Lin.). Schrenck Reisen im Amurlande Moll. pag. 519.

Haec concha in insulis Antillis haud rara, etiam in freto Tatarico a clar. de Nordmann inventa esse dicitur. In collectione nostra Molluscorum Japoniae desideratur.

Inter *Lucinas* lineis *divaricatis* plus minusve impressis instructas, quae sectionem insignem constituunt, haec species facile cognoscenda est.

#### *Lucina edentula* Lin. (*Venus*).

Tab. nostra 8, fig. 7. 8. testa junior.

Mus. Lud. Reg. pag. 508, no. 74. Syst. nat. ed. 10, pag. 689, no. 122. Phil. Abb. vol. 2, pag. 206. Tab. 1, fig. 2. *Lucina Philippiana* Reeve Conch. icon. vol. 6, spec. 23.

Exemplaria juniora ab adultis plerumque differunt ambitu, qua de causa testa junior hic depicta est. Specimina integra et valvae singulae exstant.

Haec concha certe distincta est a *Lucina edentula* Chemnitzii, Lamarekii et aliorum scriptorum, quae ex Antillis insulis affertur.

Clar. Philippi l. c. de *Venere edentula* Linnaei vera accuratius jam disseruit. His clar. Reeve quidem obloquutus est, sed mihi comprobanda esse videntur, quae ille auctor exposuit.

*Lucina edentula* ad genus *Loripedum* Polii pertinet.

#### *Lucina corrugata* Dkr.

Tab. nostra 8, fig. 9, 10, 11.

Testa subelliptica paene aequilatera, compressa, postice subtruncata, concentrice striata et corrugata, plica angusta ab umbonibus acutis ad latus posticum decurrente insignita, color albo-flavescens. — Long. 26 mill. Long., altit. et crass. ratio circiter numeris 100, 75, 9 respondet.

Mare Japoniae mediterraneum.

Haec species anomalia quadam laborat, cum aetate juvenili striis quidem regularibus concentricis instructa sit, sed aetate proveciore striae illae incrementi corrugatae fiant. Cardo nil singulare offert; impressiones musculorum lineaque pallii nitidissimae sunt. Ceterum icones nostrae inspiciantur, sed plica antea commemorata a pictore omissa est.

Praeterea A. Adamsius in Ann. and Mag. Nat. Hist. 1862. pag. 225. harum concharum novem species in mari Japonico obvias descripsit, omnes ad Myrteam Turtoni pertinentes, quae hic sequuntur.

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Tsu-shima.                         | <i>Myrtea gibba</i> A. Adams.    |
| Portus Hamiltoni.                  | <i>Myrtea reticulata</i> A. Ad.  |
| Tabu-shima.                        | <i>Myrtea fimbriatula</i> A. Ad. |
| Tsu-shima.                         | <i>Myrtea lamellata</i> A. Ad.   |
| Tsu-shima, Minō-shima.             | <i>Myrtea plicatula</i> A. Ad.   |
| Tabu-shima.                        | <i>Myrtea obesula</i> A. Ad.]    |
| Tabu-shima.                        | <i>Myrtea decussata</i> A. Ad.   |
| Mino-shima.                        | <i>Myrtea circinata</i> A. A d.  |
| Fretum Coreanum.                   | <i>Myrtea delicatula</i> A. Ad.  |
| Ne una quidem earum mihi innotuit. |                                  |

#### Genus *Cryptodon* Turton.

Cfr. A. Adams l. c. pag. 227. ubi hae enumerantur species, quae pariter inter Conchylia nostra Japonica desunt.

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Okosiri.          | <i>Cryptodon Japonicus</i> A. Adams.                 |
| Litus Manchuriae. | <i>Cryptodon Manchuricus</i> A. Adams.               |
| Mino-shima.       | <i>Cryptodon oblongus</i> A. Adams.                  |
| Mino-shima.       | <i>Cryptodon plicatus</i> A. Adams.                  |
| Litus Manchuriae. | <i>Cryptodon sulcatus</i> A. Adams.                  |
| Litus Manchuriae. | <i>Cryptodon (Clausina) subquadratus</i> A. Adams.   |
|                   | <i>Cryptodon (Clausina) suborbicularis</i> A. Adams. |

• Sinus Amivae.

His speciebus adjiciendus est

Dunker, Moll. Jap. mar.

**Cryptodon (Axinus) flexuosus Mont. (Tellina).**

Test. Brit. pag. 72. Conch. dith. ins. Brit. pag. 121. Tab. 7. fig. 9. 10. Jeffreys Shells from Corea Strait in Linn. Soc. Journ. Zool. vol. 14. pag. 412. var. polygona.

Teste Jeffreys Ptychina biplicata Phil. huc pertinet.

**Genus Diplodonta Bronn.**

**Diplodonta semiaspera Phil.**

Wiegmann's Arch. für Nat. vol. 1. 1836. pag. 225. Tab. 7. fig. 2. Lucina orbella Gould Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 4. 1851. pag. 90.

Nagasaki. Singulae valvae exstant.

Haec species pro aetate variabilis est sicut et alia Lucinacea, ex. gr. Lucina columbella Lam. Valvae adultae globosae sunt, juveniles plus minusve compressae et lentiformes. Conf. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 133. ubi haec species late dispersa uberrime tractata est.

Hanc conchulam ex Antillis insulis quondam accepi in Coralliis insidentem.

Diplodonta vel Mysia usta Gouldii, ad Felanias pertinens prope Hakodate reperta, mihi prorsus ignota est.

**Laseacea.**

**Genus Lasea Leach.**

**Lasea rubra Mont. (Cardium).**

Test. Brit. pag. 83. Tab. 27. fig. 4. Jeffreys Shells of Corea Strait in Linn. Soc. Journ. Zool. vol. 14. pag. 420.

In collectione nostra haec conchula e variis remotissimisque regionibus exstat, ex. gr. e litore Groenlandiae, Angliae etc.

E freto Magellanico Algis insidentem eam quondam misit beatus B. Philippi.

**Genus Kellia Turton.**

**Kellia pumila S. Wood.**

S. Sowerby Min. Conch. Tab. 637. fig. 3. Jeffr. l. c. pag. 421.

Fretum Coreanum.

Clar. Jeffreys ad Scacchiam, genus Philippianum, hanc conchulam referendam esse arbitratu est.

**Genus Thecodonta A. Adams.**

**Thecodonta Sieboldi A. Adams.**

Cfr. Ann. and Mag. Nat. Hist. Apr. 1864. pag. 309.

Conchula fere sic descripta est: Testa oblonga obliqua, valde inaequilatera, antice brevior convexiuscula, subincrassata, alba, concentrice sulcata, sulci subdistantes; umbones parvi; margo ventris simplex. — Alt. 3 mill. lat. 5.

Insula Goto.

Hoc genus mihi prorsus ignotum Adamsius Laseaceis injunxit.

## Leptonacea.

### Genus Lepton Turton \*).

*Lepton subrotundum* Dkr.

Tab. nostra 14. fig. 12. 13. magn. aucta.

Testa subrotunda convexiuscula, subaequilatera, postice paululum latior, lactea, pellucida, tenuissima, concentrice tenerrimeque striata; umbones tumidi; cardo valvae sinistrae dente bipartito laminaque exigua utrinque instructus foveolis valvae oppositae respondentibus; impressiones musculares ovatae conspicuae.

Plura specimina exstant ex parte diffracta, maximum 10 mill. longum, 8 altum.

Haec species lapides penetrans prope Tokio inventa est. Diplodonta semiaspera Phil. similem degit vitam.

Praeterea enumerantur:

*Lepton Japonicum* A. Adams.

Ann. and Mag. Mart. 1862. pag. 228.

Tabu-shima.

*Lepton sulcatulum* Jeffreys.

Shells of Corea Strait. Linn. Soc. Journ. Zool. vol. 14. pag. 420.

Fretum Coreanum.

### Genus Tellimya Brown.

*Tellimya Japonica* A. Adams.

Ann. Mag. Mart. 1862. pag. 225.

Mino-shima.

Differt testa longiore a *Tellimya bidentata* Mont.

## Galeommacea.

### Genus Galeomma Turton.

*Galeomma Japonicum* A. Adams \*\*).

Ann. and Mag. Mart. 1862. pag. 228.

Mino-shima.

---

\*) *Lepton* Plinio plantarum genus Herrm.

\*\*) Clar. Adams scripsit *Galeomnna*, sed vox derivatur a *γαλήη* (mustela) et *τὸ ὄμμα* (oculus).

## Solenomyacea.

### Genus *Solenomya* Lam. \*)

#### *Solenomya Japonica* Dkr.

Tab. nostra 14. fig. 3.

Testa exigua oblonga, tenuis, utrinque rotundata, ante umbones obtusos emarginata, epidermide fusco-cornea nitidissima marginem valvarum calcareum parum excedente vestita, striis radiantibus pallidis sulcisque obsoletissimis instructa. Cardinis structura ut in *Solenomyis* solet.

Species parvula *Solenomyae* velo Say similis, valvulis convexioribus, epidermide marginem testae parum excedente nec non laciniis multo minoribus differt. Hae lacinae in specimine nostro perspicui non possunt, cum involutae sint.

Quantum scio quatuor tantummodo huius generis species hucusque innotuerunt: *Solenomya australis* Lam., *Solemya Parkinsonii* Smith Voy. Ereb. and Terr., *S. solen* Salis-March. (*Tellina togata* Poli australis C. M. M. = *S. mediterranea* Lam.), *S. borealis* Tott. et *S. velum* Say.

## Crassatellacea.

### Genus *Crassatella* Lam.

#### *Crassatella Japonica* Dkr.

Testa ovato-trigona, gibba, paene aequilatera, antice rotundata, postice paulum producta, obsoleteque bicarinata, oblique truncata, striis concentricis plicatis inaequalibus instructa; umbones parvuli acuti, approximati sulcati (ut in *Astartis* multis); color fundi pallide fuscus, radiis badiis inaequalibus pictus; facies interna ex albido rufescens ad impressiones musculorum paulo vividior; margo ventris subtiliter crenatus. — Specimen nostrum 28 mill. longum, 25 altum est.

Clar. Reeve speciem nostram pro *Crassatella donacina* Lamarekii (Conch. icon. vol. 1. sp. 19.) declaravit. Cum vero nec descriptio Lamarekiana (Anim. sans vert. vol. 6. pag. 110.) neque icon Delessertiana (Rec. Tab. 4. fig. 1.) respondeant, speciei de qua hic est sermo, nomen *Crassatellae Japonicae* imposui. Japoni eam „Moshiwo gai“ appellant.

#### *Crassatella compressa* Adams et Reeve.

Belcher Voy. Samar. Moll. pag. 82. Tab. 23. fig. 10.

#### Archipelagus Coreanus.

Species oblongo-ovata, valde compressa, antice rotundata, postice vix angulata, concentrice plicata, carina obtusa ab umbonibus ad latus posticum decurrente insignita, circa 30 mill. longa.

### Genus *Cardita* Lam.

#### *Cardita borealis* Conr.

Reeve Conch. icon. spec. 33. Middendorff Reise pag. 247.

Litora maris Ochotensis meridiana.

---

\*) male scribitur *Solemya*.

### Genus *Mytilicardia* Blainv.

#### *Mytilicardia Leana* Dkr. (Cardita).

Malak. Bl. vol. 6. pag. 223. Moll. Jap. pag. 29. Tab. 3. fig. 17.

De-shima, Nagasaki, Jedo.

Nunc specimen exstat icone supra citata multo majus.

#### *Mytilicardia Cumingiana* Dkr. (Cardita).

Malak. Bl. vol. 6. pag. 223. Moll. Jap. pag. 29. Tab. 3. fig. 18.

Portus De-shimae.

#### *Mytilicardia pica* Reeve (Cardita).

Proc. Zool. Soc. 1843. pag. 191. Conch. icon. Cardita spec. 8. a. b. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 145.

Nagasaki.

## Mytilacea.

### Genus *Mytilus* Lin.

#### *Mytilus crassitesta* Lischke.

Malak. Bl. 1863. pag. 221. Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 151. Tab. 11. fig. 1. 2.

Specimen e mari Japonico septentrionali exstat.

#### *Mytilus giganteus* Holmberg.

*Mytilus edulis* forma gigantea Nordmann Bulletin de la Soc. Impér. des Naturalistes de Moscou 1862. pag. 422. Tab. 11. 12. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 150. vol. 2. pag. 145.

Mare Japonicum.

Haec species in nostra Molluscorum collectione desideratur.

#### *Mytilus Grayanus* Dkr.

Zeitschr. für Malak. 1853. pag. 84. *Mytilus Dunkeri* Reeve Conch. icon. *Mytilus* spec. 17. 1857.

Specimina juniora et adulta exstant.

Magna testarum copia, quas examinare licuit, docet *Mytilum Dunkeri* ad hanc nostram speciem pertinere, qua de causa nomen antiquius praeposendum est. Clar. Lischke de hac specie maris Japonici frequentissima jam fusius disseruit (Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 153. Tab. 10. fig. 7. 8. vol. 2. pag. 145.), sed *Mytilum* quoque giganteum Holmbergi cum nostra specie jungendum esse putat, quod ego quidem confirmare non ausus sim.

Species nostra nonnunquam striis radiantibus tenuibus plus vel minus conspicuis obducta est, ita ut transitum quasi formet ad *Mytilos* costatos vel *Aulacomyas Mörchii*, ex altera vero parte *Mytilorum* costatorum varietates inveniuntur, in quibus costae valde sunt oblitteratae ex. gr. in *Mytilo magellanico*, inde patet *Mytilos* laeves a costatis vel *Aulacomyis* certis finibus separari non posse.

**Mytilus hirsutus Lam.**

Anim. sans vert. vol. 7. pag. 33. Reeve Conch. icon. spec. 8. (exemplar giganteum).

Plura specimina exstant ex parte conglomerata et lapidibus affixa.

Haec species in mari Japonico et Sinensi nec non in litore Novae Hollandiae satis frequens invenitur.

**Mytilus sinuatus Dkr.**

Manuser. in Mus. Cumingiano. Reeve Conch. icon. Myt. spec. 16. Tab. 5.

Specimen Mytili parvuli Japonici huc pertinere videtur.

Exemplar l. l. depictum ex insulis Philippinis originem ducit.

**Mytilus curvatus Dkr.**

Proc. Zool. Soc. 1856. pag. 361. Reeve Conch. icon. Mytilus spec. 53.

Testa parva solidula subtrigona, rufo-violacea, dorso valde fornicata et gibba, basi sinuata, costulis dichotomis instructa, epidermide fusco-cornea vestita; umbones parvi inflexi; margo excepta fissura crenulatus; cardo utriusque valvae denticulis binis vel ternis munitus.

Singulae valvae Japonicae huius speciei nondum adultae exstant.

Insulae Philippinae (H. Cuming).

**Mytilus atratus Lischke.**

Malak. Bl. vol. 18. pag. 44. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 146. Tab. 10. fig. 4. 5. vol. 3. pag. 109.

Modiola aterrima Dall. Amer. Journ. of Conch. vol. 7. pag. 154.

Nagasaki, (China, Australia).

Species parva solidula inter Mytilos et Modiolas intermedia. Haud exigua Mytilorum copia in formam Modiolarum transit.

**Genus Modiola Lam. \*)**

**Modiola modiolus Lin. (Mytilus).**

Syst. Nat. ed. 10. pag. 706 etc. Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 156. vol. 2. pag. 147. vol. 3. pag. 109.

Jedo, Hakodate.

Haec species maxima sui generis per magnam orbis terrarum partem dispersa est, praesertim in aquis septentrionalibus vivens.

Clar. de Schrenck Modiola Philippinarum Hanl. Reeve Conch. icon. Modiola spec. 1. pro varietate habet. Huic sententiae assentire nequeo, cum toto habitu, valvis tenuioribus aliisque notis constanter differat.

**Modiola Traillii Reeve.**

Conch. icon. Modiola spec. 13. fig. 13. 14.

Paeninsula Malacca (Cherronesus aurea) teste Traill. Dre.

Plura specimina juniora cum vestigio epidermidis ex Japonia allata sunt, quae iconibus citatis respondent.

---

\*) Genus *Perna* Adansonii diversissimas conchas Mytilos, Pinnae, Aviculas atque adeo „le Jéson“, Mytilicardiae vel Carditae speciem et „L'esan“ Pectinem parvum complectens, pro his conchis non est adoptandum. Denominatio generica *Volsella* Scopoli pariter incongrua est, cum *Vulsella*, idem significans, alio Bivalvium generi jam impositum sit.



*Modiola Metcalfei* Hanley.

Proc. Zool. Soc. 1844 Reeve Conch. icon. *Modiola* spec. 16. a. b. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 158.

Specimina juniora adsunt colore vivido et languido variantia. Testae integrae area setigera distincte terminata ab umbonibus ad latus posticum decurrente insignitae sunt. Theodorus Menke jam ex longo abhinc tempore specimen junius mecum communicavit nomine *Modiolae* semivestitae, quae vero denominatio idonea, quantum scio, nullibi edita est.

Species in Philippinis insulis, mari Japonico et Chinensi haud rara.

*Modiola nitida* Hanl.

Reeve Conch. icon. *Modiola* Tab. 2. fig. 6. Tab. 7. fig. 36.

Sinus Jedoënsis Lischke. Portus Essingtonensis Novae Hollandiae.

Specimen adultum exstat.

*Modiola Hanleyi* Dkr.

Tab. nostra 16. fig. 3. 4.

Testa oblonga, tumida, concentrice striata, antice rotundata, postice producta, paulum dilatata, dorso antico plicata, postico aequaliter fornicata, epidermide laevi atro-cornea facile dehiscente vestita; umbones tumidi incurvi; margo ventris rectilineus, vel parum sinuatus; ligamentum longum angustum immersum totum paene dorsum tenens; facies interna parum nitida submargaritacea.

Speciminum quae adsunt maximum 81 mill. longum est, ejusque dimensionis ratio numeris 100, 42 et 38 respondet.

Species nostra antecedenti certe proxima est, sed habitu, dorsi parte postica fornicata neque angulata nec non plicis aream ligamenti tenentibus constanter differe videtur.

*Modiola rhomboidea* Hanl.

Reeve Conch. icon. *Modiola* fig. 28.

Specimina variae aetatis exstant; in junioribus epidermis pallide cornea et subpellucida.

*Modiola flavida* Dkr. (Volsella).

Proc. Zool. Soc. 1856. pag. 364. Reeve Conch. icon. *Modiola* spec. 64. fig. 77.

Testa oblonga, tenuis, inflata, lineis concentricis tenuibus elevatis instructa, linea ab umbonibus ad basin oblique decurrente colore pallidiore signata; umbones tumidi; margo ventris postice sinuatus.

Mare Japonicum et insula Luzon (sinus ad Manilam).

Testa 30—32 mill. longa, 14—16 alta, 13—14 lata. Margo dorsi anterior rectus, antrorsum paululum inclinatus, posticus arcuatus in extremitatem posticam basin versus productam sensim transit. Margo ventris postice sinuatus, antice leviter arcuatus; pars antica rotundata ultra apices parum excedit. Striae concentricae graciles distantes et elevatae lineas concentricas subtilissimas sub vitro tantum conspicuas includunt.

Haec species *Modiolae* vestitae Phil. (Enum. Moll. vol. 2. pag. 51. Tab. 15. fig. 12.) affinis, testa paululo longiore, tenuiore, parum splendente, epidermide pallidiore forma graciliore postice magis producta, umbonibus minoribus striisque concentricis elevatis differt. Praeterea nostra species tegumento tomentoso, quod *Modiolam* vestitam involvit, prorsus carere videtur.

**Modiola Japonica Dkr. (Volsella).**

Proc. Zool. Soc. 1856, pag. 363. Reeve Conch. icon. Modiola spec. 26.

Specimina integerrima nitidissima exstant epidermide tenui caduca obducta. Species splendore et pictura elegantissima, frequens in litore maris Japonici invenitur. Modiolae glaberrimae Dkr. cognata est.

**Modiola Fortunei Dkr. (Volsella).**

Proc. Zool. Soc. 1856, pag. 361. Reeve Conch. icon. Modiola spec. 62, fig. 75.

Singula valva exstat.

Mare Chinense et Japonicum.

**Modiola Senhausii Reeve.**

Conch. icon. Modiola spec. 22.

Multa specimina minora exstant.

Mare Japonicum et Chinense.

**Modiola arcuatula Hanl.**

Proc. Zool. Soc. 1844, pag. 16. Reeve Conch. icon. Modiola fig. 27, et 45.

Tria specimina Japonica lecta sunt. (Insulae Philippinae etc.).

Clar. Reeve Modiolam varicosam Gouldii huc refert, quae vero ab auctore ipso Dreissenii adnumeratur (cfr. Otia conch. pag. 251).

**Genus Modiolaria Beck.**

**Modiolaria Cumingiana Dkr. (Modiola).**

Reeve Conch. icon. Modiola fig. 63 a. b.

Species nostra in mari Japonico gregatim degens bysso spongiosa et lanuginosa vestita, plane respondet speciminibus, quae sinum Moretonensem Novae Hollandiae inhabitant.

Concha concinna postice plus minusve producta ideoque ambitu varians, Modiolariae impactae Herm. (Mytilo discordi oceani australis Chemn. Conch. Cab. vol. 8. pag. 195. Tab. 86. fig. 768.) affinis est, quae pariter gregatim vivens bysso pannosa subtili, sed compacta involvitur.

**Modiolaria nigra Gray.**

Conf. Schrenck Amurl. Moll. pag. 495.

Sinus de Castries.

Clar. de Schrenck cum hac specie Modiolariam (Lanistinam) laevigatam Gray conjunxit. Mea opinione haec est species distincta.

**Modiolaria vernicosa Midd.**

Beitr. zu einer Mal. Ross. 3. pag. 20. Mém. de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersb. vol. 6. pag. 536. Tab. 11. fig. 25—27.

Sinus de Castries, rara Fucis adhaerens. Hanc speciem non vidi.

*Modiolaria pusio* A. Adams.

Ann. and Mag. Nat. Hist. Mart. 1862. pag. 229.

Mino-shima.

„Testa transversim oblonga, obliqua, parva, tenuis, fusca, antice brevis, costellis radiantibus utrinque ornata, lineolis incrementi concentricis striolata, margo ventris crenulatus.“

Haec verba satis quadrant in specimen, quod Halioti giganteae adhaerebat.

*Modiolaria divaricata* Phil. (Modiola).

Abb. vol. 3. pag. 21. Modiola Tab. 2. fig. 8. Lithodomus divaricata Reeve Conch. icon. Lith. fig. 34. Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 148.

Specimina tria Japonica exstant.

Haec conchula, sculptura elegantissima insignis, pariter ex Antillis insulis et Venezuela provenit. Corallia nonnulla a beato Georgio Tams quondam accepta prope Porto Cabello collecta hac specie penitus impleta sunt.

Clar. Lischke l. l. eam accuratius examinavit.

*Modiolaria semigranata* Reeve (Lithodomus).

Conch. icon. Lith. fig. 28. Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 110. Tab. 9. fig. 18. 19. 19 a.

Sinus Jedoënsis.

Singulae valvae exstant, quae huc pertinere videntur.

Haec et antecedens species, *Modiolaria coarctata* Dkr. aliaeque sectionem Mytilaceorum formant inter *Modiolarias* et *Lithophagas* ambiguum.

**Genus Crenella Brown.**

*Crenella decussata* Mont. (Mytilus).

Test. Brit. Suppl. pag. 69. J. G. Jeffreys Linn. Soc. Journ. Zool. vol. 14. pag. 419.

Fretum Coreanum.

Species late dispersa, praesertim in regionibus septentrionalibus obvia.

Praeterea clar. A. Adams sex *Crenellarum* species Japonicas descripsit, quae desiderantur.

Sunt vero haece:

*Crenella spectabilis* A. Ad.

Mino-shima.

*Crenella decorata* A. Ad.

Portus Hamiltoni.

*Crenella cornea* A. Ad.

Fretum Coreanum.

*Crenella sculptilis* A. Ad.

Portus Chosan.

*Crenella crocea* A. Ad.

Tsu-shima.

*Crenella casta* A. Ad.

Mino-shima.

(Cfr. Ann. and Mag. Nat. Hist. 1862. pag. 228.)

Dunker, Moll. Jap. mar.

## Genus *Lithophaga* Bolten.

### *Lithophaga aristata* Solander (*Mytilus*).

Dillwyn descr. Cat. vol. 1. pag. 303. Le Ropan Adans. Sénag. Coq. pag. 267. Tab. 19. fig. 2. *Modiola caudigera* Lam. anim. sans vert. ed. 2. vol. 7. pag. 27. *Mytilus Ropan* Desh. ibid. (nota). *Lithophagus caudatus* Gray in King Narr. Surv. Austr. vol. 2. app. pag. 477. *Lithodomus caudigerus* Sow. Gen. of Shells fig. 4. Reeve Conch. syst. vol. 1. pag. 37. Tab. 99. fig. 3. 4. *Lithodomus aristatus* Carpenter Mazatlan Mollusca pag. 126. etc.

Haec concha praesertim Molluscorum testas atque Corallia perforans, e remotissimis regionibus nota est. Specimina nostra Japonica plerumque minora, nullo modo differunt ab Americanis, Africanis aliarumve regionum.

*Dactylus Carpenteri* Mörch (Malak. Bl. vol. 7. pag. 206.) ab auctore differre dicitur appendice calcarea valvae dexteræ inferna, valvae sinistreae superna, sed mea opinione haec nota nimis levis est, ut in eam species nova fundetur; praeterea utraque appendicum formatio uno eodemque loco natali invenitur.

Clar. Philippi (Abb. vol. 2. pag. 126.), Carpenter (Mazatlan Mollusca pag. 126.) et Lischke (Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 149.) de *Mytilo aristato* jam uberrime disseruerunt.

Clar. Deshayes denominationem *Adansonii* „le Ropan“ prioritatis causa restituendam esse putat, sed ego censeo nomina ista barbara *Adansoniana* pariter nomina ridenda *Duclosii* e litteris expellenda esse.

### *Lithophaga nasuta* Phil. (*Modiola*).

Abb. vol. 2. pag. 149. *Modiola* Tab. 1. fig. 2.

Specimina tantum minora exstant.

Species in Philippinis insulis haud rara.

*Lithodomus nasuta* Reevei Conch. icon. fig. 10 a. b. certe alia species est.

### *Lithophaga curta* Lischke (*Lithophagus*).

Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 111. Tab. 9. fig. 14—17.

Mare Japonicum et Chinense.

Ad descriptionem *Lischkeanam* hic addendum est specimina a clar. J. Rein ex Japonia reportata ex parte multo majora appendiculo parvo calcareo instructa esse.

### *Lithophaga Zitteliana* Dkr.

Tab. nostra 14. fig. 1. 2. spec. junius, fig. 8. 9. spec. adultum.

Testa subcylindrata, utrinque rotundata postice dilatata ambitu paene elliptico, striis incrementi concentricis obsoletis posticam versus partem fortioribus nec non striis directis minimis latus ventris tenentibus instructa; umbones involuti ab extremitate antica recedentes; epidermis pallide fusca subflava. — Long. speciminum adutorum circiter 70 mill. constat eorumque dimensionum ratio numeris 100, 23, 20 respondet.

Mare Japonicum mediterraneum.

Haec species, quantum scio, nullibi hucusque descripta, et *Lithophagam* corrugatam et *L. obesam* in mentem revocat, sed accuratius inspecta ab utraque concha satis differt, nam in illa tota testa striis directis postice divaricatis obducta est, in *Lithophaga* vero obesa nullum striarum vestigium invenitur.

Dicata est nostra species Carolo Zittel palaeontologo illustri.

Fortasse *Lithophaga canalifera* Hanl. (Proc. Zool. Soc. 1844. pag. 16.) etiam inter Mollusca Japonica enumeranda est, nam specimen minus, quod Hamburgi quondam adeptus sum, ex Japonia provenisse mercator rerum naturalium affirmavit.

### Genus *Adula* H. et A. Adams.

*Adula Californiensis* Eschsch. (*Modiola*).

*Modiola Californiensis* Eschsch. Museum Dorpatense (*Pholas* Calif. lapsu calami). Philippi Zeitschr. für Malak. 1847. pag. 113. Dunker *Lithophaga* in Chemn. Conch. Cab. ed. alt.

Huic speciei insigni a clar. de Middendorff examinandi causa quondam ad clar. Philippi missae certe illa concha respondet, quam clar. de Schrenck *Modiolam* Schmidtii nominavit (cfr. Amurl. vol. 2. Moll. pag. 500. Tab. 21. fig. 4—7.) quod ex iconibus et descriptione Schrenckii accurata satis elucet. Huc quoque referenda est concha, quam clar. Alphonso Forrer nomine *Adulae stylinae* Carp. e California mihi misit.

Species nostra singularis byssifera latere postico lanuginosa in litore occidentali insulae Sagalien una cum *Pholadeis* rupes deruptas vel lapides singulos detritos perforans, satis frequens invenitur filis suis subtilibus in lapidum cavernis affixa. Pariter in litore Californiano haud rara est.

*Mytilus soleniformis* d'Orbigny (Voy. dans l'Amér. mér. Moll. pag. 649. Tab. 85. fig. 17. 18.) umbonibus multo magis recedentibus aliisque notis differt.

### Genus *Septifer* Recluz.

*Septifer bilocularis* Lin. (*Mytilus*).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 705. *Mytilus Nicobaricus* Chemn. Conch. Cab. vol. 8. pag. 155. Dunker Comment. de *Septiferis* etc. pag. 6. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 156.

Species satis cognita in mari Japonico, Sinensi et insulis Nicobaris, in litore Africano aliisque terris diffusa, magnitudine et ambitu admodum variabilis est. Specimina nostra Japonica ad varietatem minorem angustiore pertinet. Valvae juniores integrae epidermide sparsim setigerae, nonnunquam colore herbaceo vivido tincta vestitae sunt.

*Tichogoniae* Kraussii et Wiegmanni Küst. certe varietates sunt.

*Septifer virgatus* Wiegmann (*Tichogonia*).

Arch. für Naturg. 1837. pag. 49. Dunker de *Septiferis* genere *Mytilaceorum* etc. 1855. pag. 5. *Septifer crassus* Dkr. Zeitschr. für Malak. 1853. pag. 86., de Sept. pag. 4. *Mytilus crassus* Reeve Conch. icon. *Mytilus* spec. 25.

Cum magnam huius conchae copiam saepius comparandi data fuerit occasio, persuasum mihi est *Septiferum* crassum pro varietate tantum huius speciei ambiguae habendum esse. Sed nescio an *Septifer Hermannseni* (Zeitschr. für Malak. 1853. pag. 85., Comment. de Sept. etc. pag. 4.) pari jure cum *Septifero* virgato jungi possit, cum utraque concha cardinis structura differat. In *Septifero* enim virgato dens cardinis crassus in sinistra, sed in *Septifero Hermannseni* in dextera valva positus est. Sane, raro quidem, in *Unione* tumido Retzii cardinis dentes inversi sunt, ita ut dens valvae sinistrae primarius per exceptionem in valva dextera reperiatur, uno verbo tota cardinis formatio contraria sit. Ergo si eandem inter nostram concham et *Unionem* tumidum

rationem admittere liceat, Septifer Hermannseni cum Septifero virgato pari modo ut jungetur necesse est sicuti cochleae quaedam, praesertim terrestres, dextrorsae ac sinistrorsae obveniunt ad unam eandemque speciem pertinentes.

*Septifer bifurcatus* Conrad (Mytilus).

Journ. Acad. Phil. 1837. pag. 241. Tab. 18. fig. 14.

In collectione Molluscorum Japonica specimen minus exstat costis dichotomis crassioribus et sculptura Septifero virgato multo asperiore. Certe huc pertinet *Mytilus bifurcatus* Conr., quem quidem secundum specimina a clar. A. Forrer e California accepta vix pro specie genuina declaraverim.

## Vulsellacea.

### Genus *Vulsella* Humphrey.

*Vulsella lingulata* Lin. (Pinna) 1753.

Mus. Tess. Tab. 6. fig. 3. = *Mya Vulsella* Lin. Syst. Nat. ed. 10. pag. 671. (1758). Mus. Lud. Ulr. Reg. pag. 471. Rumphii Mus. Tab. 46. fig. A. Lam. Anim. sans vert. ed. alt. vol. 7. pag. 267. Reeve Conch. icon. *Vulsella* spec. 6.

Specimen magnitudine haud vulgari exstat 107 mill. altum, 45 latum.  
Cibus Japonorum magni aestimatus (J. Rein).

*Vulsella minor* Chemn. (Mya).

Conch. Cab. vol. 6. Tab. 2. fig. 8. 9. = *Vulsella rugosa* Lam. Anim. sans vert. vol. 7. pag. 268. Delessert Rec. Tab. 18. fig. 3. = *Vulsella spongiarum* Lam. ibid.

Specimina tria adsunt.

Vulsellae in spongiis gregatim viventes late dispersae, admodum variabiles sunt, ita ut formae quaedam abnormes facile pro speciebus propriis haberi possint. Conferantur quae de *Vulsellis* a clar. Carolo Jickeli e Mari Rubro reportatis in Jahrb. d. deutschen Malak. Ges. vol. 2. pag. 1. jam dixi.

## Aviculacea.

### *Avicula coturnix* Dkr.

Tab. nostra 10. fig. 1. 2.

Testa parva tenuis valde obliqua, parum inaequivalvis, striis lamellisque serrulatis tenerrimis obducta, pallide cornea, strigis fuscis vel nigrescentibus angulatis et undatis picta; ala rotundata brevis a cauda longa sinu haud profundo sejuncta; rostrum acuminatum; umbones parvi prominuli; cardo tuberculis duobus minutis in valva dextera et uno in sinistra instructus; margarita argentea parum iridescens a limbo postice lato terminata. — Specimen quod exstat maximum a rostro usque ad finem caudae circa 40 mill. longum est.

Mare Japoniae mediterraneum.

Pictura valvarum pennata perdicem vel coturnicem in mentem vocat.

Cfr. Dunker Monogr. der Gattung *Avicula* Conch. Cab. ed. alt. pag. 67. Tab. 23. fig. 4. 5.

*Avicula brevialata* Dkr.

Tab. nostra 10. fig. 3. 4. et 5. var.

Testa oblongo-ovata angusta, perobliqua, convexa, interdum irregularis, solidula, fusco-castanea, striis lamellisque incrementi nec non squamulis serratis densissimis seriatim ordinatis instructa; rostrum magnum latum saepius oblique truncatum denseque serrulatum; cauda longa in speciminibus adultis plerumque lata; ala brevissima sinu parvo a cauda disjuncta; margarita viridi, cupreo-purpureoque iridescens, a limbo fusco subopaco inclusa. Cardo in valva sinistra unico constat tuberculo crasso foveae valvae oppositae respondente.

Mare Japoniae mediterraneum. (Mare Chinense, insulae Philippinae et Moluccenses.)

Concha ambitu paululum mutabilis nonnunquam distorta et deformata est. Icones nostrae specimina tantum minora repraesentant; fig. 5. colore excellit clariore. In Monographia mea Avicularum specimen adultum fere 90 mill. longum late rostratum et caudatum depinxi et accuratius descripsi. Cfr. Conch. Cab. ed. 2. pag. 55. Tab. 19. fig. 3.

*Avicula Lovéni* Dkr.

Tab. nostra 10. fig. 6.

Testa tumida, solidula, longicaudata, rotundato-alata, striis lamellisque densissimis serrulatis obducta, virescente cornea, postice obscurior; rostrum latiusculum antice rotundatum, lamellis densis fimbriatis tectum; cardinis structura ut solet in Aviculis: tuberculi bini in valva dextera, unus in sinistra cum fossa longa ut valvae oppositae lamina recipiatur. Margarita parum splendens; limbus angustus.

Mare Japoniae mediterraneum.

Species nostra Aviculae sternae Gouldii cognata, rostri formatione, alis majoribus, valvis solidioribus et colore differt.

S. Lovéno zoologo illustri dicata est.

*Avicula (Meleagrina) Martensii* Dkr.

Tab. nostra 10. fig. 7. 8.

Testa oblongo-subquadrata, solidiuscula, subtumida, lamellis concentricis squamisque horridis acutis radiatim ordinatis instructa; cornea, lutea vel lurida, maculis strigisque fusco-atris variegata; rostrum latum obtusum fimbriatum; fissura valvae dexterae, i. e. superioris minus convexae ad byssum emittendam satis profunda; margarita vivide splendens, a limbo lato corneo atroque maculato vel marmorato cineta.

Mare Japonicum prope Nagasaki.

Specimina complura exstant colore et ambitu variantia.

Cfr. *Meleagrina pica* Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 161. et Monogr. Avic. l. c. pag. 66. (per erratum *Avicula (Meleagrina) Japonica*).

Hanc speciem E. de Martens dicatam esse volui.

Praeterea clar. Reeve Aviculam fucatam Gouldii (Un. St. Expl. Exped. Moll. pap. 441. Tab. 39. fig. 551.) pro concha Japonica descripsit (Conch. icon. spec. 74). Cum vero haec species a nostra valde differat, hanc patriae designationem dubitaverim.

### Avicula Japonica Dkr.

Zeitschr. für Malak. 1852. pag. 73. Gatt. Avicula l. c. pag. 33. Tab. 10. fig. 5.

Mare Japonicum fide beati Scheepmaker.

Specimen originale in Museo Loebbeckeano Dusseldorpino nunc asservatur.

Haec aliaeque species ex. gr. „Ala corvi pendula“ Chemnitzii propriam Avicularum formant sectionem et quidem meliorem quam Meleagrinae, quae per varios transitus cum Aviculis veris conjunctae sunt, qua de causa Meleagrinas pro genere proprio agnoscere nequeo. Forma externa pervariabilis est, sed omnes eandem testarum structuram internam et externam offerunt.

### Genus Melina Retz.

*Melina perna* Lin. (Ostrea).

*Perna* Linnaei Pfr. Wieg. Arch. vol. 6. 1. 1840. pag. 260. *Ostrea Perna* Gmel. Syst. Nat. ed. 13. spec. 124. Chemn. Conch. Cab. vol. 7. pag. 252. Tab. 59. fig. 580. (excepta icone 579). Cfr. Dkr. Moll. Guin. pag. 44. Tab. 8. figg. 7—10. varr. *Isognomum Perna* (Ostrea) Lin. \*) et Lischke Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 153. ubi haec concha uberius tractata est.

Specimina nostra Japonica plane respondent iis, quae ex insulis Antillis, litore Guineensi aliisque terris proveniunt.

*Melina costellata* Conrad.

Journ. of the Acad. of Nat. Sc. of Philad. vol. 7. pag. 247. fide Reeve Conch. icon. *Perna* spec. 16. *Melina costellata* Schrenck Amurl. Moll. pag. 493.

Hakodate, insulae Sandwich (Schrenck).

Praeterea clar. de Schrenck Melinam (*Pernam*) Australicam \*\*) Reevei (Conch. icon. *Perna* spec. 12.) inter Conchifera Japonica enumeravit una cum specie antecedente repertam, sed aperte confiteor, hanc testam mihi valde dubiosam esse. Sunt enim Melinarum species admodum variabiles et Reeveus hanc vel illam varietatem aut deformitatem testarum pro speciebus distinctis habuisse videtur.

### Genus Malleus Lamarek.

*Malleus albus* Chemnitz.

*Ostrea malleus albus* Chemn. Conch. Cab. vol. 11. pag. 257. Reeve Conch. icon.

Specimina Japonica nullo modo discrepant ab iis, quae ad insulas Philippinas et in mari Chinensi reperiuntur. Inter exemplaria collectionis nostrae unum exstat pergrande et monstrosum ala postica duplicata insigne. Specimina juvenilia pallide cornea subvitrea nitentia, strigis nonnullis fuscescentibus signata sunt, quam picturam in testis adultis plerumque adesis et contusis saepius quoque calce aliisve corporibus incrustatis nunquam vidi.

---

\*) Hoc nomen genericum Kleinii antea adoptaveram sicut et alii conchyliologi eo utuntur. Cum vero Kleinus diversas ejusdem generis species cum aliis generibus junxerit, generi „Isognomon“ jus prioritatis non est concedendum, ut recte jam annotavit clar. de Schrenck (Reisen und Forsch. im Amurl. vol. 2. pag. 493.).

\*\*) Australicus non est verbum latinum.



**Malleus regula Forskål (Ostrea).**

Descr. anim. in itin. obs. pag. 124. Lam. anim. sans vert. ed 2. vol. 7. pag. 92. (Malleus vulsellatus.)  
Chemn. Conch. Cab. vol. 8. pag. 15. fig. 657.

Unum specimen exstat in mari Japonico mediterraneo captum excepto colore pallidiore omnibus partibus conveniens cum testis Africanis. Multa specimina e mari rubro nuper reportavit clar. Jikeli.

**Aviculacea.**

**Genus Pinna Lin.**

**Pinna Chemnitzii Hanl.**

Proc. Zool. Soc. 1858. pag. 136. Reeve Conch. icon. Pinna spec. 1. a. b. Pinna Japonica Reeve  
ibid. spec. 47.

Hanc speciem Chemnitzius (Conch. Cab. vol. 8. Tab. 87. fig. 770.) primus ut Pinnam pectinatam Linnaei delineavit, quae quidem differt. Plura specimina juniora et adulta ante oculos habeo prope Jokohama, Tokio aliisque locis Japoniae collecta notis primariis cum iconibus Reeveanis a speciminibus ex insulis Philippinis desumptis convenientia; at vero persuasum habeo testam nomine Pinnae Japonicae a Reeveo descriptam huc pertinere, cum nondum adulta mihi videatur.

Pinna nostra in mari Japonico haud rara, eximiam magnitudinem attingit, nam exemplar collectionis nostrae maximum 350 circiter mill. longum est. Costae in hac specie plus vel minus prominentes, in speciminibus antiquis et obsoletis oblitteratae, interdum plane desunt. In speciminibus integris, praesertim junioribus, costae squamis imbricatis erectis singulis vel crebris instructae sunt; pariter margo dorsi sinuatus muricato-squamatus quasi serratus. Testa ambitu satis constans cinereo-olivacea, subdiaphana. Ceteroquin conferantur, quae clar. Lischke de Pinna Japonica jam scripsit (Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 159).

**Pinna bicolor Chemn.**

Conch. Cab. vol. 8. pag. 234. Tab. 90. fig. 780. Reeve Conch. icon. Pinna spec. 17. Pinna dolabrata  
Lam. anim. sans vert. vol. 7. pag. 5. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 159.

Inter Mollusca Japonica specimen juvenile exstat obscure corneum maculis nigrescentibus magnis subquadratis radiatim pictum. Exemplaria multo majora e mari rubro quondam retulit Albertus Rodatz.

**Pinna fimbriatula Reeve.**

Conch. icon. Pinna spec. 63.

Mare Japonicum M. Cuming.

Exstat in Museo Britannico.

**Pinna saccata Lin.**

Mus. Lud. Ulr. pag. 546. Syst. Nat. ed. 10. pag. 707. ed. 12. pag. 1160. Rumphii Mus. Tab. 46.  
fig. N. Pinna alba.

Specimina juniora lecta sunt. Species forma irregulari plus minusve distorta insignis, modo lata subtrigona, modo angusta et producta invenitur colore pallide corneo, succineo vel rufescente. Japoni hanc speciem „Tachi gai“ nominant.

Praeterea specimina Pinnae cujusdam exstant valde juvenilia fragilissima, fortasse ad Pinnam vitream Chemnitzii pertinentia, quam pro testa Pinnae saccatae nondum adultae magis regularis declaraverim. Pariter Pinna Nuttallii Conr. a Reeveo cum Pinna saccata jungitur.

Pinnae aequae ac Aviculae duplicem testarum structuram ostendunt, quae fibrata et lamellaris est, haec nitore iridescente, illa nitore sericeo insignitur.

## Arcacea.

### Genus Arca Lin.

#### *Arca navicularis* Brug.

Tab. nostra 14. fig. 16. 17. var.

*Arca Noae* var. Chemn. Conch. Cab. vol. 7. pag. 184. fig. 533. Phil. Abb. vol. 2. pag. 210. *Arca* Tab. 3. fig. 2. (Specimen originale ad collectionem nostram pertinens.)

Exemplar Japonicum magnum exstat 74 mill. longum.

Notas differentes inter hanc speciem et Arcam linternam Jonassii l. c. bene exposuit clar. Philippi.

Varietatem eximiam hic depinxi costis crassioribus rugosis eorumque intervallis cancellatis insignem.

#### *Arca Kraussii* Phil.

Abb. vol. 3. pag. 88. *Arca* Tab. 5. fig. 8—10.

Singulae valvae Japonicae exstant iconibus supra citatis minores.

Species *Arcae* tetragonae Polii similis, an ejusdem varietas?

Cfr. Lischke vol. 2. pag. 141. vol. 3. pag. 107.

### Genus Barbatia Gray.

#### *Barbatia decurvata* Lischke (*Arca*).

Malak. Bl. vol. 16. pag. 108. Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 148. *Arca* obliquata Reeve Conch. icon.

*Arca* spec. 80. (non Gray in Wood Ind. Test. Suppl. Tab. 12. fig. 4.). Testa junior. = *Arca* obtusa Reeve Conch. icon. *Arca* spec. 77.

Specimina complura juvenilia et adulta exstant prope Nagasaki aliisque locis maris Japonici collecta, quae docent Arcam obtusam Reevei statum nostrae conchae juniorem repraesentare, testa enim aetate aurescens magis magisque decurvatur.

Concha statu integro epidermide fusca obducta est in costulis crassioribus posticis setigera.

#### *Barbatia tenebrica* Reeve (*Arca*).

Conch. icon. spec. 106.

Exemplar unum exstat iis quae ex Philippinis insulis proveniunt respondens.

#### *Barbatia decussata* Sow. (*Byssoarca*).

Proc. Zool. Soc. 1833. *Arca* decussata Reeve Conch. icon. spec. 81.

*Arca* decussata Lin. Syst. Nat. ed. 10. pag. 694. Pectunculi species quaedam esse videtur nullo modo illustranda.

Haec concha in remotissimis regionibus observata est.

Specimina minora exstant.

*Barbatia Domingensis* Lam. (Arca).

Anim. sans vert. vol. 6. pag. 467.

Clar. Lischke hanc speciem admodum variabilem multis in terris obviam uberrime optime-que tractavit (cfr. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 142).

Specimina complura ex parte monstruosa in collectione Molluscorum Japonicorum exstant.

Ad Daphnodermata Mörschi (Polii) pertinet.

**Genus Anomalocardia Klein.**

*Anomalocardia granosa* Lin. (Arca).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 694. ed. 12. pag. 1142. Rumphii Mus. Tab. 44. fig. K. Chemn. Conch. Cab. vol. 7. fig. 557. Reeve Conch. icon. Arca spec. 15. fig. a. b. (icones optima).

Concha ex oceano Asiatico satis cognita est; specimina Japonica tantum minora exstant.

Linnaeus in Mus. Lud. Ulr. pag. 519 Arcam granosam describens, alteram testam minorem subrotundam albam ad marginem parum rubicundam nominat. Ex his verbis concludi potest Linnaeum duas species confudisse, eo magis cum in Syst. Nat. oceanus Europae meridionalis nominetur.

*Anomalocardia pulchella* Dkr.

Nov. Conch. pag. 113. Tab. 38. fig. 6. 7. 8. fig. 9. particula testae magn. aucta.

Inter Mollusca Japonica singula valva huius speciei inventa est.

Eo tempore quo conchulam descripsi, ejus patria ignota erat.

**Genus Scapharca Gray.**

*Scapharca inflata* Reeve (Arca).

Proc. Zool. Soc. 1844. Conch. icon. Arca spec. 30. Arca Broughtonii Schrenck Moll. des Amurlandes pag. 578. Tab. 24. fig. 1—3. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 146.

Specimina maxima exstant 100—120 mill. longa jam antea ex Japonica accepta, nunc specimina tantum juvenilia multo minora collecta sunt intus lactea. Aetate proveciore color albus flavescit.

Haec species costis radiantibus planis 38—40 striisque transversis distantibus regularibus costarum intervalla tenentibus praesertim insignitur. Epidermis si forte integra invenitur, lamellosa et setigera est.

Haec concha Japonis cibus est magni aestimatus „Aka-gahi“ dictus.

Arca inflata Brocchii ad Pectunculos fossiles pertinet.

*Scapharca Satowi* Dkr.

Tab. nostra 9. fig. 1. 2. 3.

Testa ovata, perparum obliqua, solida, valde tumida, paululum inaequalis; in margine cardinis utrinque obtusangula, antice rotundata, postice parum producta, oblique truncata, costis  
Dunker, Moll. Jap. mar. 30

planis aequalibus laeviusculis 36—38, interstitiis latioribus instructa; umbones valde inflati prominentes parum inter se distantes, carina obtusangula ad latus posticum utrinque decurrente signati; color externus et internus lacteus; epidermis fusca tenuis, in interstitiis lamellosa et setosa: area ligamenti profunda. — Long. 80—84 mill. Long. alt. et latit. ratio numeris 100, 78—80, 72—74 respondet.

Specimina septem plane adulta ad Tokio (Jedo) lecta exstant omnibus notis congruentia.

Haec species ratione quadam Scapharcae inflatae Reevei affinis, testa multo solidiore atque adeo tumidiore, minus obliqua interstitiisque costarum angustioribus constanter differt.

Denominata est in honorem clar. E. Satow, qui eam misit.

In urbe Tokio cum antecedente ad mercatum venit ut cibus magni aestimatus.

#### *Scapharca suberenata* Lischke (Arca).

Malak. Bl. vol. 16. pag. 107. Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 146. Tab. 9. fig. 1. 2. 3.

Specimina complura minora et adulta lecta sunt. Specimen unum permagnum jam antea acceptum, est originale iconis optimae supra citatae, sed addendum est hoc exemplar epidermide fusca vel olivacea lamellosa in sulcis setigera orbatum esse.

Haec species ambitu variabilis est; umbones plus vel minus distantes inveniuntur.

#### *Scapharca ambigua* Reeve (Arca).

Proc. Zool. Soc. 1844. Conch. icon. Arca spec. 65.

Species Scapharcae cistulae Reevei cognata, ad Jokohama reperta est.

Specimen minus exstat.

#### *Scapharca Japonica* Reeve (Arca).

Proc. Zool. Soc. 1844. Conch. icon. Arca spec. 32.

Species testa singulari utrinque rotundata valde inaequilatera insignis.

Litus Japonicum. Siebold.

#### *Scapharca Troscheli* Dkr.

Tab. nostra 14. fig. 14. a latere sinistro fig. 15. a latere dorsi visa.

Testa solidula oblonga, antice rotundata, postice subtruncata, tumidula, superne angulata, costis 24 paene aequalibus rotundatis angustis regulariter granosis quasi margaritatis instructa; epidermis fusca in interstitiis costis illis duplo fere latioribus lamellosa; umbones antrorsum inclinati tumidi, parum distantes, sulco levi mediano insigniti. Cardo multidentatus: ligamentum aream dorsi totam non occupans; color externus et internus albus. — Longit. testae 22 mill. Long. alt. et crass. ratio fere haec est: 100, 65, 55.

Duo exemplaria plane congruentia inter mollusca nostra Japonica exstant, sine certa quidem loci natalis indicatione.

Haec species primo obtutu facile cum *Anomalocardia pulchella* commutari potest, sed accuratius spectata costarum structura et indole differt; praeterea valvulae impares sunt.

Amico Troschel zoologo Bonnensi dicata est haec concha parva sed insignis.

### **Scapharca Philippiana Dkr.**

*Arca radiata* Reeve Proc. Zool. Soc. 1844. Conch. icon. *Arca* spec. 40.

Specimen nostrum Japonicum epidermide denudatum cum icone Reeveana plane convenit, sed specimina e mari Chinensi allata ad collectionem nostram pertinentia multo majora epidermide fusco-cornea in costarum intervallis setigera vestita sunt. Costae in illis 29 vel 30 numerantur angustae rugosae; anticae aequae ac posticae paulum latiores sunt. Sulci laminis erectis undatis quasi clathrati apparent.

Cum inter species Arcarum fossiles denominatio *Arcae radiatae* jam bis inveniatur, nomen mutatum est.

In Scapharcarum genere nonnullae inveniuntur species paene aequivalves, ita ut in *Anomalocardias* vel *Anadaras* transeant.

### **Genus Cucullaea Lam.**

*Cucullaea concamerata* Martini (*Arca*).

Beschr. naturf. Freunde vol. 3. pag. 292. Tab. 7. fig. 15. 16. Chemn. Conch. Cab. vol. 7. pag. 174. Tab. 53. fig. 526. 527. (excepta fig. 528.).

Plerumque cum hac specie *Cucullaea auriculifera* Lamarckii (*Anim. sans vert.* vol. 6. pag. 454.) jungitur et Deshayesius in editione huius operis altera jam annotavit nomen antiquius, quod Martini conchae imposuit, prioritatis causa restituendum esse; sed nuper clar. Sowerby *Cucullaeam auriculiferam* Lam. pro specie genuina declaravit. Sane mihi quoque discrimen constare videtur inter specimina, quae denominatione *Cucullaeae concameratae* in collectionibus designatae esse solent. Testae enim ambitum offerunt subquadratum, marginem ventris rectum vel parum curvatum, latus postice abrupte truncatum et sculpturam subtiliorem, at contra testae quaedam inveniuntur postice minus disruptae sculptura asperiore.

Specimen nostrum Japonicum vix 55 mill. longum, iconi Chemnitianae ambitu satis respondet, sed color internus violaceus umbones versus albescens.

Tertia generis species *Cucullaea granulosa* Jonasii (*Chemn. Conch. Cab.* vol. 7. fig. 528.) facile distingui potest.

*Cucullaeae* fossiles multiplices, saepius testis crassioribus instructae, in omnibus fere terrae formationibus marinis obveniunt. Nuclei earum sulco utriusque lateris postici, e lamina vel costa interna orto, statim cognoscuntur.

### **Genus Nucinella S. V. Wood.**

*Nucinella ovata* Jeffr.

Shells from Korea Strait in Linnean Society's Journ. Zool. vol. 14. pag. 418. *Nucinella miliaris* Monogr. Crag. Moll. 1861. pag. 73. Tab. 10. fig. 4.

Fretum Coreanum.

Clar. Jeffreys hanc testam parvulam Arcaceis adjunxit.

## Pectunculacea.

### Genus Pectunculus Lam.

#### *Pectunculus albo-lineatus* Lischke.

Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 108. Tab. 9. fig. 11. 12.

Specimen exstat ut videtur satis adultum 46 mill. longum, 40 altum; praeterea testae complures minores lectae sunt ex parte vivide fuscae, in umbonibus albo maculatae vel strigatae. Margo cardinis in omnibus rectilineus, quam ob rem eorum habitus paulum discrepat ab icone supra laudata; in nonnullis epidermidis holosericae vestigia sub vitro conspiciuntur.

Haec species forma regulari paene aequilatera, lineis albis radiantibus nec non punctulis infixis ad lineam ordinatis insignis est.

Inter species vivas nulla mihi in mentem venit, quae comparari possit.

#### *Pectunculus fulguratus* Dkr.

Tab. nostra 14. fig. 18. 19.

Testa aequilatera suborbicularis, crassa, alba, strigis fuscis angulatis et fulguratis vivide picta, striis incrementi obsoletis cincta; umbones tumiduli approximati subacuti; ligamenti area parva angusta; cardo dentibus validis munitus; latus internum album marginem versus posticum fusco tinctum. — Long. 34 mill. Long. alt. et crass. ratio numeris 100, 95, 55 respondet.

Unum tantum specimen exstat paululum detritum epidermide orbatum, oculis armatis hinc illinc strigillae radiantes conspiciuntur.

Pictura speciei nostrae *Pectunculum flammeum Reevei* (Conch. icon. spec. 7.) in mentem revocat, qui vero testa subtrigona primo obtutu differt.

#### *Pectunculus rotundus* Dkr.

Tab. nostra 16. fig. 9. 10.

Testa aequilatera paene circularis, tenuicula, plano-convexa, extus pallide fusca, intus sordide alba striis radiantibus minutis et confertis sculpta, epidermide fusca subpilosa vestita; umbones acuti approximati; area ligamenti parva et angusta; denticulorum series valde curvata. — Long. 22 mill. Long. alt. et crass. ratio numeris 100, 100, 13—14 respondet.

Sinus Jedoënsis.

Species parva ambitu paene exacte circulari insignis est, sed quaeritur num valvae quae prostant singulae plane adultae sint.

#### *Pectunculus vestitus* Dkr.

Tab. 16. fig. 7. 8.

Testa transversa paene orbicularis, compressa, tenuicula, striis radiantibus minimis sulcisque levibus subdistantibus nec non lineis incrementi tenerrimis decussata; color fundi sordide albus zonis maculisque angulatis et undatis ferrugineis varie pictus; umbones parvuli subacuti approximati medium testarum tenentes; area ligamenti parva et angusta; latus internum totum album;

crenae in margine ventris crassae, umbones versus sensim diminutae, postremo evanescentes; epidermis atro-fusca holoserica ut in *Pectunculo piloso* Lin. — Long. testae 49—50 mill. Long. alt. et crass. ratio his circiter numeris respondet 100, 85, 50.

Specimen unicum integrum et singulae valvae exstant.

Inter species a Reeveo depictas nostra *Pectunculo intermedio* Broderipii (Proc. Zool. Soc. 1832. pag. 126., Reeve Conch. icon. spec. 1.) e litore Peruano simillima est, sed separavi eam pro specie propria ob ambitum discrepantem et locum natalem valde remotum.

Dolendum est descriptiones Reeveanas nimis breves et mancas et icones *Pectunculorum* valde rudes esse.

*Praeterea* clar. Schrenckius (Amurl. Moll. pag. 580.) *Pectunculi* speciem prope Hakodate captam nomine *Pectunculi glycimeridis* Lin. signo quidem interrogationis descripsit, quae mihi prorsus ignota est. Fortasse ad *Pectunculum vestitum* pertinet.

### Genus *Limopsis* Sassi.

#### *Limopsis Woodwardi* A. Adams.

Tab. nostra 16. fig. 5. 6.

Testa crassa orbiculari-subtrigona, obliqua, tumida, subflava, parum inaequilatera, antice rotundata, postice paululum truncata, costellis inaequalibus ab apice prominente radiantibus striisque transversis cancellata; cardo regulariter arcuatus dentibus utrinque aequalibus lamellatis instructus; fovea ligamenti magna satis profunda; margo ventris intus paene laevis. — Concha 18 mill. alta totidemque fere lata est.

*L. Woodwardi* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1862. pag. 231.

Specimen depictum epidermide pilosa caret, quae huius generis speciebus integris propria est.

*Praeterea* Adamsius l. c. has species Japonicas descripsit:

*Limopsin Japonicam* A. Ad.

Kuro-shima.

*Limopsin obliquam* A. Ad.

Uraga.

*Limopsin Cumingii* A. Ad.

Goto, Satanomosaki.

*Limopsin crenatam* A. Ad.

Uraga.

*Limopsin Forskålii* A. Ad.

O-shima, Takano-shima.

His addenda est

*Limopsis oblonga* A. Adams.

Ann. and Mag. Nat. Hist. 1860. pag. 412.

Mino-shima.

Species telluris cretaceae et tertiariae fossilis nominibus genericis *Pectunculinae* Orb. et *Trigonocoelinae* Nyst. descriptas invenies.

**Genus Huxleya A. Adams.**

*Huxleya sulcata* A. Adams.

Ann. and Mag. Nat. Hist. Apr. 1860. pag. 303.

Hoc genus fortasse *Limopsi* proximum est.

**Nuculacea.**

**Genus Nucula Lam.**

*Nucula mirabilis* A. Adams et Reeve.

Voy. Samarang. Moll. pag. 75. Tab. 21. fig. 8. Hanley in Thes. Conch. vol. 3. spec. 19. fig. 114.

Kiu-Siu. Nagasaki.

Testa ovata, solidula, antice abrupte truncata, ventricosa, costulis corrugatis medio divaricatis acuteque angulatis eleganter sculpta, epidermide olivacea opaca induta; margo ventris antice sub-sinuatus, postice aequaliter arcuatus; dorsum paululum fornicatum; lunula magna cordiformis utrinque cavata, medio parum elata, angulo divaricatim costulato terminata, costellis densis ex parte subdichotomis instructa; umbones involuti, antrorsum inclinati; latus internum argenteo-margaritaceum splendidum; cardinis dentes longissimi spinaeformes; fovea ligamenti interna magna obliqua; margo crenis postice oblitteratis cinctus.

Species sculptura sua peculiari sane mirabilis. Inter *Nuculas* vivas talis formationis ad hoc tempus tantum innotuerunt *Nuculae* divaricata et castrensis Hinds. sectionem *Acilae* H. et A. Adams formantes.

Specimen pulcherrimum in Museo Senckenbergiano asservatur.

*Nucula paulula* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1856. pag. 52.

Hanc speciem parvulam solidam, valde inaequilateram et gibbosam pariter in Mari Japonico obviam desideramus.

**Genus Leda Schum.**

*Leda confusa* Hanl.

Sow. Thes. Conch. vol. 3. pag. 119. no. 26. fig. 85. *Nucula pella* Sow. Conch. Ill. *Nucula* fig. 6. non *Arca pella* Lin. nec Gmel. neque Brug.

Mare Japonicum et Chinense.

Specimen integrum adest icone Hanleyana paululo majus.

*Leda pernuloides* A. Adams.

Inter alia Mollusca Japonica a clar. A. Adams Museo Senckenbergiano Francofurtano ad Moenum missa, specimen unicum huius conchae exstat *Ledae pernulae* Mülleri tam simile, ut notis gravioribus ab ea vix differre mihi videatur. — Hanc testam nullibi descriptam invenire potui.



**Genus Yoldia Möller.**

**Yoldia Japonica Adams et Reeve (Nucula).**

Voy. Samarang Moll. pag. 75. Tab. 21. fig. 9. Sow. Thes. Conch. Leda (Yoldia) no. 65. fig. 14.

Mare Japonicum. Nagasaki.

Haec species in nostra collectione deest.

**Yoldia arctica Brod. et Sow.**

Zool. Journ. 4. pag. 359. Tab. 9. fig. 1. Cfr. G. B. Sow. Thes. Conch. vol. 3. pag. 138. fig. 12.

Nonnulli scriptores Nuculam lanceolatam J. Sowerby (Min. Conch. Tab. 180. fig. 1.) e tellure tertiaria fossilem pro eadem specie habent, quod ego quidem non confirmaverim.

Litus Kamschatkanum.

**Yoldia pygmaea Münster (Nucula).**

Goldfuss Petr. Germ. pag. 157. Tab. 125. fig. 17. Phil. Enum. Moll. Sic. vol. 1. pag. 65. Tab. 5. fig. 9. (Nucula tenuis) pariter conf. vol. 2. pag. 46. et S. Hanley in Sow. Thes. Conch. vol. 3. pag. 145. fig. 26. 27.

Mare Ochotskense. Midd. Sib. Reise.

**Yoldia amygdalea Valenc. (Nucula).**

Zool. Venus Moll. Tab. 23. fig. 6. Sow. Thes. Conch. vol. 3. Nuculidae pag. 139. fig. 8. 10. 11.

Kamschatka.

**Genus Sarepta A. Adams.**

**Sarepta speciosa A. Adams.**

Ann. and Mag. Nat. Hist. Apr. 1860. pag. 303.

Mino-shima, fretum Coreanum.

Genus inter Nuculam et Malletiam intermedium.

**Pectinea.**

**Genus Pecten Brug.**

**Pecten crassicostatus Sowerby.**

Tab. nostra 13. fig. 28. var. aurantia.

Thes. Conch. vol. 1. pag. 75. Tab. 15. fig. 111. Tab. 17. fig. 152. Reeve Conch. icon. vol. 8. spec. 64. a. b.

Duo specimina pulcherrima exstant alterum unicolor aurantium costis crassis rotundatis 24 squamis erectis latis tenuibus sulcisque paene laevibus, exceptis nonnullis minutim imbricatis instructum, alterum paululum majus et latius colore albescenti marginem versus vivide rubro excellens; costae tantum 22 in eo numerantur.

Pecten crassicostatus e mari Chinensi satis cognitus, colore pervariabili invenitur; modo est unicolor carneus, subroseus, purpurascens, rarius croceus vel aurantius, modo maculis livido

-purpureis marmoratus et aspersus. Plerumque altitudo testarum longitudini respondet, interdum vero altitudo longitudinem superat; pariter costarum numerus paulum variabilis est.

A Pectine senatorio haec species testa costisque crassioribus satis differt, sed *Pecten nobilis Reevei* (Conch. icon. vol. 8. spec. 3.) nostrae speciei tam affinis est, ut eum pro forma tantum gigantea *Pectinis crassicostati* declaraverim. Inter specimina nostrae collectionis unum exstat permagnum, quod cum icone *Reeveana* plane congruit et eandem quoque picturam offert.

Cum specimina, quae in collectionibus asservantur, plerumque detrita sint et squamis integris careant, in Tabula nostra 13. fig. 28. specimen aurantium illaesum depinximus.

#### *Pecten squamatus* Gmelin (*Ostrea*).

Tab. nostra 11. fig. 14.

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3329. Sowerby Thes. Conch. vol. 1. pag. 70. Tab. 13. fig. 57. 58. Reeve Conch. icon. vol. 8. spec. 82.

Species pervariabilis tam formatione costarum majorum atque minorum, quam colore; costae enim primariae plus minusve squamigerae atque adeo sine ullo squamarum vestigio obveniunt; pariter color et picturae natura mutabiles sunt. Specimina Japonica ex parte colore vividissimo aurantio, coccineo et sulphureo picturaque concinna excellunt. Specimen aurantium in Tabula nostra depictum est.

#### *Pecten lividus* Lam.

Anim. sans vert. vol. 7. pag. 154.

Haec species antecedenti affinis, a clar. Sowerby (Thes. vol. 1. pag. 69.) *Pectinibus sulphureo* Lam. et *Tegula Wood* inclusis ut concha Japonica (et maris rubri) enumeratur. In nostra *Molluscorum Japonicorum* serie desideratur.

#### *Pecten irregularis* Sowerby.

Tab. nostra 11. fig. 2. et 15.

Thes. Conch. vol. 1. pag. 69. Tab. 13. fig. 51. 52. Reeve Conch. icon. *Pecten* Tab. 4. fig. 19. a. b. non *P. irregularis* Küst. in Chemn. Conch. Cab. ed. alt. pag. 76. Tab. 19. fig. 4., qui ad *Pectinem* ornatum Lam. pertinet.

Specimina complura colore picturaque variantia exstant iconibus Sowerbyanis et Reeveanis ex parte quidem respondentia. *Pecten limatula Reevei* (Conch. icon. spec. 124.) huc quoque pertinere videtur, cum inter specimina nostra unum iconi citatae respondeat. Specimen alterum juvenile colore sulphureo maculisque sanguineis inter costas primarias insigne est.

#### *Pecten quadriliratus* Lischke.

Malak. Bl. 1870. pag. 29. Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 158. Tab. 9. fig. 5. 6.

Nagasaki.

#### *Pecten similis* Laskey.

Mem. Wern. Soc. 1. pag. 387. Tab. 8. fig. 8. J. G. Jeffreys Notice of Shells dredged by Cap. St. John in Korea Strait Linn. Soc. Journ. vol. 14.

Fretum Coreanum.

*Pecten Jickelii* Dkr.

Zeitschr. für Mal. vol. 24. pag. 72. nomine *Pectinis trifidi*.

Testa solidula inaequalis tumida, subaequilatera, paululum obliqua, costis 18 regulariter tricarinatis oblique striatis instructa; interstitia costis angustiora transversim subtiliterque striata; umbones tumidi inaequales; umbo valvae dexteræ prominulus; color fuscus albo-marmoratus et variegatus.

Mare Japonicum. Exstat in coll. Loebbeckeana.

Testa 27 mill. alta totidemque paene lata, 17 mill. crassa, structura costarum singulari trifida valvisque tumidis insignis, habitum *Pectinis ventricosi* Sow. nondum adulti prae se fert.

*Pecten vesiculosus* Dkr.

Tab. nostra 11. fig. 1.

Zeitschr. für Mal. vol. 24. pag. 72.

Testa solidula paulum obliqua inaequalis, costis radiantibus 16 aequalibus rotundatis obsolete striatis paene laevibus, utrinque lamellatis, interstitiis tenerrime striatis transversimque cancellatis instructa; auriculae valde impares acute costatae, ad marginem utrinque plicatum subserratae; color externus rubescens vel albus et rubro variegatus, internus albus et roseus.

Duo specimina exstant alterum 16 mill. altum totidemque latum, 9 mill. crassum, alterum 27 mill. altum et paululum latius. In hoc specimine majore lamellae passim clausae i. e. coalitae sunt, ita ut vesiculosae appareant, quae structura singularis certe in omnibus speciminibus observari potest, si modo obveniant integra.

Inter omnes *Pectinum* species *P. Tissoti Bernardi* nostrae speciei proximus esse videtur, qui vero costis pluribus nec non valvis aequaliter differt. Praeterea structurae vesiculosae in descriptione nulla fit mentio.

*Pecten Tissoti Bernardi*.

Journ. de Conch. 1858. pag. 91. Tab. 1. fig. 2. (sine indicatione patriae).

Inter *Pectines* Japonicos unum inveni qui cum descriptione supra laudata notis primariis convenit, ita ut eum cum hac specie jungendum esse censeam.

*Pecten spectabilis* Reeve.

Tab. nostra 11. fig. 12. 13.

Conch. icon. vol. 8. spec. 128.

Cum icon Reeveana secundum specimen juvenile desumpta sit, hanc concham pulcherrimam iterum hic depinxi. Costarum structura et pictura ex icone statim elucentes, variables esse non videntur.

Mare Japonicum. Nagasaki.

Quantum scio patria huius *Pectinis* ad hoc tempus haud innotuit.

*Pecten laetus* Gould.

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 8. pag. 39. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 169. Tab. 12. fig. 6. 7

Clar. Lischke hanc speciem fusius tractavit.

Jedo, Hakodate, Yokohama.

Dunker, Moll. Jap. mar.

*Pecten Yessoënsis* Jay.

Rep. on the Shells coll. by Jap. Exped. under the comm. of Commodore Perry 1856. pag. 293. Tab. 4. fig. 1. 2. Tab. 3. fig. 3. 4. (Icones valde mediocres.) Dunker Nov. Conch. pag. 61. Tab. 21. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 165. vol. 2. pag. 157. *Pecten Brandtii* Schrenck Bull. de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersb. vol. 4. pag. 411. *P. jessoënsis* Schrenck Amurl. pag. 484.

Hakodate etc.

Sculptura singularis lamellosa et vesiculosa in fundo subreticulata qualem secundum specimen nostrae collectionis depinxit clar. Lischke (vol. 1. Tab. 10. fig. 3. 4.) praesertim in pullis observatur.

*Pecten plica* Lin. (*Ostrea*).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 697. ed. 12. pag. 1145. Reeve Conch. icon. vol. 8. spec. 16.

Haec species in variis regionibus obvenit. Specimina collectionis nostrae Japonica, Chionensia et maris rubri omnino congruunt.

Ad *Pallia Martinii* vel *Dentipectines Rüppellii* pertinet, qui tuberculis seu dentibus obsoletis in cardine notantur.

*Pecten subplicatus* Sowerby.

Thes. Conch. vol. 1. pag. 64. Tab. 13. fig. 37. Tab. 14. fig. 72. 73. 81. Reeve Conch. icon. spec. 17.

*Philippinae insulae.* (H. Cuming).

Una tantum valva dextera Japonica exstat minor costis quatuor, duabus mediis latis, utrinque una angustiore instructa.

Haec species *Pectini plicae* Linnaei similis est, sed valvis tenuioribus magis compressis, auriculis majoribus et praesertim cardine differt, qui non est denticulatus; nihilo tamen minus a clar. H. et A. Adams *Dentipectinum* sectioni adjungitur.

*Pecten vitreus* Chemn. (*Pallium*).

Chemn. Conch. Cab. vol. 7. Tab. 67. fig. 637. lit. a. nec Sow. neque Roem. *Ostrea vitrea* Gmel. Syst. Nat. pag. 3328. Cfr. Philippi Abb. vol. 1. pag. 203., ubi jam anno 1845 de hac specie uberius scripsi.

Specimina nostra Japonica iis omnino respondent, quae ad litora Norwegiae, Groenlandiae aliisque in terris septentrionalibus obveniunt. Unum exemplar exstat in *Hyalonema Sieboldii* insidens. Praeterea pro speciebus Japonicis enumerandi sunt:

*Pecten Swiftii* Bernardi.

Journ. de Conch. 1858. pag. 90. Tab. 1. et 2. fig. 1. Schrenck Amurl. Moll. pag. 487. Tab. 21. fig. 1. 2. 3.

Haec species singularis in insulis Kurilis aliisque locis maris Japonici septentrionalis haud rara, a clar. Schrenk l. l. uberrime tractata est.

*Pecten Islandicus* Müller.

Zool. Dan. prodr. pag. 248. Schrenck Amur. Moll. pag. 490.

Haec species arctica omnibus nota clar. Schrenckio teste et in mari Beringii et in litore Kamschatkano inventa est.

*Pecten asperulatus* Adams et Reeve.

Voy. Samar. Moll. pag. 74. Tab. 21. fig. 13.

Fretum Coreanum.

**Genus Amussium Klein.**

*Amussium Japonicum* Gmel. (*Ostrea*).

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3317. *Amussium Japonicum maximum* Chemn. Conch. Cab. vol. 7. pag. 288. fig. 596.

Specimen minus exstat.

*Pecten Baloti Bernardi* (Journ. de Conch. vol. 9. pag. 46. Tab. 1. fig. 1.) certe nil nisi varietas *Pectinis Japonici*.

*Amussium obliteratum* (*Ostrea*).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 697. Chemn. Conch. Cab. vol. 7. pag. 324. fig. 622—624.

Specimen exstat cum *Chinensibus* et *Javanis* quae possidemus conveniens.

*Amussium Pleuronectes* Lin. (*Ostrea*).

Syst. Nat. ed. 10. pag. 696. Mus. Lud. Ulr. Reg. pag. 524. „Testa mediocris, laevis, orbiculata, tenuis, ut radii tantum interius conspiciantur, plano-convexa.” Chemn. Conch. Cab. vol. 7. pag. 284. fig. 595. *Amussium Rumphii*.

Haec concha, cum antecedentibus arctissime cognata, praesertim in mari Chinensi haud rara, pariter in litore Japonico obvenire dicitur. In nostra collectione deest.

Hae tres species interne tantum costatae, externe laeves, valvis plano-convexis, una alba vel pallidiore, altera rufa, fusca vel hepatica, ut pisces a latere natantes *Pleuronectae* nominatae, sectionem *Pectinum* admittunt bene terminatam dignam quae pro genere proprio habeatur. Species quaedam fossiles ex. gr. formationis sic dictae triasinae et oolithicae pari modo huc pertinent. (*Genus Pleuronectites Schlotheimii*.)

**Genus Vola Klein.**

*Vola laqueata* Sowerby (*Pecten*).

Thes. Conch. vol. 1. pag. 46. fig. 101. (1842). *Pecten Antonii* Phil. Abb. vol. 1. pag. 99. Tab. 1. fig. 1. (1844). Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 167. et vol. 2. pag. 157. Tab. 12. fig. 1. 2. (specimen pergrande).

Specimina juniora et adulta colore variabilia exstant.

Clar. Philippi hanc speciem l. c. bene descripsit, sed sine indicatione patriae. Costae valvae inferioris latissimae semper inveniuntur glabratae aut sublaeves imo statu integerrimo, non enim sunt detritae, quod dixerit aliquis.

*Vola excavata* Anton (*Pecten*).

Verz. pag. 19. 1839. Phil. Abbild. vol. 1. pag. 201. Tab. 2. fig. 1. *Pecten Sinensis* Sowerby Thes. Conch. vol. 1. pag. 48. Tab. 16. fig. 120. 121. 134.

Species colore picturaque variabilis, modo unicolor fusca, vel albo-maculata, modo cinerea, fusco-strigata et marmorata. Specimen quod exstat maximum 65 mill. latum, 60 altum est, sed

testae multo majores usque ad 95 mill. latae obveniunt. Costarum numerus aliquantum mutabilis; costae valvae superioris planae utrinque angulatae.

### *Vola puncticulata* Dkr.

Tab. nostra 11. fig. 10. 11.

*Pecten puncticulatus* Dkr. Ztschr. f. Mal. vol. 24. pag. 71.

Testa tenuicula aequilatera, valde inaequalis, valva sinistra concava immersa costis 12—14 angustis rotundatis radiata, concentrice obsoleteque striata, rosea umbonem versus alba, punctis subtilibus densis albis et rufis undique aspersa lineisque angulatis albis et rufis picta, valva dextera valde profunda, costis latis fornicatis obsolete striatis costarum interstitiis valvae alterius respondentibus instructa, rosea albo- et rufo-punctata et marmorata; auriculae magnae aequales obsolete striatae; latus internum album rufo-marginatum. — Lat. 33, alt. 30 mill.

Plura specimina, ex parte juvenilia exstant pictura congruentia.

Haec species inter Volas ad hoc tempus notas antecedenti certe proxima, costis rotundatis valvae superioris, quae operculum inferioris quasi format, nec non pictura concinna prorsus aliena differt. Praeterea multo tenuior et delicatior conformata est.

Haec concha venusta a Japonis „Hana-ita-ya“ nominatur.

In iconibus nostris color nimis opacus est, et in figura 10. valva superior valde concava fere convexa apparet.

### *Vola inaequalis* Sow. (*Pecten*).

Thes. Conch. vol. 1. pag. 50. fig. 193—195. Reeve Conch. icon. vol. 8. *Pecten* spec. 1.

Duo specimina exstant jam antea ex Japonia accepta, praeterea specimina e Philippinis insulis allata, beatus H. Cuming quondam mecum communicavit.

Haec species parvula costis 20—22 elevatis, rotundatis et laevigatis paene aequalibus interstitiisque excavatis transversim tenuissimeque striatis instructa est, quae quidem striae in speciminibus integerrimis tantummodo observari possunt. Valvula superior vel sinistra plano-convexa, — non concava, ut in Volis solet — cana, maculis fuscis vel nigricantibus, interdum albidis variegata; valva dextera convexa semper alba, sed maculis rubescentibus passim aspersa.

Volae vel Janirae Schumacheri pariter pro genere a Pectinibus veris discernendae sunt. Species quaedam insignes jam fossiles inveniuntur imprimis in formatione cretacea.

### Genus *Lima* Bruguière.

#### *Lima squamosa* Lam.

*Ostrea Lima* Linnaei Mus. Lud. Ulr. Reg. pag. 532. Rumphii Mus. Tab. 44. fig. D. Lam. anim. sans vert. vol. 7. pag. 115. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 162.

Haec species in terrarum orbe late dispersa est. Specimina Japonica et Chinensia nullo modo differunt a mediterraneis vel aliarum regionum.

**Lima Japonica Dkr.**

Tab. nostra 11. fig. 8. 9.

Ztschr. für Mal. vol. 24. pag. 70.

Testa ovata, plano-convexa, antice perparum hians, costulis minutissimis densissimis divergentibus medio angulatim confluentibus instructa; epidermide cornea induta; auriculae minimae obtusangulae; cardo crassiusculus obsolete plicatus, antice tuberculis binis munitus.

Mare Japonicum.

Singulae tantum valvae exstant vix 25 mill. altae, ambitu paululum variantes.

Haec species, quam nullibi descriptam aut depictam inveni, respectu habito costarum *Limaé tenerae* Chemnitzii respondet, sed forma angustiore, valvis minoribus convexioribus umbones versus magis attenuatis nec non auriculis multo minoribus differt.

**Spondylea.**

**Genus Spondylus Lin.**

**Spondylus regius Lin.**

Syst. Nat. ed. 10. pag. 690. Mus. Lud. Ulr. pag. 511. Rumphii Mus. pag. 156, no. 8. *Ostreum echinatum* maximum et monstrosum. Schröter Einl. vol. 3. pag. 205. Chemn. Conch. Cab. vol. 7. pag. 85. fig. 471. Lam. anim. sans vert. ed. 2. vol. 7. pag. 187. Deless. Rec. Tab. 20. fig. 1. 2. Sow. Thes. Conch. vol. 1. pag. 424. Tab. 84. fig. 30.

Specimen junius exstat 70 mill. altum, statura regulari, area cardinis subtiliter striata, auriculis parvis valvisque convexis paene aequalibus insigne.

Costae magnae, in valva superiore sex, in inferiore septem, spinis longis distantibus erectis inferne canaliculatis armatae sunt, costarum vero intervalla costellis numerosis inaequalibus imbricatis et aculeatis occupantur. Color vivide aurantius, interne albus excepto margine pariter aurantio. Specimina quoque inveniuntur tota alba (Delessert Rec. Tab. 20. fig. 2.), rosacea, pallide purpurea vel colore variegato tincta. *Spondylus regius* ad majores generis sui species pertinet et ipsam capitis infantis magnitudinem aequat, ut jam docuit Linnaeus.

*Spondylus regius* Lin., armatus Sow. et imperialis Chemn. habitu magis regulari, valvis paene aequalibus spinisque longissimis insignes, propriam formant *Spondylorum* sectionem et in speciminibus quibusdam fossilibus ex. gr. *Spondylo spinoso* Sow. telluris cretaceae repraesentatam. Hae species solutae et liberae, vel aetate tantum juvenili lapidibus aliisve corporibus affixae sunt, ita ut testae omnibus partibus perfectae regulariter crescere possint. Hanc *Spondylorum* divisionem *Eleutherospondylos* nominaverim.

**Spondylus Sinensis Sow.**

Thes. Conch. vol. 1. pag. 427. Tab. 137. fig. 32. 33. 34.

Varietates tres Japonicae exstant huius speciei e mari Sinensi satis cognitae, una paene tota alba est, in umbone tantum fusco-variegata, altera ad umbonem sanguinea et livida, marginem versus pallidior, tertia tota fusca, umbonem versus in colorem sanguineum transiens. Rarius specimina quoque apparent colore croceo et sulphureo tincta. Squamae costarum laeves plerumque depressae, raro erectae plus vel minus formam spatularum referunt.

Specimen Chinense nostrae collectionis eximiam altitudinem 100 mill. attingit. „Umi-giku“ Japanorum.

*Spondylus nudus* Chemn.

Conch. Cab. vol. 11. pag. 235. fig. 1989. 1990. Sow. Thes. Conch. vol. 1. pag. 430. Tab. 88. fig. 39. 40. Reeve Conch. syst. vol. 1. Tab. 119. fig. 10. valva superior minor.

Unum specimen in mari Japoniae mediterraneo prope Wakayama captum exstat album radiis roseis pictum.

Haec species respectu habito coloris satis variabilis invenitur. Suspicio *Spondylum sanguineum* in Novitatibus meis conchyliologicis pag. 26. descriptum et Tab. 7. fig. 4. 5. depictum *Spondyli nudi* varietatem esse.

*Spondylus cruentus* Lischke.

Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 172. Tab. 12. fig. 1—5.

Duo specimina exstant forma et colore valde diversa; alterum majus ovatum 75 mill. altum, 56 latum est.

Valva ejusdem inferior plana, costis imbricatis et spinosis, laminis nonnullis areaque umbonis magna et resupinata instructa; valva superior modice convexa costis confertis inaequalibus imbricatis oblecta. Color utriusque valvae croceus et sulphureus in valva superiore maculis rufis passim variegatus. Specimen alterum vix 40 mill. altum, ambitu fere rotundato, colore excellit e sanguineo et coccineo commixto; area cardinis plana triangula, latissima, valde resupinata. Latus internum albidum margine rubro crenato cinctum. Ex his speciminibus et iis, de quibus jam disseruit clar. Lischke, elucet, hanc speciem sicut aliorum *Spondylorum* admodum variabilem esse tam habitu, quam colore, etsi plerumque sanguineo.

Hanc concham variabilem Japoni „Mitsudo-shako“ nominant.

*Genus Plicatula* Lam.

*Plicatula cuneata* Dkr.

Tab. nostra 11. fig. 3.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 73.

Testa parva solida, cuneato-trigona paene aequivalvis, umbones versus valde attenuata, lateribus plana costis senis vel septenis crassis interstitiisque obsolete imbricatis instructa, albida, strigis flammisque fulvis picturata. — Alt. 13—14, long. 9—10 mill.

Mare Japonicum.

Specimina tria adulta forma plane congruentia exstant.

Haec *Plicatula* parva sine dubio ad eas species pertinet, quae conchyliis aliisve corporibus marinis non sunt affixae, quod forma ejus regularis constanter cuneata paene aequivalvis satis demonstrat.

Inter vivas huius generis species nulla mihi innotuit, quae cum nostra conchula confundi possit.



*Plicatula simplex* Gould.

Otia conch. pag. 178.

In sinu prope Kago-shima haud rara.

*Plicatula muricata* A. Adams.

Tab. nostra 11. fig. 4.

Specimen integrum collectionis Loebeckeanae hic depinxi, quod descriptioni Adamsianae a Reeveo repetitae quidem respondet, sed fig. 9 a. b. certe aliam speciem repraesentat. Descriptionem Adamsii originalem nullibi invenire potui.

*Plicatula horrida* Dkr.

Tab. nostra 11. fig. 6. valva superior, fig. 7. valva inferior alterius speciminis.

Testa ovata vel subrotunda, costis octonis vel novenis angulatis, striisque incrementi sublamellatis instructa, squamis erectis acutis fistulosis horrida; color albus vel flavidus; costae interdum fusco tinctae.

Exemplaria exstant e mari Japonico et Chinensi.

Haec conchula varietates nonnullas illius speciei in mentem vocat, quam clar. Sowerby in Thes. Conch. vol. 1. pag. 437. nomine *Plicatulae imbricatae* Menkei (Spec. Moll. Nov. Holl. pag. 35.) descripsit et Tab. 90. fig. 6. delineavit, quae vero differt.

*Plicatula imbricata* Koch et Dkr. est species e formatione cretacea inferiore fossilis jam antea promulgata.

*Plicatula rugosa* Dkr.

Tab. nostra 11. fig. 5.

Malak. Bl. vol. 24. pag. 73.

Testa oblongo-ovata, umbones versus subattenuata, inaequalis, valva superior planiuscula, rugosa et cavernosa, inferior convexa; valva utraque plicis irregularibus rugosis, passim imbricatis instructa; umbones dextrorsum inclinati; color albus fusco variegatus. — Alt. 34 mill. lat. 20, crass. 11.

Unum tantum specimen exstat, plicarum natura et indole a speciebus ad hoc tempus notis discrepans. Cum vero *Plicularum* species quaedam admodum variabiles esse soleant sicut *Ostreae* affixae, difficile est dijudicatu num habendae sint pro varietatibus, an vero pro speciebus distinctis.

**Anomiacea.**

**Genus *Anomia* Lin.**

*Anomia ephippium* Lin. var.

Huius speciei late dispersae duo specimina Cassidi strigatae insidentia exstant ovato-rotundata pellucida, obtuse irregulariterque costata, rugosa et granosa, colore succineo tincta, quae varietas Linnaeo erat *Anomia electrica*. Praeterea singula valva convexa atque costata adest, quae *Pectini* cuidam affixa fuisse videtur, ut costis radiantibus quibus excellit, conjectari potest, nam

hae conchae superficiem — sculpturam scilicet sic dictam — eorum Molluscorum semper imitantur quibus sunt affixae. Hanc ob causam habitu se repraesentant valde variabili, atque non mirandum est, quod insignes quaedam formae pro speciebus genuinis habitae variisque nominibus sejunctae sunt. Cuius interest permulta Anomiae nostrae synonyma cognoscere, dissertationem Grayanam de Anomiis in Proc. Zool. Soc. 1849. pag. 113. legat.

Praeterea hae Anomiarum species ut Japonicae enumerantur:

*Anomia radulina* A. Adams.

Ann. Mag. Nat. Hist. vol. 8. 1861. pag. 142.

Mino-shima.

*Anomia pustulosa* A. Adams.

ibid.

Tabu-shima.

*Anomia cytaeum* Gray.

Proc. Zool. Soc. 1849. pag. 115. Reeve Conch. icon. *Anomia* spec. 10.

Hakodate (de Schrenck).

*Anomia laqueata* Reeve.

Conch. icon. *Anomia* spec. 18.

Hakodate Schrenck.

De his vero speciebus pariter admodum variabilibus certe dijudicare nequeo.

**Genus Placunanomia Brod.**

*Placunanomia macroschisma* Desh. (*Anomia*).

Reev. Soc. Cuver. 1839. pag. 359. Mag. de Zool. 1841. Tab. 34. Philippi Abb. vol. 3. pag. 132. Tab. 1. fig. 4. Carpenter Rep. 2. pag. 586.

Jedo. Hakodate.

*Placunanomia umbonata* Gould.

Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 8. pag. 39. Otia Conch. pag. 178.

Kago-shima (Stimpson).

Cfr. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 180.

**Genus Placenta Retz.**

*Placenta orbicularis* Retz.

Diss. pag. 15. *Anomia placenta* Lin. Syst. Nat. ed. 10. pag. 703. ed. 12. pag. 1154. Mus. Lud. Ulr. pag. 536. „Testa plana hyalina, pellucida, orbicularis, vix manifeste striata, intus nitida, macula in medio glaberrima orbiculari; valva altera vix manifeste convexa, altera vero omnino plana. Cardo singularis ex fibris duabus intra discum testae adnatis, apicem versus posticum convergentibus, introrsum autem divaricatis, altera brevior.“ *Placuna placenta* Lam. anim. sans vert. ed. 2. vol. 7. pag. 270. *Placenta orbicularis* Woodward Ann. and Mag. Nat. Hist. sec. ser. vol. 16. pag. 25.

Mare Japonicum et Chinense.

H. et A. Adams Placunas et Placentas pro generibus propriis habuerunt, quam quidem disjunctionem comprobare non possum. Cfr. Journ. de Conch. 1879. pag. 215.

## Ostreacea.

### Genus Ostrea Lin.

#### *Ostrea gigas* Thunberg.

Specimina juniora forma variantia, sed universe oblonga exstant lamellis crassis erectis instructa. Valva inferior subrostrata concava, superior planior et brevior.

Ostreae Laperousii Schrenck et Talienwhanensis Crosse certe ad hanc speciem pertinent, quod jam docuit clar. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 174. vol. 3. pag. 114.

Ostrearum testae triplicem ostendere solent structuram, lamellosam parum iridescentem, fibratam splendore sericeo insignem et cretaceam opacam, quae triplex structura in hac nostra specie bene observari potest.

#### *Ostrea dense lamellosa* Lischke.

Malak. Bl. vol. 16. pag. 109. Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 177. Tab. 13. fig. a. b. Tab. 14. fig. 1. Cfr. *Ostrea auriculata* Sow. Reeve Conch. icon. *Ostrea* spec. 60.

Specimina complura adsunt juniora et adulta notis praecipuis congruentia. Omnia auricula in latere valvae inferioris sinistro plus minusve extensa instructa sunt. Quamvis in Ostreis haud raro inveniatur margo cardinis alae instar extensus, tamen auricula illa vel ala in nostra specie ad notas principales pertinere videtur. Varietati magnae Ostreae edulis Lin., quae Lamarckio erat *O. hippopus* proxima et notis quibusdam analogae est. Apud Japanos „Ahabi“ nominatur.

#### *Ostrea folium* Lin.

Syst. Nat. ed. 10. pag. 699. ed. 12. pag. 1148. Mus. Reg. Lud. Ulr. pag. 534. Rumphii Mus. Tab. 47. A. Chemn. Conch. Cab. vol. 8. pag. 21. fig. 662—666. Testa inaequali ovata parasitica lateribus obtuse plicatis. Valva superior costa lata longitudinali; valva inferior canali profundo distinguitur. Adhaeret ramis arborum maris.

Haec species maris Indici haud rara forma satis constans, sed colore variabilis est. Commutari non debet cum *Ostrea fronde* Linnaei, pariter unguibus suis Gorgoniarum ramulos amplectens, quae ex Antillis insulis provenit.

Specimina tantum minora adsunt prope Wakayama lecta.

#### *Ostrea plicata* Chemn. var.

Conch. Cab. vol. 8. pag. 34. Tab. 73. fig. 674.

„Testa subrotunda parasitica, ex cinereo et obscure coeruleo violacea, obtuse plicata, plicis rugosis et imbricatis, margine plicato.“

Gmelinus nomen temere mutavit in „*Ostrea plicatula*“ (Syst. Nat. pag. 3336). *Ostrea glaucina* Lam. nil nisi varietas est. *Ostrea plicata* Dfr. est species quaedam telluris tertiariae fossilis; *Ostrea plicata* Nilsson = *Ostrea Nilssoni* Br. ad formationem Sueciae cretaceam pertinet.

Dunker, Moll. Jap. mar.

E mari Japonico unum exstat exemplar paene rotundatum costis radiantibus obtusis subimbricatis instructum. Valva planior utroque umbonis latere squamis tubulosis insignis est. Color in eo non obscure coeruleus ut solet, sed rufus et gilvus.

*Ostrea cucullata* Born.

Test. Mus. Caes. Vind. pag. 114. Tab. 6. fig. 11. 12.

Bornius hanc *Ostream* hisce verbis adumbrat:

Testa inaequali\*), plicato-rugosa, margine dentato, intus striato, valva majore cucullata. Testa solida ponderosa, plicis longitudinalibus rugisque transversis; valvae inaequales, altera minore plana, altera cucullata rudi; apex porrectus, postice longitudinaliter sectus; margo utrinque obtuse dentatus; limbus striis distantibus elevatis geminis; color extus atro-violaceus.

Haec verba et icones supra citatae generatim ac universe in specimina nostra quadrant, quae quidem minora sunt.

*Ostrea cornu copiae* Chemn. (Conch. Cab. vol. 8. pag. 42. Tab. 72. fig. 679) sine dubio eadem est species ut Chemnitzius ipse affirmat, nihilo minus tamen denominationem Bornianam mutavit. Ut mea fert opinio *Ostrea Forskålii* Chemn. Conch. Cab. vol. 8. pag. 30. Tab. 72. fig. lit. a. et b. pariter huc referenda est, sed species fossilis l. l. commemorata, a beato Forskål ex Aegypto Hafniam quondam missa, huc non pertinet.

*Ostrea imbricata* Lam.

Anim. sans vert. ed. alt. vol. 7. pag. 235. Rumphii Mus. Tab. 47. fig. C. (icon quidem rudis, sed propria et bene expressa).

Exemplaria juniora exstant.

Haec species satis frequens e mari Sinensi praesertim cognita, minime cum *Ostrea hyoti* Linnaei jungenda est, ut Deshayesius opinatur. Multum differt structura et colore.

*Ostrea arborea* Chemn.

Conch. Cab. vol. 8. pag. 46. Tab. 74. fig. 681. „*Ostrea rivularis* Gould“ Lischke Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 176. Tab. 14. fig. 2. 3.

Specimen junius exstat prope Nagasaki lectum, strigis radiantibus irregularibus fusco-vio-laceis pictum; specimen alterum adultum a clar. Lischke l. c. depictum est. (Color in icone nimis vividus.)

Haec species plerumque lignis fluctuantibus adnata, a Lamarckio (anim. sans vert. vol. 7. pag. 224.) cum *Ostrea parasitica* Gmel. jungitur signo quidem interrogationis. *Ostrea rivularis* Gouldii species mihi est admodum dubia, ergo concham nostram ad *Ostream arboream* refero, quae satis respondere mihi videtur.

---

\*) Omnes *Ostreae* sunt inaequivalves.

## Brachiopoda.

### Genus *Terebratula* Luid.

*Terebratula minor* Phil. et Suess.

*Terebratula vitrea* var. *minor* Phil. Enum. Mollusc. Sic. pag. 99. Tab. 6. fig. 8. *Terebr.*  
*affinis* Calcare. *Terebr. Davidsoni* A. Adams Proc. Zool. Soc. 1867. pag. 314. Tab. 19. fig. 30.  
*Satanomosaki.* A. Adams.

*Terebratula Blanfordi* Dkr.

Tab. nostra 14. fig. 4. 5. 6.

Testa laevigata tenuis, pellucida, sordide alba subcornea, lato-ovata subpentagona, ventrosa, sed valva dorsi valva ventris convexiore, laterum media parte arcuata, basi sinuata, plicis duabus latis obtusis a rostro subacuto curvo decurrentibus insignita; apertura rotunda magnitudine modica. — Long. a rostro usque ad sinum medium 30 mill., lat. max. totidem, crass. 18.

Mare Japonicum mediterraneum prope Wakayama.

Haec species, quam nullibi descriptam invenire potui, forma sua subpentagona, sinu plus vel minus expresso et plicis obtusis ab apice decurrentibus, basin versus distinctius prominentibus insignis est. Leviter inspecta formas *Terebratularum* quasdam fossiles in memoriam reducit, sed accuratius cum iis comparata ab omnibus satis differt.

Denominata est in honorem clar. W. T. Blanford, Molluscorum terrestrium Indiae scientissimi investigatoris.

### Genus *Terebratulina* Orbigny.

*Terebratulina caput serpentis* Lin. (*Anomia*).

Syst. Nat. ed. 12. pag. 1153. Born Mus. pag. 119. Tab. 6. fig. 13. Chemn. Conch. Cab. vol. 8. pag. 72. Tab. 78. fig. 712. (icon. rudis). Sow. Thes. Conch. vol. 1. pag. 343. Tab. 68. fig. 1—4.

*Terebratula* vel *Terebratulina Japonica* Sow. a clar. Davidsonio, pro varietate tantum habetur.

*Ter. caput serpentis* species maris Europaei septentrionalis vulgatissima, et in variis Japoniae regionibus obvenit.

*Terebratulina angusta* A. Ad. et Rve. (*Terebratula*).

Voy. Samar. pag. 71. Tab. 21. fig. 2.

Nescio an sit pariter cum specie antecedente jungenda?

*Terebratulinae* a *Terebratulis* veris limitibus certis disjunctae mihi non videntur.

### Genus *Waldheimia* King.

*Waldheimia Raphaelis* Dall.

Amer. Journ. of Conch. vol. 6. 1870. pag. 111. Tab. 7. fig. a—d. T. Davidson on Japanese Brachiopoda in Proc. Zool. Soc. 1871. pag. 303. Tab. 31. fig. 9.

*Litus Japonicum* prope Jedo.

**Waldheimia picta Chemn. (Anomia).**

Conch. Cab. vol. 11. fig. 2011, 2012. *Terebratula picta* Sow. Thes. Conch. vol. 1. pag. 351. Tab. 70. fig. 43, 44. Sow. Gen. of Shells no. 15. Reeve Conch. syst. vol. 1. pag. 181. Tab. 126. fig. 1. nomine *Terebratulae sanguineae*. *Waldheimia picta* A. Adams Ann. and Mag. Nat. Hist. 1863. pag. 99. Davidson in Proc. Zool. Soc. 1871. pag. 304. Tab. 31. fig. 10.

Species elegans testa ovata, tenui, glabra valvis dorsi et ventris paene aequaliter convexis, colore rubro maculisque albo flavescentibus ex parte fulguratis subradiatim ordinatis facile cognoscitur.

Specimina tria exstant in mari Japoniae mediterraneo collecta.

**Waldheimia Grayi Davidson (Terebratula).**

Proc. Zool. Soc. 1852. pag. 76. Tab. 14. fig. 1—3. W. Grayi A. Adams Ann. and Mag. Nat. Hist. 1863. pag. 99. Davidson on Japanese Brachiopoda in Proc. Zool. Soc. 1871. pag. 304. Tab. 31. fig. 7, 8.

Exemplar junius paululum deformatum et decoloratum singulaeque valvae exstant prope Tokio lectae.

**Genus Terebratella Orbigny.**

**Terebratella Coreanica Ad. et Rve. (Terebratula).**

Voyage of the Samarang Moll. pag. 71. Tab. 21. fig. 3. A. Adams Ann. and Mag. Nat. Hist. 1863. pag. 99. *Terebratula Coreanica* L. de Schrenck Mollusken des Amurlandes pag. 468. Tab. 18. fig. 1—7. Davidson l. l. Tab. 31. fig. 4, 5. *Terebratulam miniatam Gouldii* eandem esse speciem affirmat A. Adams.

*Terebratella Coreanica* tam colore quam habitu variabilis in mari Japonico praesertim septentrionali haud raro invenitur.

Specimina maxima ex parte cortice calcareo incrustata a clar. Joanne Rein lecta sunt.

**Terebratella frontalis Midd. (Terebratula).**

Beitr. zu einer Mal. Ross. 2. pag. 518.

*Litus australe* Maris Ochotskensis.

**Terebratella Mariae A. Adams.**

Ann. and Mag. Nat. Hist. 1860. pag. 412. 1863. pag. 99. T. Davidson l. c. pag. 305. Tab. 30. fig. 15—17. Uraga, Goto, Satanomosaki.  
Haec species nobis deest.

**Terebratella Spitzbergensis Davidson.**

Cfr. Japanese Brachiopoda in Proc. Zool. Soc. 1871. pag. 305. Tab. 30. fig. 13, 14.

**Subgenus Laqueus Dall.**

**Laqueus rubellus Sow. (Terebratula).**

Thes. Conch. vol. 1. pag. 350. Tab. 69. fig. 40—42. de Schrenck Amurl.-vol. 2. Moll. pag. 466. *Waldheimia cranium* A. Adams. (non Müller) Ann. and Mag. m. Febr. 1863. *Laqueus suffusus* Dall. Amer. Journ. of Conch. vol. 1. pars 2. pag. 125. Tab. 7. figg. g. h. s. Davidson l. c. pag. 306. Tab. 30. fig. 18—22.

Kuro-shima, Jokohama.

### Subgenus *Magasella* Dall.

#### *Magasella Adamsi* Davidson.

Japanese Brachiopoda in Proc. Zool. Soc. 1871. pag. 307. Tab. 30. fig. 23. 24.

Mare Japonicum (Kuro-Puna) A. Adams.

#### *Magasella Gouldi* Dall. M. S.

Davidson l. c. pag. 307. Tab. 31. fig. 11.

Hakodate.

### Genus *Megerlia* King.

#### *Megerlia sanguinea* Chemn. (Anomia).

Conch. Cab. vol. 8. pag. 96. fig. 703. (specimen maximum). *Anomia sanguinolenta* Gmel. Syst. Nat. ed. 13. pag. 3347. *Terebratula erythroleuca* Quoy et Gaim. Astr. vol. 3. pag. 557. Tab. 85. fig. 8. 9. *Terebratula sanguinea* Sow. Thes. Conch. vol. 1. pag. 357. fig. 71—73. *Ismenia sanguinea* A. Adams Ann. and Mag. 1863. pag. 99. Davidson l. c. pag. 308. Tab. 31. fig. 1. 2.

Mino-shima A. Adams. Insulae Philippinae H. Cuming.

Specimen nostrum minus vivide pictum in mari Japoniae mediterraneo captum est.

*Ismenia Reevei* A. Adams, quam auctor in Ann. et Mag. inter Mollusca Japonica enumeravit, nobis incognita est. Clar. Davidson eam pro varietate *Megerliae sanguineae* habet.

### Genus *Rhynchonella* Fischer de Waldheim.

#### *Rhynchonella psittacea* Gmel. (Anomia).

Syst. Nat. ed. 13. pag. 3348. Chemn. Conch. Cab. vol. 8. pag. 106. fig. 713. *Anomia rostrum psittaci*. Lamarck anim. sans vert. vol. 7. pag. 333. Reeve Conch. syst. vol. 1. pag. 182. Tab. 126. fig. 5. Sow. Thes. Conch. vol. 1. pag. 342. fig. 78—80. Schrenck Amurl. vol. 2. Moll. pag. 471.

*Litus Groenlandicum*, *Labradorensis* etc.

Specimina complura ex itinere in Japoniam facto retulit clar. J. Rein.

Haec species in indice Adamsiano deest, quamvis in Mari Japonico septentrionali haud raro inveniatur, at contra auctor *Rhynchonellam Woodwardi* enumeravit, quam quidem clarissimi Davidson et Jeffreys pro varietate *Rhynchonellae psittaceae* habent.

#### *Rhynchonella lucida* Gould.

Proc. East. Soc. Nat. Hist. 1860. pag. 323. Otia Conch. pag. 121. Adams Ann. and Mag. Nat. Hist. 1863. pag. 100. Davidson l. c. pag. 309. Tab. 31. fig. 13. 14.

Mare Japonicum.

Species singularis secundum clar. Jeffreys et Davidson *Rhynchonellae bipartitae* Brocchi e formatione subaennina affinis est.

**Genus Lingula Hwass.**

*Lingula anatina* Lamarck.

Anim. sans vert. ed. 2. vol. 7. pag. 390. Sowerby Thes. Conch. vol. 1. pag. 337. Tab. 67. fig. 1. 2. 3. 9. 10.

Exemplaria nonnulla exstant quae iconibus supra citatis aliqua ex parte respondent. Clar. Davidson inter Brachiopoda Japonica huius speciei non fecit mentionem, sed hasce alias Lingulas enumeravit:

*Lingulam tumidulam* Reeve.

Conch. icon. spec. 2. A. Adams l. c. pag. 100. Davidson l. c. pag. 310. Tab. 30. fig. 1.

*Lingulam smaragdinam* A. Adams.

l. c. pag. 101. Davidson l. c. pag. 310. Tab. 30. fig. 2.

Specimina nonnulla Lingulae exstant a clar. J. Rein allata, quae certe huc spectant. Lingulae coctae ut multa alia Mollusca a Japonis eduntur. Locis praesertim arenosis insulae Kiushiu una cum *Mya arenaria* Lin. aliisque Acephalis minuente aestu ope ratri capiuntur.

*Lingulam Dumortieri* Nyst.

Coq. et Polyp. foss. de la Belgique pag. 337. Tab. 34. fig. 4. *Lingula jaspidea* A. Adams Ann. and Mag. of Nat. Hist. 1863 pag. 101. Davidson l. c. pag. 310. Tab. 30. fig. 3.

Clar. Davidson *Lingulam jaspideam* cum *Lingula Dumortieri* conjunxit, sed hanc speciem formationis tertiariae fossilem eandem esse dubitaverim.

*Lingulam lepidulam* A. Adams.

Ann. and Mag. of Nat. Hist. 1863. pag. 101. Davidson l. c. pag. 311. Tab. 30. fig. 4.

Mare Japoniae mediterraneum.

Lingulae difficillimae sunt ad distinguendum. Ut mea fert opinio de Lingularum testis variabilibus aliqua certitudine tunc demum judicari poterit cum multa specimina in promptu erunt quae comparentur.

**Genus Crania Retzius.**

*Crania Japonica* A. Adams.

Rec. Brachiopoda found in the Seas of Japan in Ann. and Mag. Nat. Hist. 1863. pag. 100. Davidson l. c. pag. 311. Tab. 30. fig. 6.

Insula Goto.

**Genus Discina Lamarck.**

*Discina stella* Gould.

A. Adams l. c. pag. 100. Davidson l. c. pag. 311. Tab. 30. fig. 5.

Seto-Uchi, Tsu-shima etc.

---



## Addenda et corrigenda.

---

Pag. 6.

*Murex* (*Phyllonotus*) *Yoldii* Mörch. nullibi descriptus, sed in Cat. Moll. Joldi pag. 95. pro specie Japonica enumeratus cum signo quidem interrogationis, mihi ignotus est.

Pag. 8.

### *Murex Japonicus* Dkr.

Inter synonyma huius speciei etiam *Fusus* (*Tritonium*) *submuricatus* Schrenck (Bullet. de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersb. vol. 4. pag. 411.) et *Murex inornatus* Recluz (Schrenck Amurl. vol. 2. pag. 414.) notandi sunt.

Ad *Siphonalia* imperialem Reeve pag. 18 commemoratam hic addo hanc cochleam a clar. Jeffreys pro forma *Buccini* undati monstruosa declaratam esse, quod nuperrime in sermone mecum communicavit amicus Kobelt. Hoc difficile est ad intelligendum, cum *Buccinum* undatum Linnaei, quamvis pervariabile, tam sculptura aliena quam pictura maculata et strigata deficiente ab hac nostra cochlea valde abhorreat.

Pag. 19.

### *Euthria viridula* Dkr.

Clar. E. A. Smith affirmat (Proc. Zool. Soc. 1879. pag. 206.) *Euthria* ferream Reeve (Buccinum) Conch. icon. vol. 3. spec. 102. specimen *Euthriae viridulae* detritum esse. Huic sententiae non repugno cum Reeve ipse cochleam politam nominaverit; sed conchylija detrita vel polita describi non debent.

Pag. 21.

### Genus *Citharopsis* A. Adams.

#### *Citharopsis cancellata* A. Ad.

Ann. et. Mag. Nat. Hist. Apr. 1865. pag. 323.

Testa utrinque acuminata, rufescens, anfractibus convexis per longitudinem costellatis lirisque transversis confertis eleganter cancellata; anfractus ultimus antice productus et acuminatus; spira aperturam aequans.

Mino-shima.

Haec species *Mitras* quasdam in mentem revocans, Genotis cognata est ut Adamsius docet; ergo ad *Pleurotomacea* pertinet.

Pag. 25.

### Genus *Mitromorpha* A. Adams.

*Mitromorpha lirata* A. Adams.

Ann. Mag. Nat. Hist. m. Apr. 1865. pag. 322.

Simonosaki, Seto-uchi.

Clar. auctor hanc testam pro *Daphnella mitraeformi* habet.

Pag. 28.

### *Tritonium Parthenopes* Salis.

Clar. H. C. Weinkauff de hac cochlea jam satis disceptata in *Journal de Conchyliologie* 1864. pag. 13. hanc synonymiam emendatam proposuit:

*Tritonium succinctum* Lamarek = *Murex olearium* Born non L. = *Murex parthenopus* Dillwyn = var. b. *Murex costatus* Born = var. c. *Murex argus fasciatus* Chemn. (*Tritonium Adansoni* Dkr.).

Pag. 30.

Versu 34 Muriceano lege Murice ano.

Pag. 36.

*Nassa tenuis* (Hima) E. A. Smith (*Proc. Zool. Soc.* 1879. pag. 211.) plane respondet *Nassae Japonicae* A. Ad. Clar. auctor nomen mutandum esse arbitratus est, quia specimen collectionis Cumingianae typicum invenire non potuit et descriptionem Adamsianam nimis incertam habuit. Icones huius cochleae, quas Lischke in opere suo offert, optime conveniunt cum specimenibus ab Adamsio ipso ad Museum Senckenbergianum missis.

Pag. 37.

### *Nassa festiva* Powis (Hima).

Haec species nunquam ad isthmum Panamensem reperta est. Cfr. E. A. Smith in *Proc. Zool. Soc.* 1879. pag. 211.

Pag. 52.

### *Mitra salmonea* Sow. var.

Hanc cochleam antea omisam in Tabula nostra 5 fig. 9 et 10. delineatam pro varietate minore et angustiore speciei Sowerbyanae habeo costis subtilioribus et anfractibus subangulatis instructam. Specimen *Mitrae salmoneae* typicum, quod amicus Loebbecke comparandi causa ad me misit, majus atque latius est, costae longitudinales in eo multo crassiores sunt et anfractus ultimi prope suturam perspicue angulati, ita ut gradati appareant. Columellae et peristomatis formatio plane conveniunt cum nostro specimine Japonico.

Ad *Costellarias Swainsoni* pertinet.

Pag. 56.

*Erato lacrima* Gray (Sow. Thes. Conch. vol. 3. pag. 82. Tab. 219. fig. 4. 5. 6.) addenda est, pariter in mari Japonico obvia.

Pag. 78.

*Turbonilla varicosa* Dkr.

Jam antea A. Adamsius speciem quandam sic nominavit (Gen. of rec. Moll. vol. 1. pag. 231), quod omiseram. Haec species mihi ignota, fortasse cum nostra convenit, cum inter permultas huius generis species excepta hacce nullam noverim varicibus instructam.

Pag. 86.

*Ebala virginea* A. Adams per errorem bis enumerata est.

Pag. 92.

*Conus Japonicus* Brug.

Enc. Méth. no. 104. Lam. anim. sans vert. vol. 11. pag. 89.

Haec species mihi ignota est.

Clar. Sowerby opinatur Conum Largillierti Kien. huc pertinere. Conf. Thes. Conch. vol. 3. pag. 14.

Pag. 95.

*Strombus vittatus* Lin. var.

Tempore novissimo specimen huius cochleae denuo accepi prioribus plane congruens. Comparatione specierum, quae Strombo vittato cognatae sunt, iterum facta, speciem Reeveanam nunc comprobo.

Pag. 99.

*Cypraea erronea* Lin.

In locis citatis erronee legitur, quod verbum vitio typographico ortum esse videtur. Ejusmodi errores in operibus Linnaei saepius obveniunt.

Pag. 106.

*Cerithium Guinaicum* Phil.

Specimina huius cochleae a clar. R. Greeff in sinu Guineensi lecta, satis variant sculptura. Anfractus infra suturam interdum vix coarctati, plerumque fascia alba lata cinguntur.

Pag. 108.

*Vertagus Pfefferi* Dkr.

Ad hanc speciem annotare licet clar. E. A. Smith in Proc. of the Zool. Soc. 1878. pag. 817. cochleam nomine *Cerithii turriti* Sow. enumeravisse, quae statura paululum minore excepta, cum specie nostra plane convenit. Sed icon Sowerbyana (Thes. Conch. vol. 2. Tab. 180. fig. 101.) anfractibus convexis totoque habitu a nostra cochlea discrepat et *Cerithiis* sensu strictiore injungenda est.

Dunker, Moll. Jap. mar.

Pag. 114.

*Conradia clathrata* A. Adams Ann. et Mag. 1860. pag. 410. est *Fossarus Adamsianus* Fischer. *Fossarus clathratus* Phil. maris Mediterranei est species diversa.

Pag. 121.

### **Genus Skenea Fleming.**

*Skenea cornuella* A. Adams.

Ann. Mag. Mai 1860. pag. 412.

Fretum Coreanum.

Rissoaceis inserenda est.

Pag. 124.

*Capulus dilatatus* A. Adams.

Iconibus 12. 13. 14. Tabulae nostrae 12. descriptionem hic adjicio, antea omissam:

Testa valde depressa, ovato-elliptica, strigillis obsoletis subundulatis radiantibus ex parte sub vitro tantum conspicuis oblecta; color pallide luteus, strigis obscurioribus a vertice prono et intorto decurrentibus notatus; epidermis tenuissima marginem versus subacutum paululum lamellosa; latus internum laevissimum nitidum; impressio musculi vix conspicua. — Long. 28—30; ratio mensurae numeris circiter 100, 85, 25 respondet.

Duo exemplaria prostant notis primariis congruentia.

Notandum hic est Lamarckium speciem *Capuli* cuiusdam telluris tertiariae fossilem nomine *Pileopsidis dilatatae* jam descripsisse, quapropter, si illa species fossilis ad idem *Capulaceorum* genus pertineat, nomen speciei, de qua hic est sermo, aptum nihilo secius mutandum est.

Pag. 128.

*Turbo variabilis* Reeve.

Clar. Philippi hanc speciem *Turbinem Reevei* nominavit, quia Grateloup anno 1842 pro specie fossili aliena hac denominatione jam usus est. (Cfr. Conch. Cab. ed. 2. pag. 48. Tab. 12. fig. 2.)

Pag. 131.

*Cyclostrema ammonoceras* A. Adams.

Ann. and Mag. Nat. Hist. 1863. Thes. Conch. vol. 3. pag. 252. Tab. 255. fig. 21. 22.

Speciebus Japonicis addendum est.

Pag. 137.

*Trochus iridescens* Schrenck.

Amurl. vol. 2. pag. 356. Tab. 15. fig. 19—24.

*Litus Jessoënsis*, Algis insidens.

Species parvula solidula ovato-globosa, apice acuta, turbiniformis, anfractibus quinque transversim costatis tenuiterque striatis, subcarinatis instructa; apertura suborbicularis, iridescens; operculum tenue corneum multigyratum.

Haec cochleola habitum *Turbinis* cuiusdam minoris prae se fert, sed operculo corneo instructa est. Quemnam locum in ordine systematico tenere debeat adhuc dubium est. Partes molles haud innotuerunt.

*Trochus Ochotensis* Midd. in lit.

(Phil. Conch. Cab. ed. 2. pag. 221. Tab. 34. fig. 1.)

hac ratione pariter incertus est.

Pag. 140.

*Euchelus Smithi* Dkr.

Tab. nostra 6. fig. 16—19.

Testa umbilicata globoso-conica, anfractibus senis vel septenis instructa, costulis sulcisque numerosis inaequalibus graniferis ex parte margaritatis cincta; basis convexa, costis spiratis laevioribus interstitiisque cancellatis sculpta; umbilicus pervius profunde canaliculatus; apertura rotundato-quadrata; columella valde sinuata callosa, denticulo acuto terminata; labrum intus sulcatum; color subcanus vel cinereo-rubescens. — Lat. max. 20, alt. 15 mill.

Mare Japonicum prope Wakayama.

Haec species concinna in honorem clar. E. A. Smith Londinensis nominata, sculptura elegantissima insignis, tota testa costulis angustis prominentibus imparibus graniferis cincta est, costae lateris inferioris planae paene laeves earumque intervalla cancellata. Color cinereus vel rubescens, in anfractibus superioribus maculis obscurioribus aspersus; apex acutiusculus albus; labrum fortiter sulcatum, in speciminibus adultis incrassatum, argenteo-margaritaceum.

*Trochus argenteo nitens* Lischke.

Malak. Bl. vol. 19. pag. 104. Jap. M. Conch. vol. 3. pag. 66. Tab. 4. fig. 1.

Sinus Jedoënsis et

*Trochus Alwinae* Lischke.

Jap. M. Conch. vol. 2. pag. 84. Tab. 6. fig. 17. 18. 19.

Litus insulae Kiu-shiu.

Utraque species Zizyphinis addenda est.

*Zizyphinus jucundus* Sow.

Proc. Zool. Soc. 1878. pag. 798. Tab. 48. fig. 6.

Mare Japonicum, sine indicatione certa loci natalis.

Species concinna *Trochum zizyphinum* Linnaei aliquo modo in mentem vocat. Exemplar l. c. descriptum quantum scio ad hoc tempus unicum est.

Genus *Pleurotomaria* Defrance.

*Pleurotomaria Beyrichii* Hilgendorf.

Sitzungsber. der Gesellsch. naturf. Freunde. Berlin 1877 pag. 72. E. v. Martens Conch. Mitth. vol. 1. pag. 33. Tab. 7.

Hanc speciem magnificam ad hoc tempus uncam clar. Hilgendorf in collectione quadam Molluscorum Japoniae invenit et nuper reportavit. Inter vivas haec quarta nunc innotuit species,

sed formis pervariis jam in stratis terrae antiquis ex gr. in calce carbonifera hoc genus repraesentatum est. *Pleurotomaria concava* Desh. (Description des Coquilles fossiles des environs de Paris vol. 2. pag. 246. Tab. 32. fig. 1. 2. 3.) sine dubio cum cochlea nostra cognata est, quae vero commutari non debet cum *Pl. concava* Münsteri specie valde aliena.

*Stomatellaceis* inserenda est.

Pag. 147.

***Haliotis gigantea* Chemn.**

Ad hanc speciem jam antea tractatam addendum est clar. de Schrenck etiam *Haliotin* aquatilem Reevei (Conch. icon. spec. 54) pro varietate habere, quod mihi quoque persuasum est.

Pag. 160.

***Actaeon giganteus* Dkr.**

Haec cochlea plane convenit cum *Actaeone* Dianae A. Adams (Proc. Zool. Soc. 1854. pag. 59. Reeve Conch. icon. Tornatella Tab. 4. fig. 19 a. b.) quod omisisse mihi dolet, sed descriptio et icones accuratae l. c. repetitae haud superfluae erunt.

Pag. 169.

***Umbrella*.**

Clar. P. P. Carpenter inter Mollusca nonnulla nova sinus Panamensis in Proc. Zool. Soc. 1856. pag. 161. *Umbellae* speciem nomine „*ovalis*“ descripsit, quae secundum exemplar primum collectionis Cumingianae in Conchyliologia iconica fig. 3 delineata est, sed discrimen gravius inter hanc testam et *Umbellam* Indicam excepta forma minore invenire non possum. Clar. auctor quidem urget, marginem non undulatum esse, sed hac ratione *Umbrella* Indica variare videtur. Nisi forte incertus sane mirus est huius testae locus natalis.

Inter *Umbrellacea* et *Heteropoda* Nudibranchiatorum genera *Doriprismatica* Orb. (*Goniodoris* Forbes) et *Coryphella* Gray omissa sunt:

***Doriprismatica festiva* A. Adams.**

Ann. and Mag. Nat. Hist. Aug. 1861. pag. 140.

*Tsu-shima*.

***Coryphella Alderi* A. Adams.**

l. c. pag. 140.

Jedo, in *Zosteris*.

Pag. 171.

**Genus *Gastrochaena* Spengler.**

***Gastrochaena mumia* Spengl.**

Nov. Act. Dan. vol. 2. pag. 174. fig. 1—7. *Chaena* Retz. Cfr. Lam. anim. sans vert. ed. 2. vol. 6. pag. 30. *Fistulana* clava.

Specimen diffractum adest.

Mare Japonicum, insulae Philippinae.

Pag. 176.

*Panopaea plicata* Mont.

Jeffer. Brit. Conch. vol. 3. pag. 75. Tab. 3. fig. 2.

Cfr. J. G. Jeffrey's Notice of some Shells dredged by Capt. St. John in Korea Strait in Linn. Soc. Journ. vol. 14. pag. 421. ubi synonyma allata sunt.

Pag. 183.

*Mactra* vel *Trigonella* *Bonneau* *Bernardi* (Journ. de Conch. 1858. pag. 92.) et *Trigonella* nostra straminea fortasse sunt testae *Mactrae* *Sachalinensis* nondum adultae, de qua quidem quaestione certe judicari poterit, si plura specimina adessent et examinarentur.

Pag. 185.

*Raëta rostralis* Desh.

Clar. A. Adams valvas singulas conchulae nomine *Raëtae pulchellae* Ad. et Rve. (*Poromyae pulchellae*) Voy. Samar. Moll. pag. 83. Tab. 23. fig. 1. misit, quae nullo modo a *Raëta* (*Mactra*) *rostrali* Desh. differunt. Cum vero hoc nomen posterius promulgatum sit, *Raëtae pulchellae* jus prioritatis tribuendum est.

Pag. 213.

Versu nono lege: talis structurae.

Pag. 220.

*Solenomya* nostra *Japonica* fortasse ad *Solemyam* pusillam Gould. (Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 8. pag. 27.) prope *Hakodate* repertam pertinet, quam comparare haud licuit.

Pag. 221.

*Mytilus coruscus* Gould. (Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. vol. 8. 1861. pag. 38.) prope *Hakodate* repertus, est species mihi dubia, fortasse ad *Mytilum* meum *Grayanum* pertinens.

Pag. 233.

*Scapharca inflata* Reeve.

Haec concha ambitu interdum variabilis est, cum pars valvarum postica plus minusve producta inveniatur, quod observationibus meis prioribus hic adjicio.

Pag. 238.

Pro *Huxleya* A. Adams (olim) nomen genericum *Cyrilla* A. Adams ponendum est. *Cyrilla sulcata* (*Huxleya*) A. Adams pag. 238 enumerata et *Cyrilla decussata* A. Adams (Ann. Mag. Nat. Hist. 1862. pag. 295.) ex *Japonia* tantum hucusque innotuerunt.

Pag. 247.

Ad *Plicatulam rugosam* notandum est *Lamarckium* jam antea speciem huius generis fossilem eodem nomine descripsisse, quod omiseram. Quamvis haec species fossilis magna, quae inter *Spondylos* et *Plicatulas* intermedia dicitur, admodum dubia sit, tamen designatio nostrae speciei mutanda est, quam nunc *Plicatulam irregularem* nominaverim.

**Agadina Gouldi A. Adams.**

„Testa vix umbilicata, helicoidea, subinflata, tenuis, pellucida; anfractibus  $3\frac{1}{2}$ , rapide accrescentibus; apertura obliqua, cucullata.“ — Diam.  $1\frac{1}{2}$  mill.

Proc. Zool. Soc. 1867. pag. 309. Tab. 19. fig. 22.

Kino-shima, in arena conchyliophora.

**Agadina Stimpsoni A. Adams.**

„Testa profunde umbilicata, planorbiformis depressa, tenuis, albida, anfractibus  $3\frac{1}{2}$  lente accrescentibus; apertura obliqua campanulata. Operculum tenuissimum corneum extus concavum multispirale.“ — Diam. 1 mill.

Proceedings L. c. fig. 23.

Obvenit una cum specie antecedente; differt testa depressiore planorbiformi, umbilico profundiore et latiore.

Hae cochleolae minimae quemnam locum tenere debeant in systemate incertum est.

**Genus Putilla A. Adams.**

**Putilla lucida A. Adams.**

Proc. Zool. Soc. 1867. pag. 312. Tab. 19. fig. 25.

Insula Goto.

Cochleola solida, subpellucida, turbinato-conoidea, rimata, peristomate incrassato, suborbiculi instructa, circiter 3 mill. alta.

Huius cochleolae locus systematicus pariter incertus est.

---

Pag. 3.

*Murex Coreanicus* A. Adams, in litore Coreano obvius et in Proc. Zool. Soc. anno 1853. pag. 72 descriptus, sed mihi incognitus *Muricibus* addenda est.

Pag. 65.

*Cassis* (*Semicassis*) *saburon*, le *Saburon* Adansonii (Hist. du Sénégal Tab. 7. fig. 8.) clar. de Siebold affirmante pariter in mari Japonico obvenire dicitur. Fortasse cochlea huc pertinet, quam pro varietate ponderosa *Cassidis Japonicae* commemoravi.

Pag. 70.

***Terebra stylata* Hinds.**

Thes. Conch. vol. 1. pag. 161. Tab. 44. fig. 79.

quae maris Japonici incola esse dicitur, *Terebrarum* speciebus addenda est.

Pag. 96.

Pro *Strombo corrugato* Ad. et Rve. nomen antiquius *Strombus rugosus* Sow. (Tank. Cat. App. pag. 20.) ponendum est.



Pag. 121.

*Turritella cerea* Reeve.

Conch. icon. Tab. 6. fig. 25. Lischke Jap. M. Conch. vol. 1. pag. 72.

Nagasaki.

*Eglisia Cumingii* A. Adams.

Proc. Zool. Soc. 1850. pag. 204.

pro cochlea Japonica declarata, antea omissa est. Eglisiae Turritellis adjungendae sunt.

Pag. 205.

*Cyclinae splendida* et *bombycina* Röm. ab auctore in Proc. Zool. Soc. anno 1860. pag. 124. pro conchis Japonicis descriptae, sed antea omissae, mihi incognitae sunt. Exstant in Museo Britannico (collectione Molluscorum Cumingiana).

Pag. 239.

*Pectinibus Japonicis Pecten mollitus* Reeve (Conch. icon. spec. 100.) addendus est.

---

Errata nonnulla typographica leviora excusare velis, lector benevole.

---



## Index specierum in literas digestus.

Nomina literis latius dispositis species omnes Japonicas inscriptas indicant, omnia Molluscorum nomina reliqua hoc libro commemorata literis angustis insignita sunt.

*Acanthochiton achates* Gould. 160.  
*Acanthochiton hirudiniformis* Sow.  
160.  
*Acanthochiton rubro-lineatus*  
Lischke 160.  
*Acanthochiton scutiger* Ad. et Rve.  
159.  
*Acanthochiton Selandicus* Q. et G. 159.  
*Aclis cingulata* A. Ad. 86.  
*Aclis crystallina* A. Ad. 86.  
*Aclis fulgida* A. Ad. 86.  
*Aclis labiata* A. Ad. 86.  
*Aclis lirata* A. Ad. 86.  
*Aclis Loveniana* A. Ad. 86.  
*Aclis sulcata* A. Ad. 86.  
*Acmaea concinna* Lischke 154.  
*Acmaea digitalis* Eschsch. 154.  
*Acmaea dorsuosa* Gould. 154.  
*Acmaea patina* Eschsch. 154.  
*Acmaea Schrenckii* Lischke 155.  
*Acmaea scutum* Eschsch. 154.  
*Actaeon Dianae* A. Ad. pag. 160. 260.  
*Actaeon giganteus* Dkr. pag. 160. 260.  
Dunker, Moll. Jap. mar.

*Adeorbis carinatus* A. Ad. 133.  
*Adeorbis clausus* A. Ad. 133.  
*Adeorbis corniculum* A. Ad. 133.  
*Adeorbis depressus* A. Ad. 133.  
*Adeorbis diaphanus* A. Ad. 134.  
*Adeorbis Japonicus* A. Ad. 133.  
*Adeorbis nanulus* A. Ad. 134.  
*Adeorbis orbellus* A. Ad. 133.  
*Adeorbis patruelis* A. Ad. 134.  
*Adeorbis planus* A. Ad. 133.  
*Adeorbis prominulus* A. Ad. 133.  
*Adeorbis subangulatus* A. Ad. 134.  
*Adeorbis suturalis* A. Ad. 133.  
*Adeorbis trochulus* A. Ad. 133.  
*Admete arctica* Midd. 104.  
*Admete borealis* A. Ad. 104.  
*Admete crispa* Möll. 104.  
*Admete Japonica* Smith. 104.  
*Admete viridula* O. Fabr. 104.  
*Adula Californiensis* Eschsch. 227.  
*Agadina Gouldi* A. Ad. 262.  
*Agadina Stimpsoni* A. Ad. 262.  
*Agatha virgo* A. Ad. 161.

- Alaba cornea* A. Ad. 115.  
*Alaba felina* A. Ad. 116.  
*Alaba imbricata* A. Ad. 116.  
*Alaba inflata* A. Ad. 116.  
*Alaba leucosticta* A. Ad. 115.  
*Alaba lucida* A. Ad. 116.  
*Alaba picta* A. Ad. 115.  
*Alaba subangulata* A. Ad. 116.  
*Alaba zebrina* A. Ad. 115.  
*Alata Gallinula gibba* Mart. 96.  
*Alcyna lepida* A. Ad. 142.  
*Alcyna ocellata* A. Ad. 142.  
*Alectryon Glans* H. et A. Ad. 35.  
*Alicula secalina* A. Ad. 167.  
*Alicula translucens* A. Ad. 167.  
*Alicula volvulina* A. Ad. 167.  
*Alvania caelata* A. Ad. 119.  
*Alvania circinata* A. Ad. 119.  
*Alvania clathratula* A. Ad. 118.  
*Alvania concinna* A. Ad. 119.  
*Alvania ferruginea* A. Ad. 119.  
*Alvania Mariella* A. Ad. 119.  
*Alvania semicostata* A. Ad. 118.  
*Alvania tiarula* A. Ad. 118.  
*Amaea magnifica* Sow. 69.  
*Amaea Sowerbyi* Dkr. 69.  
*Amathina angustata* Sowerby 125.  
*Amathina nobilis* A. Ad. 125.  
*Amathina tricostata* Chemn. 125.  
*Amaurella glabrata* A. Ad. 64.  
*Amaurella Japonica* A. Ad. 64.  
*Amaurella semistriata* A. Ad. 64.  
*Amicula amiculata* Pallas. 159.  
*Amicula Emersoni* Couth. 159.  
*Amicula Pallasii* Midd. 159.  
*Amicula vestita* Sow. 159.  
*Amphidesma Sinense* Reeve 194.  
*Amphidesma Zebuense* Hanl. 194.  
*Amphiperas formosum* Sow. 101.  
*Amphiperas hordaceum* Lam. 102.  
*Amphiperas Ovum* Lin. 101.  
*Amphiperas rhodium* A. Ad. 101.  
*Amphiperas triticeum* Lam. 101.  
*Amussium Japonicum* Gmel. 243.  
*Amussium Japonicum maximum* Chemn. 243.  
*Amussium obliteratum* Lin. 243.  
*Amussium Pleuronectes* Lin. 243.  
*Amycla achatina* Sow. 56.  
*Amycla Burchardi* Dkr. 55.  
*Amycla fasciolata* Lam. 56.  
*Amycla gausapata* Gould. 56.  
*Amycla varians* Dkr. 55.  
*Anachis misera* H. et A. Ad. 54.  
*Anaitis foliacea* Roem. 198.  
*Anatina flexuosa* Reeve 179.  
*Anatina Japonica* Lischke 179.  
*Anatomus concinnus* A. Ad. 147.  
*Anatomus Japonicus* A. Ad. 147.  
*Anatomus lamellatus* A. Ad. 147.  
*Anatomus stramineus* A. Ad. 147.  
*Anatomus turbinatus* A. Ad. 147.  
*Ancillaria albo-callosa* Lischke 47.  
*Ancillaria inornata* Smith. 48.  
*Ancillaria Montrouzieri* Souv. 47.  
*Ancillaria mucronata* Sow. 48.  
*Ancillaria rubiginosa* Swains. 47. 48.  
*Anomalocardia granosa* Lin. 233.  
*Anomalocardia pulchella* Dkr. 233.  
*Anomia caput serpentis* Lin. 251.  
*Anomia cytaeum* Gray. 248.  
*Anomia electrica* Lin. 247.  
*Anomia ephippium* Lin. 247.  
*Anomia laqueata* Rve. 248.  
*Anomia macroschisma* Desh. 248.  
*Anomia picta* Chemn. 252.  
*Anomia placenta* Lin. 248.  
*Anomia psittacea* Gmel. 253.  
*Anomia pustulosa* A. Ad. 248.  
*Anomia radulina* A. Ad. 248.  
*Anomia rostrum psittaci* Lam. 253.  
*Anomia sanguinea* Chemn. 253.  
*Anomia sanguinolenta* Gmel. 253.  
*Antigona lamellaris* Schum. 196.  
*Apicalia gibba* A. Ad. 87.

- Aplysia marginata* A. Ad. 168.  
*Aplysia marmorea* A. Ad. 168.  
*Arca ambigua* Rve. 234.  
*Arca Broughtonii* Schrenck 233.  
*Arca decurvata* Lischke 232.  
*Arca decussata* Lin. 232.  
*Arca Domingensis* Lam. 233.  
*Arca granosa* Lin. 233.  
*Arca Japonica* Rve. 234.  
*Arca inflata* Brocchi 233.  
*Arca Kraussii* Phil. 232.  
*Arca navicularis* Brug. 232.  
*Arca Noae* var. Chemn. 232.  
*Arca obliquata* Rve. 232.  
*Arca obtusa* Rve. 232.  
*Arca pella* Lin. 238.  
*Arca subcrenata* Lischke 234.  
*Arca tenebrica* Rve. 232.  
*Arca tetragona* Poli 232.  
*Arcularia Thersites* H. et A. Ad. 35.  
*Arene armata* A. Ad. 131.  
*Argobuccinum olivator* A. Ad. 31.  
*Argonauta Argo* Lin. 1.  
*Argonauta gondola* Dillw. 1.  
*Argonauta Owenii* Ad. et Rve. 1.  
*Artemis angulosa* Phil. 204.  
*Artemis bilunulata* Gray. 203.  
*Artemis biscocta* Rve. 203.  
*Artemis Chinensis* Rve. 205.  
*Artemis Gruneri* Phil. 203.  
*Artemis Japonica* Rve. 203.  
*Artemis laminata* Rve. 203.  
*Artemis lirata* Sow. 204.  
*Artemis orientalis* Sow. 205.  
*Artemis penicillata* Rve. 204.  
*Artemis scabra* Phil. 204.  
*Artemis sericea* Rve. 204.  
*Artemis Sieboldii* Rve. 203.  
*Artemis subquadrata* Hanl. 204.  
*Aspergillum vaginiferum* Lam. 172.  
*Astridium triumphans* Phil. 129.  
*Atilia niveomarginata* Smith. 55.  
*Atys naucum* Lin. 166.  
*Atys scrobiculata* A. Ad. 166.  
*Aulus costatus* Say. 174.  
*Aulus minimus* Gmel. 175.  
*Aulus pulchellus* Dkr. 174.  
*Aulus sodalis* Gould. 175.  
*Auriculina Grayi* A. Ad. 85.  
*Auriculina ovalis* A. Ad. 85.  
*Avena marina* Chemn. 97.  
*Avicula brevialata* Dkr. 229.  
*Avicula coturnix* Dkr. 228.  
*Avicula fucata* Gould. 229.  
*Avicula Japonica* Dkr. 230.  
*Avicula Lovéni* Dkr. 229.  
*Avicula Martensii* Dkr. 229.  
*Axinus flexuosus* Mont. 218.  
*Azara Amurensis* Schrenck 177.  
*Azara labiata* Maton 177.  
*Barbatia decurvata* Lischke 232.  
*Barbatia decussata* Sow. 232.  
*Barbatia Domingensis* Lam. 232.  
*Barbatia tenebrica* Rve. 232.  
*Barnea fragilis* Sow. 170.  
*Bezoardica vulgaris* Schum. 65.  
*Biplex perca* Perry 32.  
*Bittium pusillum* Dkr. 108.  
*Bittium scalatum* Dkr. 108.  
*Bolma modesta* Rve. 130.  
*Brochina glabella* Carp. 122.  
*Brochina glabriformis* Carp. 122.  
*Buccinulus fraterculus* Dkr. 161.  
*Buccinulus solidulus* Lin. 162.  
*Buccinulus strigosus* Gould. 162.  
*Buccinum angulosum* Gray. 33.  
*Buccinum arcularia papillosa* Chemn. 35.  
*Buccinum australe* Chemn. 57.  
*Buccinum balteatum* Rve. 18.  
*Buccinum bezoar* Lin. var. 42.  
*Buccinum bulbosum* Sol. 42.  
*Buccinum cassidariaeforme* Rve. 16.  
*Buccinum Chinense* Dillw. 57.  
*Buccinum clathratum* Enc. meth. 35.

- Buccinum contractum* Rve. 18.  
*Buccinum corniculum* Olivi. 56.  
*Buccinum cornutum* Lin. 64.  
*Buccinum Cumingianum* Dkr. 18.  
*Buccinum Dunkeri* Küst. 19.  
*Buccinum Erinaceus* Lin. 65.  
*Buccinum fasciatum* Mart. 57.  
*Buccinum fasciolatum* Lam. 56.  
*Buccinum ferreum* Rve. 19. 20. 255.  
*Buccinum filosum* Gmel. 40.  
*Buccinum flavum* Brug. 55.  
*Buccinum gemmulatum* Lam. 35.  
*Buccinum glaciale* Lin. 33.  
*Buccinum Glans* Lin. 35.  
*Buccinum glaucum* Lin. 65.  
*Buccinum hinnulus* Ad. et Rve. 16.  
*Buccinum imperiale* Rve. 18.  
*Buccinum Japonicum* A. Ad. 32.  
*Buccinum Labradorense* Rve. 32.  
*Buccinum Lapillus* Lin. 40.  
*Buccinum leucostoma* Lischke 32.  
*Buccinum ligneum* Rve. 18.  
*Buccinum livescens* Phil. 35.  
*Buccinum luteostoma* Chemn. 39.  
*Buccinum maculatum* Lin. 70.  
*Buccinum marmoratum* Rve. 19.  
*Buccinum marginulatum* Lam. 36.  
*Buccinum modificatum* Rve. 17.  
*Buccinum muricatum* Q. et G. 37.  
*Buccinum Ochotense* Midd. 33.  
*Buccinum pennatum* Gmel. 64.  
*Buccinum perdix* Lin. 58.  
*Buccinum pericochlion* Schrenck 15.  
*Buccinum plicosum* Dkr. 10.  
*Buccinum plicosum* Menke 10.  
*Buccinum pomum* Lin. 58.  
*Buccinum Proteus* Rve. 18.  
*Buccinum pyramidale* Rve. 32.  
*Buccinum pyramidale* Gmel. 115.  
*Buccinum rubiginosum* Rve. 19.  
*Buccinum Rudolphi* Chemn. 39.  
*Buccinum rufum* Lin. 64.  
*Buccinum Schantaricum* Schrenck 32.  
*Buccinum scriptum* Lin. 55.  
*Buccinum sertum* Brug. 40.  
*Buccinum signum* Rve. 15.  
*Buccinum solutum* Dillw. 32.  
*Buccinum spadiceum* Rve. 16.  
*Buccinum striatum* Penn. 32.  
*Buccinum strigatum* Gmel. 65.  
*Buccinum strigilatum* Lin. 71.  
*Buccinum subulatum* Lin. 71.  
*Buccinum Thersites* Brug. 35.  
*Buccinum Tritonis* Rumph. 27.  
*Buccinum trochulus* Rve. 16.  
*Buccinum undatum* Lin. 32.  
*Buccinum vibex* Lin. 65.  
*Buccinum vulgare* Da Costa 32.  
*Bulbus incurvus* Dkr. 45.  
*Bulbus Rapa* Lin. 45.  
*Bulla albo-cincta* v. d. Hoeven 162.  
*Bulla ampulla* Lin. 165.  
*Bulla Cécillei* Phil. 164.  
*Bulla Coreanica* A. Ad. 168.  
*Bulla cymbalum* Q. et G. 166.  
*Bulla elegans* Mke. 163.  
*Bulla lineata* Wood. 163.  
*Bulla naucum* Lin. 166.  
*Bulla nitidula* Sol. 163.  
*Bulla Ovum* Lin. 101.  
*Bulla physis* Lin. 162.  
*Bulla scabra* Chemn. 163.  
*Bulla semisulcata* Phil. 165.  
*Bulla solidula* Lin. 162.  
*Bulla terebellum* Lin. 97.  
*Bulla undata* Brug. 163.  
*Bulla virgata* Martyn 162.  
*Bulla volva* Lin. 102.  
*Bullia ampullacea* Midd. 33.  
*Bullia Linnaeana* A. Ad. 33.  
*Bullia Perryi* Jay. 33.  
*Bullina lineata* Wood. 163.  
*Bullina scabra* Chemn. 163.  
*Bursa lamellosa* Dkr. 32.

*Byssosarca decussata* Sow. 232.  
*Caecella Chinensis* Desh. 186.  
*Caecella turgida* H. et A. Ad. 186.  
*Caecum Clarkii* Carp. 122.  
*Caecum dextrorsum* Carp. 122.  
*Caecum glabellum* Carp. 122.  
*Caecum glabriforme* Carp. 122.  
*Caecum gracile* Carp. 122.  
*Caecum?* *mamillatum* Carp. 122.  
*Caecum vitreum* Carp. 122.  
*Caesia Japonica* A. Ad. 36.  
*Calcar haematragus* Menke 129.  
*Calceolina pusilla* C. B. Ad. 136.  
*Calliostoma affine* Dall. 140.  
*Callista Chinensis* Chemn. 200.  
*Callista festiva* Sow. 200.  
*Callista indecora* Phil. 201.  
*Callista inflata* Sow. 201.  
*Callista limatula* Sow. jun. 200.  
*Callista pannosa* Sow. 201.  
*Callista rudis* Poli 201.  
*Callista squalida* Sow. 201.  
*Callochiton fuliginatus* Ad. et Rve. 157.  
*Calyptraea plana* Ad. et Rve. 124.  
*Canarium fosclosum* Mart. 95.  
*Cancellaria arctica* Midd. 104.  
*Cancellaria asperella* Lam. 103.  
*Cancellaria Bocageana* Crosse et Deb. 103.  
*Cancellaria elegans* Sow. 104.  
*Cancellaria Fischeri* A. Ad. 104.  
*Cancellaria imperialis* Mich. 103.  
*Cancellaria Japonica* Smith. 104.  
*Cancellaria macrospira* Ad. et Rve. 104.  
*Cancellaria nodulifera* Sow. 103.  
*Cancellaria Reeveana* Crosse 104.  
*Cancellaria semipellucida* Ad. et Rve. 103.  
*Cancellaria Spengleriana* Desh. 103.  
*Cancellaria Tritonis* Sow. 103.

*Cancellaria viridula* Sow. 104.  
*Cancilla Antoniae* H. Ad. 51.  
*Cantharus Menkeanus* Dkr. 18.  
*Capsa adunca* Gould 194.  
*Capulus badius* Dkr. 124.  
*Capulus depressus* A. Ad. 124.  
*Capulus dilatatus* A. Ad. pag. 124. 258.  
*Capulus Japonicus* A. Ad. 124.  
*Capulus pilosus* Dkr. 125.  
*Cardilia inermis* Desh. 214.  
*Cardilia Martini* Desh. 214.  
*Cardilia Michelini* Desh. 214.  
*Cardilia Micheloti* Desh. 214.  
*Cardilia semisulcata* Lam. 213.  
*Cardinalia virgata* Gmel. 138.  
*Cardiomya Gouldiana* Hinds. 180.  
*Cardita borealis* Conr. 220.  
*Cardita Cumingiana* Dkr. 221.  
*Cardita dactylus* Brug. 209.  
*Cardita Leana* Dkr. 221.  
*Cardita lithophagella* Lam. 209.  
*Cardita pica* Rve. 221.  
*Cardium aeolicum* Born. 212.  
*Cardium apertum* Chemn. 212.  
*Cardium arenicola* Rve. 211.  
*Cardium aurantiacum* A. Ad. et Rve. 212.  
*Cardium auricula* Forsk. 212.  
*Cardium Bechei* Ad. et Rve. 212.  
*Cardium Burchardi* Dkr. 210.  
*Cardium Californense* Desh. 211.  
*Cardium corbis* Martyn 211.  
*Cardium exasperatum* Sow. 211.  
*Cardium Groenlandicum* Chemn. 212.  
*Cardium Helveticum* Mayer 212.  
*Cardium Japonicum* Dkr. 211.  
*Cardium Kalamantanum* A. Ad. et Rve. 212.  
*Cardium liratum* Sow. 212.  
*Cardium maculosum* Sow. 211.  
*Cardium modestum* A. Ad. et Rve. 211.  
*Cardium muticum* Rve. 211.  
*Cardium Nuttallii* Conr. 211.  
*Cardium papyraceum* Schrenck 211.

- Cardium pectinatum* Lin. 212.  
*Cardium retusum* Lin. 212.  
*Cardium rubrum* Mont. 218.  
*Cardium rugatum* Gron. 212.  
*Cassidea areola* Brug. 65.  
*Cassis coronulata* Sow. 65.  
*Cassis cornuta* Lin. 64.  
*Cassis glauca* juv. Kien. 65.  
*Cassis glauca* Brug. 65.  
*Cassis Japonica* Rve. 64.  
*Cassis labiata* Chemn. 64.  
*Cassis labrosa* Lam. 58.  
*Cassis pennata* Rumph. 64.  
*Cassis pila* Rve. 64.  
*Cassis pirum* Lam. 65.  
*Cassis rubra* Rumph. 64.  
*Cassis rufa* Lin. 64.  
*Cassis saburon* Adams 64. 65. 262.  
*Cassis strigata* Gmel. 65.  
*Cassis vibex* Lin. 65.  
*Cassis zebra* Lam. 65.  
*Cassis Zeylonica* Lam. 65.  
*Catharina submarmorea* Midd. 159.  
*Cavolina gibbosa* Rang. 2.  
*Cavolina limbata* Orb. 2.  
*Cemoria nobilis* A. Ad. 150.  
*Cerithiopsis baculum* A. Ad. 91.  
*Cerithiopsis cerina* A. Ad. 91.  
*Cerithiopsis cingulata* A. Ad. 91.  
*Cerithiopsis clavula* A. Ad. 91.  
*Cerithiopsis dextroversa* Ad. et Rve. 91.  
*Cerithiopsis pagodula* A. Ad. 91.  
*Cerithiopsis paxillus* A. Ad. 91.  
*Cerithiopsis rosea* A. Ad. 91.  
*Cerithiopsis subreticulata* Dkr. 91.  
*Cerithium attenuatum* Phil. 107.  
*Cerithium columna* Sow. 106.  
*Cerithium dialucum* Phil. 106.  
*Cerithium echinatum* Kien. 106.  
*Cerithium echinatum* Lam. 106.  
*Cerithium fasciatum* Brug. 107.  
*Cerithium fluviatile* Pot. et Mich. 110.  
*Cerithium granosum* Kien. 107.  
*Cerithium Guinaicum* Phil. pag. 106. 257.  
*Cerithium humile* Dkr. 106.  
*Cerithium Kobelti* Dkr. 106.  
*Cerithium Kochii* Phil. 108.  
*Cerithium longicaudatum* Ad. et Rve. 107.  
*Cerithium Martinianum* Pfr. 107.  
*Cerithium microptera* Kien. 110.  
*Cerithium mutatum* Sow. 106.  
*Cerithium obeliscus* Brug. 107.  
*Cerithium procerum* Kien. 107.  
*Cerithium pusillum* Dkr. 108.  
*Cerithium subreticulatum* Dkr. 91.  
*Cerithium turritum* Sow. pag. 108. 257.  
*Cerithium violaceum* Q. et G. 109.  
*Cerithium zonale* Brug. 109.  
*Chaena grandis* Desh. 171.  
*Chaetopleura Japonica* Lischke 158.  
*Chama ambigua* Lischke 214.  
*Chama aspersa* Rve. 215.  
*Chama coralliphaga* Chemn. 209.  
*Chama coralliphaga* Dillw. 209.  
*Chama Dunkeri* Lischke 215.  
*Chama imbricata* Brod. 214.  
*Chama Japonica* Lam. 215.  
*Chama literata* rotunda Chemn. 201.  
*Chama Moltkiana* Chemn. 213.  
*Chama oblonga* var. Chemn. 210.  
*Chama pacifica* Brod. 15.  
*Chama retroversa* Lischke 215.  
*Chama semipurpurata* Lischke 214.  
*Chamelea striata* Chemn. 197.  
*Chione astardoides* Beck. 198.  
*Chione calophylla* Phil. 198.  
*Chione cardioides* Lam. 198.  
*Chione crenifera* Sow. 197.  
*Chione foliacea* Phil. 198.  
*Chione histrionica* Brod. et Sow. 198.  
*Chione intersecta* Sow. 197.  
*Chione isabellina* Phil. 198.  
*Chione marica* Lin. 197.



- Chione quadrangularis* Ad. et Rve. 198.  
*Chione striata* Chemn. 197.  
*Chiton achates* Gould 160.  
*Chiton Albrechti* Schrenck 157.  
*Chiton amiculatus* Pallas 159.  
*Chiton Brandtii* Midd. 158.  
*Chiton concinnus* Gould 158.  
*Chiton Coreanicus* Ad. et Rve. 157.  
*Chiton Eschscholtzii* Midd. 158.  
*Chiton fuliginatus* Ad. et Rve. 157.  
*Chiton giganteus* Tilesius 160.  
*Chiton hirudiniformis* Sow. 160.  
*Chiton Japonicus* Lischke 158.  
*Chiton Lindholmii* Schrenck 157.  
*Chiton lividus* Midd. 158.  
*Chiton Merckii* Midd. 158.  
*Chiton Mertensii* Midd. 158.  
*Chiton Middendorffii* Schrenck 157.  
*Chiton muricatus* Tilesius 160.  
*Chiton Pallasii* Midd. 159.  
*Chiton rubro-lineatus* Lischke 160.  
*Chiton scrobiculatus* Midd. 157.  
*Chiton scutiger* Ad. et Rve. 159.  
*Chiton Seelandicus* Q. et G. 159.  
*Chiton setosus* Tilesius 160.  
*Chiton Sitchensis* Midd. 158.  
*Chiton Sitkensis* Rve. 159.  
*Chiton spiniger* Sow. 158.  
*Chiton Stimpsoni* Gould 158.  
*Chiton submarmoreus* Midd. 159.  
*Chiton vestitus* Sow. 159.  
*Chlorostoma achates* Gould. 144.  
*Chlorostoma argyrostoma* Gmel. 143.  
*Chlorostoma brunneum* Phil. 143.  
*Chlorostoma Carpenteri* Dkr. 143.  
*Chlorostoma nigerrimum* Gmel. 143.  
*Chlorostoma nigricolor* Dkr. 143.  
*Chlorostoma Pfeifferi* Phil. 144.  
*Chlorostoma rugatum* Gould 143.  
*Chlorostoma rusticum* Gmel. 143.  
*Chrysallida alveata* A. Ad. 81.  
*Chrysallida Brenda* A. Ad. 80.  
*Chrysallida concinna* A. Ad. 80.  
*Chrysallida consimilis* A. Ad. 80.  
*Chrysallida consobrina* A. Ad. 80.  
*Chrysallida elegantula* A. Ad. 80.  
*Chrysallida metula* A. Ad. 80.  
*Chrysallida Minna* A. Ad. 80.  
*Chrysallida nana* A. Ad. 81.  
*Chrysallida plicata* A. Ad. 80.  
*Chrysallida pulchella* A. Ad. 80.  
*Chrysallida pupula* A. Ad. 80.  
*Chrysallida pura* A. Ad. 81.  
*Chrysallida pusio* A. Ad. 81.  
*Chrysallida pygmaea* A. Ad. 80.  
*Chrysallida semiplicata* A. Ad. 80.  
*Chrysallida terebra* A. Ad. 81.  
*Cingulina circinata* A. Ad. 87.  
*Circe aequivoca* Chemn. 202.  
*Circe dispar* Chemn. 202.  
*Circe divaricata* Chemn. 202.  
*Circe gibbia* Lam. 202.  
*Circe scripta* Lin. 201.  
*Circe scripta* Lam. 202.  
*Circe numulina* Lam. 202.  
*Circe undatina* Lam. 202.  
*Circomphalus foliaceus* Phil. 198.  
*Circomphalus isabellinus* Phil. 198.  
*Cirsotrema bicarinatum* Sow. 69.  
*Cirsotrema crassilabrum* Sow. 69.  
*Cirsotrema cribrarium* A. Ad. 69.  
*Cirsotrema sulcatum* Sow. 69.  
*Cirsotrema suturale* Hinds. 69.  
*Cirsotrema Turbonilla* A. Ad. 69.  
*Cirsotrema undulatum* Sow. 69.  
*Cithna globosa* A. Ad. 115.  
*Cithna spirata* A. Ad. 115.  
*Citharopsis cancellata* A. Ad. 21. 255.  
*Clanculus margaritarius* Phil. 139.  
*Clanculus Smithii* Wood. 139.  
*Clathurella crassilabrum* Rve. 25.  
*Clathurella Leuckarti* Dkr. 25.  
*Clathurella octangulata* Dkr. 24.  
*Clathrus Elenensis* Sow. 68.

- Clathrus hexagonus* Sow. 68.  
*Clausina suborbicularis* A. Ad. 217.  
*Clausina subquadrata* A. Ad. 217.  
*Clavagella ramosa* Dkr. 172.  
*Clavatula lactea* Schrenck 26.  
*Clavatula striata* Schrenck 23.  
*Clavatula virginea* Val. 25.  
*Clavus viduus* H. et A. Ad. 22.  
*Clementia Moretonensis* Desh. 205.  
*Clementia papyracea* Gray 205.  
*Clementia similis* Sow. 205.  
*Cleodora lanceolata* Les. 2.  
*Cleodora pyramidata* Pér. et Les. 2.  
*Clithon adspersa* Recl. 126.  
*Cochlea pennata* Rumph. 58.  
*Colina macrostoma* Hinds. 108.  
*Colina pupaeformis* A. Ad. 108.  
*Collonia purpurascens* Dkr. 129.  
*Collonia rubra* Dkr. 128.  
*Collonia sanguinea* Lin. 128.  
*Columbella bidentata* Mke. 54.  
*Columbella exilis* Phil. 54.  
*Columbella flavida* Lam. 55.  
*Columbella fuscata* Sow. 54.  
*Columbella haemastoma* Sow. 53.  
*Columbella Lischkei* Smith. 55.  
*Columbella Martensii* Lischke 54.  
*Columbella meleagris* Ducl. 54.  
*Columbella mendicaria* Lam. 56.  
*Columbella misera* Sow. 54.  
*Columbella niveomarginata* Smith. 55.  
*Columbella pumila* Dkr. 54.  
*Columbella sagena* Rve. 54.  
*Columbella scripta* Lam. 54.  
*Columbella semipunctata* Lam. 55.  
*Columbella solidula* Rve. 54.  
*Columbella subvitrea* Smith 55.  
*Columbella variegata* Mke. 54.  
*Columbella versicolor* Sow. 54.  
*Conradia carinifera* A. Ad. 114.  
*Conradia cingulifera* A. Ad. 114.  
*Conradia clathrata* A. Ad. 114. 158.  
*Conradia doliaris* A. Ad. 114.  
*Conradia pulchella* A. Ad. 114.  
*Conradia tornata* A. Ad. 114.  
*Constantia elegans* A. Ad. 70.  
*Constantia Tantilla* A. Ad. 70.  
*Conus ebraeus* Lin. 92.  
*Conus fulgetrum* Sow. 92.  
*Conus fulmen* Rve. 94.  
*Conus geographus* var. Brod. 94.  
*Conus intermedius* Rve. 94.  
*Conus Japonicus* Brug. 92. 257.  
*Conus Largillierti* Kien. 257.  
*Conus Lischkeanus* Weink. 93.  
*Conus marmoreus* Lin. 92.  
*Conus miles* Lin. 93.  
*Conus miliaris* Rve. var. 92.  
*Conus Orbigny* Audouin. 93.  
*Conus pauperculus* Sow. 94.  
*Conus planicostatus* Sow. 93.  
*Conus pulicarius* Hwass. 92.  
*Conus scaber* Kien. 92.  
*Conus Sieboldii* Rve. 93.  
*Conus tessellatus* Born. 93.  
*Conus textile* Lin. 94.  
*Coralliophaga carditoides* Blainv. 209.  
*Coralliophaga lithophagella* Lam. 209.  
*Coralliophila costularis* Blainv. 44.  
*Coralliophila Jeffreysii* Smith. 44.  
*Coralliophila monodonta* Q. et G. 44.  
*Corbula Amurensis* Schrenck 177.  
*Corbula bifrons* A. Ad. 177.  
*Corbula cuneata* Hinds. 177.  
*Corbula erythron* Lam. 176.  
*Corbula pallida* Hinds 177.  
*Corbula venusta* Gould 177.  
*Cornuta millepeda* Rumph. 96.  
*Coryphella Alderi* A. Ad. 260.  
*Costellaria Collinsoni* A. Ad. 52.  
*Costellaria fusco-apicata* Smith. 52.  
*Costellaria Gotoënsis* Smith 52.  
*Costellaria pyramidella* A. Ad. 52.  
*Costellaria subtruncata* Sow. 52.

*Costellaria Suluensis* Smith. 52.  
*Couthouya decussata* A. Ad. 114.  
*Couthouya plicifera* A. Ad. 114.  
*Couthouya reticulata* A. Ad. 114.  
*Couthouya striatula* A. Ad. 114.  
*Crania Japonica* A. Ad. 254.  
*Cranopsis pelex* A. Ad. 151.  
*Cranopsis pileolus* A. Ad. 151.  
*Crassatella compressa* Ad. et Rve. 220.  
*Crassatella donacina* Lam. 220.  
*Crassatella Japonica* Dkr. 220.  
*Crassispira striata* Kien. 23.  
*Crenella casta* A. Ad. 225.  
*Crenella cornea* A. Ad. 225.  
*Crenella crocea* A. Ad. 225.  
*Crenella decorata* A. Ad. 225.  
*Crenella decussata* Mont. 225.  
*Crenella sculptilis* A. Ad. 225.  
*Crenella spectabilis* A. Ad. 225.  
*Crepidula aculeata* Gmel. 124.  
*Crepidula grandis* Midd. 123.  
*Crepidula lamellosa* A. Ad. 124.  
*Crepidula Walchi* Herrm. 124.  
*Crossea bellula* A. Ad. 70.  
*Crossea miranda* A. Ad. 70.  
*Crypta lamellosa* A. Ad. 124.  
*Cryptochiton Stelleri* Midd. 159.  
*Cryptodon flexuosus* Mont. 218.  
*Cryptodon Japonicus* A. Ad. 217.  
*Cryptodon Manchuricus* A. Ad. 217.  
*Cryptodon oblongus* A. Ad. 217.  
*Cryptodon plicatus* A. Ad. 217.  
*Cryptodon suborbicularis* A. Ad. 217.  
*Cryptodon subquadratus* A. Ad. 217.  
*Cryptodon sulcatus* A. Ad. 217.  
*Cryptogramma Roemeri* Dkr. 197.  
*Cryptogramma squamosa* Lin. 197.  
*Cryptomya decurtata* A. Ad. 178.  
*Cryptomya elliptica* A. Ad. 178.  
*Cryptomya Mindoroënsis* Ad. et Rve. 178.  
*Cryptospira sexplicata* Dkr. 57.  
 Dunker, Moll. Jap. mar.

*Cucullaea auriculifera* Lam. 235.  
*Cucullaea concamerata* Mart. 235.  
*Cucullaea granulosa* Jon. 235.  
*Cultellus attenuatus* Dkr. 173.  
*Cultellus lividus* Dkr. 174.  
*Cultellus marmoratus* Dkr. 174.  
*Cultellus Philippianus* Dkr. 174.  
*Cuneus excavatus* Desh. 201.  
*Cuneus Philippinarum* A. Ad. 207.  
*Cuneus variegatus* Hanl. 207.  
*Cuvieria columella* Orb. 2.  
*Cyclina bombycina* Roem. 205. 263.  
*Cyclina Chinensis* Chemn. 205.  
*Cyclina flavida* Desh. 205.  
*Cyclina intumescens* Roem. 205.  
*Cyclina orientalis* Sow. 205.  
*Cyclina pectunculus* Roem. 205.  
*Cyclina splendida* Roem. 205. 263.  
*Cyclostrema ammonoceras* A. Ad. 131.  
 258.  
*Cyclostrema anaglyptum* A. Ad. 132.  
*Cyclostrema biporcatum* A. Ad. 132.  
*Cyclostrema cingulatum* Dkr. 132.  
*Cyclostrema cinguliferum* A. Ad. 131.  
*Cyclostrema granulatatum* A. Ad. 131.  
*Cyclostrema micans* A. Ad. 131.  
*Cyclostrema planum* A. Ad. 132.  
*Cyclostrema pulchellum* Dkr. 131.  
*Cyclostrema sulcatum* A. Ad. 131.  
*Cyclostrema tornatum* A. Ad. 132.  
*Cyllene fuscata* A. Ad. 38.  
*Cyllene gibba* A. Ad. 38.  
*Cyllene glabrata* A. Ad. 38.  
*Cyllene orientalis* A. Ad. 38.  
*Cyllene pulchella* Ad. et Rve. 38.  
*Cylichna arachis* Q. et G. 163.  
*Cylichna assimilis* A. Ad. 164.  
*Cylichna candidula* A. Ad. 164.  
*Cylichna consobrina* A. Ad. 164.  
*Cylichna inedita* A. Ad. 164.  
*Cylichna Japonica* A. Ad. 163.  
*Cylichna latiuscula* A. Ad. 164.  
 35

*Cylichna lepidula* A. Ad. 164.  
*Cylichna parallela* A. Ad. 164.  
*Cylichna proxima* A. Ad. 163.  
*Cylichna pumila* A. Ad. 164.  
*Cylichna rimata* A. Ad. 163.  
*Cylichna semisulcata* Dkr. 163.  
*Cylichna venustula* A. Ad. 163.  
*Cylindra crenulata* Chemn. 53.  
*Cylindrus parvus* Mart. 46.  
*Cylindrus tigrinus* Meusch. 46.  
*Cynisca australis* Kien. 131.  
*Cynisca granulata* A. Ad. 131.  
*Cynisca Japonica* A. Ad. 131.  
*Cypraea adusta* Chemn. 100.  
*Cypraea annulus* Lin. 99.  
*Cypraea Arabica* Lin. 98.  
*Cypraea arlequina* Chemn. 98.  
*Cypraea asellus* Lin. 98.  
*Cypraea caput serpentis* Lin. 99.  
*Cypraea carneola* Lin. 97.  
*Cypraea caurica* Lin. 100.  
*Cypraea cicercula* Lin. 100.  
*Cypraea citrina* Gray. 100.  
*Cypraea clandestina* Lin. 100.  
*Cypraea cribraria* Lin. 98.  
*Cypraea erosa* Lin. 99.  
*Cypraea erronea* Lin. 99. 257.  
*Cypraea felina* Gmel. 98.  
*Cypraea fimbriata* Gmel. 98.  
*Cypraea globosa* Gray. 101.  
*Cypraea gracilis* Gask. 100.  
*Cypraea grando* Gask. 101.  
*Cypraea helvola* Lin. 100.  
*Cypraea histrio* Gmel. 98.  
*Cypraea Isabella* Lin. 97.  
*Cypraea Lamarckii* Gray. 99.  
*Cypraea Lienardi* Jous. 100.  
*Cypraea limacina* Lam. 100.  
*Cypraea lynx* Lin. 99.  
*Cypraea macula* A. Ad. 98.  
*Cypraea Mauritiana* Lin. 98.  
*Cypraea miliaris* Gmel. 99.

*Cypraea moneta* Lin. 99. ;  
*Cypraea olivacea* Lam. 99.  
*Cypraea onyx* Lin. 100.  
*Cypraea ovum* Gmel. 99.  
*Cypraea pallida* Gray. 100.  
*Cypraea pilula* Kien. 101.  
*Cypraea reticulata* Martyn. 98.  
*Cypraea staphylaea* Lin. 100.  
*Cypraea subflava* Gmel. 99.  
*Cypraea testudinaria* Lin. 97.  
*Cypraea tigris* Lin. 99.  
*Cypraea vitellus* L. 99.  
*Cypricardia angulata* Lam. 210.  
*Cypricardia Hornbeckiana* d'Orb. 210.  
*Cypricardia lirata* Rve. 210.  
*Cypricardia oblonga* Sow. 210.  
*Cypricardia rostrata* Lam. 210.  
*Cypricardia vellicata* Reeve. 210.  
*Cyprina tenuistria* Lam. 205.  
*Cyrilla decussata* A. Ad. 261.  
*Cyrilla sulcata* A. Ad. 238. 261.  
*Cytherea aequivoca* Sow. 202.  
*Cytherea amoena* Phil. 200.  
*Cytherea cardilla* 198.  
*Cytherea castanea* Lam. 199.  
*Cytherea excavata* Hanl. 201.  
*Cytherea festiva* Sow. 200.  
*Cytherea fusca* Koch 198.  
*Cytherea gibbia* Lam. 202.  
*Cytherea indecora* Phil. 201.  
*Cytherea inflata* Sow. 201.  
*Cytherea limatula* Sow. jun. 200.  
*Cytherea lusoria* Chemn. 198.  
*Cytherea lutea* Koch. 201.  
*Cytherea menstrualis* Menke. 201.  
*Cytherea meretrix* Lin. 199.  
*Cytherea morphina* Lam. 199.  
*Cytherea muscaria* Lam. 202.  
*Cytherea nummulina* Lam. 202.  
*Cytherea ornata* Lam. 202.  
*Cytherea pacifica* Dillw. 200.  
*Cytherea pannosa* Sow. 201.

*Cytherea picta* Lam. 202.  
*Cytherea placunella* Lam. 202.  
*Cytherea ponderosa* Koch. 200.  
*Cytherea pulicaris* Lam. 202.  
*Cytherea radiata* Sow. 200.  
*Cytherea ranella* Lam. 202.  
*Cytherea squalida* Sow. 201.  
*Cytherea tellinaeformis* Phil. 201.  
*Cytherea testudinalis* Lam. 202.  
*Cytherea undatina* Lam. 202.  
*Cytherea Venetiana* Lam. 201. 202.  
*Dactylus Carpenteri* Mörch. 226.  
*Daphnella fragilis* Rve. 26.  
*Daphnella fusco-lineata* Smith. 25.  
*Daphnella lactea* Rve. 26.  
*Daphnella saturata* Rve. 26.  
*Daphnella subzonata* Smith. 25.  
*Daronia cyclotina* A. Ad. 132.  
*Defrancia texta* Dkr. 24.  
*Delphinula atrata* Chemn. 137.  
*Delphinula australis* Kien. 131.  
*Delphinula costata* Bronn. 113.  
*Delphinula formosa* Rve. 137.  
*Delphinula nivea* Phil. 132.  
*Delphinulopsis Lesourdi* Wright 137.  
*Delphinus atratus* Chemn. 137.  
*Dentalium grande* Desh. 153.  
*Dentalium hexagonum* 153.  
*Dentalium Japonicum* Dkr. 153.  
*Dentalium Javanum* Sow. 153.  
*Dentalium octogonum* Lam. 153.  
*Dentalium Vernedei* Hanl. 153.  
*Dentalium Weinkauffi* Dkr. 153.  
*Desmoulea crassa* A. Ad. 34.  
*Desmoulea Japonica* A. Ad. 34.  
*Diala cornea* A. Ad. 115.  
*Diala leucosticta* A. Ad. 115.  
*Diala picta* A. Ad. 115.  
*Diala sulcifera* A. Ad. 116.  
*Diala varia* A. Ad. 116.  
*Diplodonta semiaspera* Phil. 218.  
*Discina stella* Gould. 254.

*Dolabella Rumphii* Cuv. 168.  
*Dolabella scapula* Mart. 168.  
*Dolium Chinense* Dillw. 57.  
*Dolium crenulatum* Phil. 57.  
*Dolium fasciatum* Mart. 57.  
*Dolium fimbriatum* Sow. 57.  
*Dolium harpa* Mart. 45.  
*Dolium Japonicum* Dkr. 58.  
*Dolium Lischkeanum* Küst. 57.  
*Dolium luteostoma* Küst. 58.  
*Dolium Minjac* Desh. 57.  
*Dolium pennatum* Mörch. 58.  
*Dolium perdix* Lin. 58.  
*Dolium pomum* Lin. 58.  
*Dolium tessellatum* Lam. 57.  
*Dolium variegatum* Phil. 57.  
*Dolium variegatum* var. Küst. 58.  
*Dolium zonatum* Green. 57.  
*Donacilla picta* Dkr. 195.  
*Donax bicolor* Gmel. 194.  
*Donax candidus* Spengl. 195.  
*Donax Dysoni* Lischke 193.  
*Donax incarnatus* Chemn. 194.  
*Donax Irus* Lin. 203.  
*Donax Saigonensis* Crosse 194.  
*Donax semigranosus* Dkr. 193.  
*Doriprismatica festiva* A. Ad. 260.  
*Dosinia angulosa* Phil. 204.  
*Dosinia bilunulata* Gray. 203.  
*Dosinia biscocta* Reeve. 203.  
*Dosinia gibba* A. Ad. 204.  
*Dosinia Gruneri* Phil. 203.  
*Dosinia histrio* Gmel. 204.  
*Dosinia Isocardia* Dkr. 204.  
*Dosinia Japonica* Rve. 203.  
*Dosinia laminata* Rve. 203.  
*Dosinia orbiculata* Dkr. 204.  
*Dosinia Roemeri* Dkr. 203.  
*Dosinia sericea* Rve. 204.  
*Dosinia Sieboldii* Rve. 203.  
*Dosinia Traillii* A. Ad. 204.  
*Dosinia Troscheli* Lischke 203.

- Drillia candens* Smith. 23.  
*Drillia flavidula* Lam. 22.  
*Drillia flavo-nodulosa* Smith. 24.  
*Drillia fortilirata* Smith. 24.  
*Drillia gracilentata* Rve. 24.  
*Drillia humilis* Smith. 23.  
*Drillia inconstans* Smith. 24.  
*Drillia intermaculata* Smith. 23.  
*Drillia interrupta* Lam. 22.  
*Drillia Japonica* Lischke 22.  
*Drillia lanceolata* Rve. 22.  
*Drillia longispira* Smith. 23.  
*Drillia Nagasakiensis* Smith. 23.  
*Drillia obliquata* Rve. 23.  
*Drillia peradmirabilis* Smith. 23.  
*Drillia raricostata* Smith. 23.  
*Drillia Sinensis* Hinds. 22.  
*Drillia striata* Kien. 23.  
*Drillia subauriformis* Smith. 24.  
*Drillia subobliquata* Smith. 23.  
*Drillia texta* Dkr. 24.  
*Drillia vidua* Reeve. 22.  
*Dunkeria asperulata* A. Ad. 119.  
*Dunkeria craticulata* A. Ad. 120.  
*Dunkeria ferruginea* A. Ad. 119.  
*Dunkeria fusca* A. Ad. 119.  
*Dunkeria pulchella* A. Ad. 119.  
*Dunkeria reticulata* A. Ad. 120.  
*Dunkeria rufocincta* A. Ad. 120.  
*Dunkeria scabra* A. Ad. 119.  
*Ebala diaphana* A. Ad. 86.  
*Ebala scintillans* A. Ad. 86.  
*Ebala virginea* A. Ad. 86.  
*Eburna Japonica* Rve. 34.  
*Eglisia Cumingii* A. Ad. 263.  
*Elusa badia* A. Ad. 78.  
*Elusa castanea* A. Ad. 78.  
*Elusa cinnamomea* A. Ad. 78.  
*Elusa gracilis* A. Ad. 78.  
*Elusa strigulata* A. Ad. 78.  
*Elusa subulata* A. Ad. 78.  
*Emarginula Adamsiana* Sow. 152.  
*Emarginula Japonica* Sow. 152.  
*Emarginula maculata* A. Ad. 152.  
*Emarginula picta* Dkr. 152.  
*Emarginula pulchra* A. Ad. 152.  
*Emarginula scabriuscula* A. Ad. 152.  
*Emarginula solidula* Costa. 152.  
*Embolus rostralis* Eyd. et Soul. 3.  
*Engina acuminata* Rve. 56.  
*Engina mendicaria* Lin. 56.  
*Engina trifasciata* Rve. 56.  
*Enida gemmulosa* A. Ad. 145.  
*Enida Japonica* A. Ad. 144.  
*Enida speciosa* A. Ad. 145.  
*Ensiculus cultellus* Lin. 174.  
*Ensiculus marmoratus* Dkr. 174.  
*Ensiculus Philippianus* Dkr. 174.  
*Ensis Krusensternii* Schrenck. 174.  
*Epheria carinifera* A. Ad. 113.  
*Epheria decorata* A. Ad. 112.  
*Epheria inflata* A. Ad. 113.  
*Epheria lepidula* A. Ad. 113.  
*Erato callosa* A. Ad. et Rve. 56.  
*Erato lacrima* Gray. 56. 257.  
*Ervilia Japonica* A. Ad. 196.  
*Ethalia candida* A. Ad. 136.  
*Ethalia nitida* A. Ad. 136.  
*Ethalia omphalotropis* A. Ad. 136.  
*Ethalia perspicua* A. Ad. 136.  
*Ethalia polita* A. Ad. 136.  
*Ethalia sobrina* A. Ad. 136.  
*Eucharis Gouldii* A. Ad. 178.  
*Eucharis Recluzei* A. Ad. 179.  
*Eucharis Stimpsoni* A. Ad. 178.  
*Euchelus Bronnii* Dkr. 140.  
*Euchelus pauperculus* Lischke 140.  
*Euchelus Smithi* Dkr. 140. 259.  
*Eulima acicularis* A. Ad. 89.  
*Eulima angulata* A. Ad. 89.  
*Eulima brunnea* Sow. 90.  
*Eulima chrysallida* A. Ad. 89.  
*Eulima clavula* A. Ad. 88.  
*Eulima curvata* A. Ad. 88.

*Eulima debilis* A. Ad. 89.  
*Eulima dentaliopsis* A. Ad. 89.  
*Eulima eburnea* A. Ad. 89.  
*Eulima flexa* A. Ad. 89.  
*Eulima indeflexa* A. Ad. 89.  
*Eulima mundula* A. Ad. 89.  
*Eulima odontoidea* A. Ad. 89.  
*Eulima pandata* A. Ad. 88.  
*Eulima pinguicula* A. Ad. 89.  
*Eulima reclinata* A. Ad. 89.  
*Eulima robusta* A. Ad. 89.  
*Eulima scitula* A. Ad. 89.  
*Eulima semitorta* A. Ad. 89.  
*Eulima stenostoma* A. Ad. 89.  
*Eulima stylata* A. Ad. 88.  
*Eulima valida* A. Ad. 89.  
*Eulimella hyalina* A. Ad. 85.  
*Eulimella opaca* A. Ad. 85.  
*Eulimella opalina* A. Ad. 85.  
*Eulimella pellucens* A. Ad. 85.  
*Eulimella Philippiana* Dkr. 85.  
*Eulimella vitrea* A. Ad. 85.  
*Eupleura perca* H. et A. Ad. 32.  
*Euthria viridula* Dkr. 19. 255.  
*Evalea arcuata* A. Ad. 83.  
*Evalea elegans* A. Ad. 83.  
*Evalea lirata* A. Ad. 83..  
*Evalea pyramis* A. Ad. 83.  
*Evalea sulcata* A. Ad. 83.  
*Fasciolaria Audouini* Jonas 48.  
*Fasciolaria filamentosa* Chemn. 48.  
*Fasciolaria glabra* Dkr. 48.  
*Fasciolaria inermis* Jonas. 48.  
*Fenella asperulata* A. Ad. 119.  
*Fenella craticulata* A. Ad. 120.  
*Fenella ferruginea* A. Ad. 119.  
*Fenella fusca* A. Ad. 119.  
*Fenella pulchella* A. Ad. 119.  
*Fenella pupoides* A. Ad. 119.  
*Fenella reticulata* A. Ad. 120.  
*Fenella rufocincta* A. Ad. 120.  
*Fenella scabra* A. Ad. 119.

*Ficula Dussumieri* Valenc. 59.  
*Ficula papyracea* Say. 59.  
*Ficula reticulata* Lam. 59.  
*Fissurella macroschisma* Humphr. 150.  
*Fissurella Sieboldii* Rve. 149.  
*Fissurella Ticaonica* Rve. 150.  
*Fistulana clava* Lam. 260.  
*Fossar japonicus* A. Ad. 113.  
*Fossar reticulatus* A. Ad. 114.  
*Fossarina picta* A. Ad. 113.  
*Fossarus Adamsianus* Fischer 114. 258.  
*Fossarus costatus* Brocchi 113.  
*Fossarus fenestratus* A. Ad. 113.  
*Fossarus tornatilis* Gould. 113.  
*Fossarus trochlearis* A. Ad. 113.  
*Fragilia Yantaiensis* Cr. et Deb. 193.  
*Fulguraria Chinensis* Schum. 50.  
*Fusus arcticus* Phil. 14.  
*Fusus arthriticus* Val. 14.  
*Fusus bulbaceus* Val. 14.  
*Fusus cancellatus* Rve. 30.  
*Fusus candelabrum* Rve. 11.  
*Fusus Capensis* Dkr. 19.  
*Fusus Coreanicus* Smith. 13.  
*Fusus crebriliratus* Rve. 11.  
*Fusus crispus* Gould. 11.  
*Fusus despectus* Lam. 14.  
*Fusus filamentosus* Chemn. 48.  
*Fusus fornicatus* Gray. 14.  
*Fusus inconstans* Lischke 11.  
*Fusus Japonicus* Gray. 12.  
*Fusus Kelletti* Forbes. 14.  
*Fusus lacteus* Dkr. 12.  
*Fusus lineolatus* Dkr. 19.  
*Fusus liratus* Couth. 10.  
*Fusus longicauda* Bory. 12.  
*Fusus Nicobaricus* Chemn. 11.  
*Fusus nigrirostratus* Smith. 12.  
*Fusus Niponicus* Smith. 13.  
*Fusus nodoso-plicatus* Dkr. 11.  
*Fusus Orpheus* Gould. 11.  
*Fusus pachyrhaphe* Smith. 10.

- Fusus pagoda* Less. 13.  
*Fusus perplexus* A. Ad. 12.  
*Fusus plumbeus* Phil. 20.  
*Fusus serratus* Desh. 13.  
*Fusus simplex* Smith. 13.  
*Fusus spectrum* Ad. et Rve. 12.  
*Fusus submuricatus* Schrenck. 8. 255.  
*Fusus tuberosus* Rve. 12.  
*Fusus viridulus* Dkr. 19.  
*Galeomma Japonicum* A. Ad. 219.  
*Gallinula vittata* A. Ad. 95.  
*Gastrana Yantaiensis* Crosse et Deb. 193.  
*Gastrochaena grandis* Desh. 171.  
*Gastrochaena mumia* Spengl. 171. 260.  
*Gena lutea* Lin. 146.  
*Gena varia* A. Ad. 146.  
*Gibbula cicer* Mke. 144.  
*Gibbula globularia* Schrenck. 144.  
*Gibbula Preissiana* Phil. 145.  
*Globulus anguliferus* Phil. 135.  
*Globulus giganteus* Phil. 134.  
*Globulus Thomasi* Crosse 135.  
*Glycymeris Japonica* A. Ad. 176.  
*Gomphina donacina* Chemn. 199.  
*Gomphina melanaegis* Roem. 199.  
*Goniostoma pupaeforme* A. Ad. 117.  
*Gotoïna pyrgula* A. Ad. 114.  
*Gotoïna sulcifera* A. Ad. 114.  
*Guildfordia triumphans* Phil. 129.  
*Haliotis asinina* Lin. 149.  
*Haliotis exigua* Dkr. 148.  
*Haliotis gigantea* Chemn. 147. 260.  
*Haliotis Gruneri* Phil. 148.  
*Haliotis imperforata* Chemn. 146.  
*Haliotis Japonica* Rve. 148.  
*Haliotis lamellosa* Lam. 148.  
*Haliotis latilabris* Phil. 149.  
*Haliotis Sieboldii* Rve. 148.  
*Haliotis supertexta* Lischke 148.  
*Haminea brevissima* A. Ad. 166.  
*Haminea cymbalum* Q. et G. 166.  
*Haminea pygmaea* A. Ad. 166.  
*Haminea rotundata* A. Ad. 166.  
*Haminea strigosa* A. Ad. 166.  
*Haminea Succinea* Conr. 166.  
*Harpa conoidalis* Lam. 45.  
*Harpa nablium* Sow. 45.  
*Harpa ventricosa* var. Desh. 45.  
*Hebra muricata* A. Ad. 37.  
*Helix perspicua* Lin. 59.  
*Hemifusus tuba* Gmel. 15.  
*Hima acutidentata* Smith. 36.  
*Hima festiva* Powis. 37. 256.  
*Hima fraterculus* A. Ad. 37.  
*Hima luteola* Smith. 37.  
*Hima tenuis* E. A. Smith. 36. 256.  
*Hipponyx australis* Lam. 125.  
*Hipponyx foliaceus* Q. et G. 125.  
*Hipponyx pilosus* Desh. 125.  
*Huxleya sulcata* A. Ad. 238. 261.  
*Hyalaea flava* Orb. 2.  
*Hyalaea gibbosa* Rang. 2.  
*Hyalaea longirostris* Q. et G. 2.  
*Hydatina albo-cincta* v. d. Hoeven 162.  
*Hydatina filosa* Schum. 162.  
*Hydatina inflata* Dkr. 162.  
*Hydatina physis* Lin. 162.  
*Iacra Japonica* A. Ad. 194.  
*Infundibulum chloromphalus* A. Ad. 138.  
*Iolaea amabilis* A. Ad. 88.  
*Iolaea scitula* A. Ad. 87.  
*Iolaea sculptilis* A. Ad. 87.  
*Iphinoe quadricarinata* A. Ad. 106.  
*Isanda crenellifera* A. Ad. 132.  
*Isanda maculosa* A. Ad. 136.  
*Isapis conoidea* A. Ad. 114.  
*Isapis lirata* A. Ad. 114.  
*Ismenia Reevei* A. Ad. 253.  
*Ismenia sanguinea* A. Ad. 253.  
*Isocardia Moltkiana* Chemn. 213.  
*Isocardia semisulcata* Lam. 213.  
*Isocardia tetragona* Ad. et Rve. 213.



*Isognomum* Perna. Lin. 230.  
*Janthina balteata* Reeve 169.  
*Janthina fragilis* Lam. 169.  
*Janthina globosa* Swains. 169.  
*Jouannetia Cumingii* Sow. 170.  
*Kellia pumila* S. Wood. 218.  
*Kleinella cancellaris* A. Ad. 160.  
*Kleinella sulcata* A. Ad. 161.  
*Lachesis Japonica* A. Ad. 25.  
*Lacuna carinifera* A. Ad. 113.  
*Lacuna decorata* A. Ad. 112.  
*Lacuna glacialis* Möll. 112.  
*Lacuna inflata* A. Ad. 113.  
*Lacuna latifasciata* A. Ad. 112.  
*Lacuna lepidula* A. Ad. 113.  
*Lacuna turrita* A. Ad. 112.  
*Lacuna vineta* Mont. 112.  
*Lagena Oregonensis* H. et A. Ad. 30.  
*Lamellaria perspicua* Lin. 59.  
*Lampania aterrima* Dkr. 109.  
*Lampania Cumingii* Crosse. 110.  
*Lampania multiformis* Lischke 109.  
*Lampania zonalis* Brug. 109.  
*Lampas hians* Schum. 31.  
*Laona zonata* A. Ad. 168.  
*Laqueus rubellus* Sow. 252.  
*Laqueus suffusus* Dall. 252.  
*Lasea rubra* Mont. 218.  
*Lathyrus polygonus* Gmel. 48.  
*Lathyrus rhodostoma* Dkr. 49.  
*Latiaxis Mawae* Swains. 42.  
*Leda confusa* Hanl. 238.  
*Leda pernula* Müll. 238.  
*Leda pernuloides* A. Ad. 238.  
*Leiomya adunca* Gould. 181.  
*Leiostraca clara* A. Ad. 90.  
*Leiostraca clavella* A. Ad. 90.  
*Leiostraca labiata* A. Ad. 90.  
*Leiostraca lanceata* A. Ad. 90.  
*Leiostraca Leachii* A. Ad. 90.  
*Leiostraca lentiginosa* A. Ad. 91.  
*Leiostraca lepida* A. Ad. 90.

*Leiostraca nitida* A. Ad. 90.  
*Leiostraca nivea* A. Ad. 90.  
*Leiostraca nixa* A. Ad. 90.  
*Leiostraca paxillus* A. Ad. 90.  
*Leiostraca pura* A. Ad. 90.  
*Leiostraca spicula* A. Ad. 90.  
*Leiostraca tantilla* A. Ad. 90.  
*Leiostraca turgidula* A. Ad. 90.  
*Leiostraca vineta* A. Ad. 91.  
*Lepeta caeca* Müll. 155.  
*Lepidopleurus Lindholmii* Schrenck. 157.  
*Leptochiton concinnus* Gould. 158.  
*Leptochiton lividus* Midd. 158.  
*Leptochiton Mertensii* Midd. 158.  
*Leptochiton Middendorffii* Schrenck. 157.  
*Leptochiton scrobiculatus* Midd. 157.  
*Leptoconchus ellipticus* Sow. 45.  
*Leptoconchus Peronii* Lam. 45.  
*Leptoconchus rostratus* A. Ad. 45.  
*Leptoconchus Schrenckii* Lischke 45.  
*Leptoconchus serratus* Rüpp. 45.  
*Leptoconchus striatus* Rüpp. 45.  
*Leptomya adunca* Gould. 194.  
*Leptomya cochlearis* Hinds. 194.  
*Lepton Japonicum* A. Ad. 219.  
*Lepton subrotundum* Dkr. 219.  
*Lepton sulcatulum* Jeffr. 219.  
*Leucotina exarata* A. Ad. 161.  
*Leucotina insculpta* A. Ad. 161.  
*Leucotina Nipponensis* A. Ad. 161.  
*Leucotina punctata* A. Ad. 161.  
*Leucotina sulcata* A. Ad. 161.  
*Lima Japonica* Dkr. 245.  
*Lima squamosa* Lam. 244.  
*Lima tenera* Chemn. 245.  
*Limopsis crenata* A. Ad. 237.  
*Limopsis Cumingii* A. Ad. 237.  
*Limopsis Forskålii* A. Ad. 237.  
*Limopsis Japonica* A. Ad. 237.  
*Limopsis obliqua* A. Ad. 237.

- Limopsis oblonga* A. Ad. 237.  
*Limopsis Woodwardi* A. Ad. 237.  
*Lingula anatina* Lam. 254.  
*Lingula Dumortieri* Nyst. 254.  
*Lingula jaspidea* A. Ad. 254.  
*Lingula lepidula* A. Ad. 254.  
*Lingula smaragdina* A. Ad. 254.  
*Lingula tumidula* Rve. 254.  
*Lioconcha castrensis* var. Chemn. 202.  
*Lioconcha fulminea* Bolten. 202.  
*Lioconcha ornata* Dillw. 202.  
*Liotia armata* A. Ad. 131.  
*Liotia pilula* Dkr. 131.  
*Liotia semiclatratula* Schrenck. 131.  
*Lithodomus aristatus* Carp. 226.  
*Lithodomus caudigerus* Sow. 226.  
*Lithodomus divaricata* Rve. 225.  
*Lithodomus semigranata* Rve. 225.  
*Lithophaga aristata* Soland. 226.  
*Lithophaga canalifera* Hanl. 227.  
*Lithophaga curta* Lischke. 226.  
*Lithophaga nasuta* Phil. 226.  
*Lithophaga Zitteliana* Dkr. 226.  
*Lithophagus caudatus* Gray. 226.  
*Lithophagus curtus* Lischke. 226.  
*Litorina brevicula* Phil. 111.  
*Litorina exigua* Dkr. 111.  
*Litorina grandis* Midd. 110.  
*Litorina granularis* Rve. 111.  
*Litorina Malaccana* Phil. 111.  
*Litorina Mandschurica* Schrenck. 111.  
*Litorina modesta* Phil. 112.  
*Litorina Sieboldii* Phil. 112.  
*Litorina Sinensis* Phil. 112.  
*Litorina Sitchana* Phil. 111.  
*Litorina Souverbiana* Crosse. 111.  
*Litorina strigata* Lischke. 112.  
*Litorina subtenebrosa* Midd. 111.  
*Lophyrus Albrechti* Schrenck. 157.  
*Lophyrus Coreanicus* Ad. et Rve. 157.  
*Lucapina Sieboldii* Rve. 149.  
*Lucapina Ticaonica* Rve. 150.  
*Lucina contraria* Dkr. 215.  
*Lucina corrugata* Dkr. 216.  
*Lucina divaricata* Chemn. 216.  
*Lucina divergens* Phil. 216.  
*Lucina edentula* Lin. 216.  
*Lucina fibula* Ad. et. Rve. 216.  
*Lucina orbella* Gould. 218.  
*Lucina parvula* Gould. 216.  
*Lucina Philippiana* Rve. 216.  
*Lucina Pisidium* Dkr. 216.  
*Lucina quadrisulcata* Orb. 216.  
*Lucina ramulosa* Gould. 216.  
*Lucinopsis decussata* Phil. 193.  
*Lucinopsis divaricata* Lischke. 193.  
*Lunatia Adamsiana* Dkr. 61.  
*Lunatia aperta* Lovèn. 61.  
*Lunatia clausa* Brod. et Sow. 60.  
*Lunatia janthostoma* Desh. 61.  
*Lunatia pallida* Brod. et Sow. 61.  
*Lunella granulata* Gmel. 128.  
*Lutraria arcuata* Desh. 185.  
*Lutraria larga* Reeve 185.  
*Lutraria maxima* Jonas 185.  
*Lutraria Middendorffii* Rve. 184.  
*Lutraria Nuttallii* Conr. 184.  
*Lutraria Sieboldi* Desh. 185.  
*Lyonsia navicula* A. Ad. et Rve. 179.  
*Lyonsia Norwegica* Chemn. 179.  
*Lyonsia praetenuis* Dkr. 180.  
*Lyonsia rostrata* Lischke. 179.  
*Lyonsia ventricosa* Gould. 179.  
*Lyria cassidula* Rve. 50.  
*Lyria nucleus* Lam. 50.  
*Macha divaricata* Lischke. 175.  
*Machaera sodalis* Gould. 175.  
*Macrocheilus Japonicus* A. Ad. 63.  
*Macroschisma dilatatum* A. Ad. 150.  
*Macroschisma maximum* A. Ad. 150.  
*Macroschisma Sinense* A. Ad. 150.  
*Mactra Aegyptiaca* Chemn. 184.  
*Mactra Bonneau* Bern. 183. 261.  
*Mactra Grayana* Schrenck. 184.

*Mactra Lühdorffii* Dkr. 183.  
*Mactra lurida* Phil. 183.  
*Mactra maxima* Rve. 184.  
*Mactra ornata* Gray. 182.  
*Mactra pellicula* Desh. 185.  
*Mactra ponderosa* Phil. 184.  
*Mactra quadrangularis* Desh. 182.  
*Mactra rostralis* Desh. 185.  
*Mactra rugosa* Chemn. 184.  
*Mactra Sachalinensis* Schrenck. 183.  
*Mactra spectabilis* Lischke. 182.  
*Mactra striata* Chemn. 195.  
*Mactra sulcataria* Desh. 182.  
*Mactra veneriformis* Desh. 182.  
*Magasella Adamsi* Davidson. 253.  
*Magasella Gouldi* Dall. 253.  
*Magilus Peronii* Lam. 45.  
*Malleus albus* Chemn. 230.  
*Malleus regula* Forskål. 231.  
*Malleus vulsellatus* Chemn. 231.  
*Mangilia costulata* Dkr. 26.  
*Mangilia Deshayesii* Dkr. 26.  
*Mangilia Leuckarti* Dkr. 25.  
*Mangilia pygmaea* Dkr. 26.  
*Mangilia robusticostata* Smith. 26.  
*Mangilia splendida* A. Ad. 26.  
*Marcia quadrangularis* Ad. et Rve. 198.  
*Margarita arctica* Leach. 145.  
*Margarita helicina* O. Fabr. 139.  
*Margarita mustelina* Gould. 145.  
*Marginella obtusa* Sow. 57.  
*Marginella sexplicata* Dkr. 57.  
*Martesia striata* Lin. 171.  
*Medoria turrita* A. Ad. 112.  
*Megerlia sanguinea* Chemn. 253.  
*Meleagrina Martensii* Dkr. 229.  
*Meleagrina pica* Lischke. 229.  
*Melina Australica* Rve. 230.  
*Melina costellata* Conr. 230.  
*Melina perna* Lin. 230.  
*Melo Broderipii* Gray. 49.  
*Menestho exarata* A. Ad. 88.  
 Dunker, Moll. Jap. mar.

*Menestho sculptilis* A. Ad. 87.  
*Mercenaria Stimpsoni* Gould. 196.  
*Meretrix lusoria* Chemn. 198.  
*Merica elegans* H. et A. Ad. 104.  
*Merica Fischeri* A. Ad. 104.  
*Merica macrospira* Ad. et Rve. 104.  
*Meroë excavata* Sow. 201.  
*Meroë magnifica* Rve. 201.  
*Meroë subquadrata* Sow. 201.  
*Merope Aegyptiaca* Chemn. 184.  
*Microstelma daedala* A. Ad. 118.  
*Microtheca crenellifera* A. Ad. 132.  
*Minosia punctata* A. Ad. 142.  
*Mitra aemula* Smith. 53.  
*Mitra amphorella* Lam. 52.  
*Mitra analogica* Rve. 53.  
*Mitra Antoniae* H. Adams. 51.  
*Mitra Bronnii* Dkr. 52.  
*Mitra Collinsoni* A. Ad. 52.  
*Mitra cruentata* Chemn. 52.  
*Mitra ferruginea* Lam. 51.  
*Mitra flammigera* Rve. 51.  
*Mitra fusco-apicata* Smith. 52.  
*Mitra Gotoënsis* Smith. 52.  
*Mitra Hanleyana* Dkr. 51.  
*Mitra inermis* Rve. 53.  
*Mitra Kraussii* Dkr. 53.  
*Mitra microzonias* Lam. 53.  
*Mitra porphyretica* Rve. 53.  
*Mitra pyramidella* A. Ad. 52.  
*Mitra rosacea* Rve. 51.  
*Mitra salmonea* Sow. 52. 256.  
*Mitra scutulata* Chemn. 52.  
*Mitra subtruncata* Sow. 52.  
*Mitra Sulnensis* Smith. 52.  
*Mitra Wrighti* Crosse. 51.  
*Mitromorpha lirata* A. Ad. 25. 256.  
*Modiola arcuatula* Hanl. 224.  
*Modiola aterrima* Dall. 222.  
*Modiola Californiensis* Eschsch. 227.  
*Modiola caudigera* Lam. 226.  
*Modiola Cumingiana* Dkr. 224.

- Modiola divaricata* Phil. 225.  
*Modiola flavida* Dkr. 223.  
*Modiola Fortunei* Dkr. 224.  
*Modiola Hanleyi* Dkr. 223.  
*Modiola Japonica* Dkr. 224.  
*Modiola Metcalfei* Hanl. 223.  
*Modiola modiolus* Lin. 222.  
*Modiola nasuta* Phil. 226.  
*Modiola nitida* Hanl. 223.  
*Modiola rhomboidea* Hanl. 223.  
*Modiola Senhausii* Rve. 224.  
*Modiola Traillii* Rve. 222.  
*Modiola varicosa* Gould. 224.  
*Modiola vestita* Phil. 223.  
*Modiolaria Cumingiana* Dkr. 224.  
*Modiolaria divaricata* Phil. 225.  
*Modiolaria nigra* Gray. 224.  
*Modiolaria pusio* A. Ad. 225.  
*Modiolaria semigranata* Rve. 225.  
*Modiolaria vernicosa* Midd. 224.  
*Moerchia obvoluta* A. Ad. 132.  
*Monilea vitiliginea* Mke. 144.  
*Monodonta australis* Lam. 139.  
*Monodonta Bronnii* Dkr. 140.  
*Monodonta exigua* A. Ad. 140.  
*Monodonta labio* Lin. 139.  
*Monodonta margaritaria* Phil. 139.  
*Monodonta neritoides* Phil. 140.  
*Monoptygma coelatum* A. Ad. 87.  
*Monoptygma eximium* Lischke. 87.  
*Monoptygma fulvum* A. Ad. 87.  
*Monoptygma striatum* Gray. 87.  
*Mopalia Stimpsoni* Gould. 158.  
*Morula aspera* Lam. 41.  
*Morula musiva* Kien. 41.  
*Morula siderea* Rve. 42.  
*Morula tuberculata* Blainv. 41.  
*Morula undata* Chemn. 41.  
*Mucronalia bicincta* A. Ad. 86.  
*Mucronalia exilis* A. Ad. 87.  
*Murex acanthophorus* A. Ad. 7.  
*Murex acanthopterus* Lam. 5.  
*Murex aduncospinosus* Rve. 3.  
*Murex adustus* Lam. 4.  
*Murex aluco* Lin. 107.  
*Murex antiquus* Lin. 14.  
*Murex anus* Lin. 30.  
*Murex Argus fasciatus* Chemn. 28. 256.  
*Murex brachypteron* A. Ad. 6.  
*Murex bufo* Chemn. 31.  
*Murex bufonius* Gmel. 31.  
*Murex Burnettii* Ad. et Rve. 8.  
*Murex calcarius* Dkr. 8.  
*Murex cirrosus* var. Hinds. 9.  
*Murex clandestinus* Chemn. 30.  
*Murex clathratus* Lin. 9.  
*Murex Coreanicus* A. Ad. 262.  
*Murex coronatus* A. Ad. 7.  
*Murex coronatus* Born. 107.  
*Murex costatus* Born. 28. 256.  
*Murex costularis* Lam. 44.  
*Murex crassispina* Lam. 3.  
*Murex crassus* A. Ad. 10.  
*Murex despectus* Lin. 14.  
*Murex diadema* A. Ad. 9.  
*Murex duplicatus* Chemn. 3.  
*Murex elongatus* var. Sow. 4.  
*Murex emarginatus* Sow. 8.  
*Murex eurypteron* Rve. 5.  
*Murex falcatus* Sow. 6.  
*Murex fimbriatulus* A. Ad. 8.  
*Murex fimbriatus* DeFr. 10.  
*Murex fimbriatus* Lam. 10.  
*Murex fiscella* Chemn. 41.  
*Murex foliatus* Martyn. 7.  
*Murex foliatus* Gmel. 7.  
*Murex fornicatus* Gmel. 14.  
*Murex Fournieri* Crosse. 8.  
*Murex fulgura* Martini. 49.  
*Murex gibbosus* Born. 22.  
*Murex Gouldii* A. Ad. 6.  
*Murex haustellum* Lin. 4.  
*Murex inornatus* Recluz. 8. 255.  
*Murex Japonicus* Dkr. 8. 255.

*Murex lampas* Lin. 31.  
*Murex luculentus* Rve. 9.  
*Murex Martinianus* Pfr. 5.  
*Murex Martinianus* Rve. 3.  
*Murex monachus* Crosse 8.  
*Murex Nicobaricus* Chemn. 11.  
*Murex olearium* Born. 28. 256.  
*Murex olearius* Lin. 28.  
*Murex Parthenopes* Salis. 28.  
*Murex parthenopus* Dillw. 28. 256.  
*Murex Penchinati* Crosse. 4.  
*Murex pilearis* Lin. 28.  
*Murex pinnatus* Wood. 5.  
*Murex piraster* Lam. 30.  
*Murex pirum* Lin. 29.  
*Murex pliciferus* Sow. 4.  
*Murex plorator* Ad. et Rve. 5.  
*Murex polygonus* Gmel. 48.  
*Murex purpura foliata* Chemn. 7.  
*Murex puteolus* A. Ad. 9.  
*Murex ramosus* Lin. 4.  
*Murex rana* Lin. 31.  
*Murex rorifluus* Ad. et Rve. 8.  
*Murex rarisipina* Sow. 3.  
*Murex reticularis* Lin. 30.  
*Murex rota* Sow. 5.  
*Murex scorpio* Lin. 5.  
*Murex senticosus* Lin. 30. 34.  
*Murex Sinensis* Gmel. 107.  
*Murex Sinensis* Rve. 4.  
*Murex sobrinus* A. Ad. 4.  
*Murex Stimpsoni* A. Ad. 6.  
*Murex Talienwhanensis* Crosse. 8.  
*Murex tectum* Sinense Desh. 43.  
*Murex tenuispina* Kien. 3.  
*Murex tenuispina* Lam. 3.  
*Murex ternispina* var. Sow. 3.  
*Murex tribulus* Lin. 3.  
*Murex tribulus nobilior* Lin. 3.  
*Murex tripterus* Kien. 7.  
*Murex Troscheli* Lischke. 3.  
*Murex tuba* Gmel. 15.

*Murex undatus* Chemn. 41.  
*Murex unifasciatus* A. Ad. 7.  
*Murex vicinus* Lin. 41.  
*Murex Yoldii* Mörch. 6. 255.  
*Muricidea puteola* A. Ad. 9.  
*Mya arctica* Lin. 175.  
*Mya arenaria* Lin. 176.  
*Mya Japonica* Jay. 176.  
*Mya labiata* Maton. 177.  
*Mya Mindoroënsis* Ad. et Rve. 178.  
*Mya minor* Chemn. 228.  
*Mya Norwegica* Chemn. 179.  
*Mya truncata* Lin. 176.  
*Mya Vulsella* Lin. 228.  
*Myodora triangularis* A. Ad. 181.  
*Myodora trigona* Rve. 182.  
*Myonia Japonica* A. Ad. 161.  
*Myonia scitula* A. Ad. 161.  
*Myonia virgo* A. Ad. 161.  
*Myrtea circinata* A. Ad. 217.  
*Myrtea decussata* A. Ad. 217.  
*Myrtea delicatula* A. Ad. 217.  
*Myrtea fimbriatula* A. Ad. 217.  
*Myrtea gibba* A. Ad. 217.  
*Myrtea lamellata* A. Ad. 217.  
*Myrtea obesula* A. Ad. 217.  
*Myrtea plicatula* A. Ad. 217.  
*Myrtea reticulata* A. Ad. 217.  
*Mysia usta* Gould. 218.  
*Mytilicardia Cumingiana* Dkr. 221.  
*Mytilicardia Leana* Dkr. 221.  
*Mytilicardia pica* Rve. 221.  
*Mytilus aristatus* Soland. 226.  
*Mytilus atratus* Lischke. 222.  
*Mytilus bifurcatus* Conr. 228.  
*Mytilus bilocularis* Lin. 227.  
*Mytilus coruscus* Gould. 261.  
*Mytilus crassitesta* Lischke. 221.  
*Mytilus crassus* Rve. 227.  
*Mytilus curvatus* Dkr. 222.  
*Mytilus decussatus* Mont. 225.  
*Mytilus Dunkeri* Rve. 221.

- Mytilus edulis* forma gigantea Nordmn. 221.  
*Mytilus giganteus* Holmb. 221.  
*Mytilus Grayanus* Dkr. 221.  
*Mytilus hirsutus* Lam. 222.  
*Mytilus modiolus* Lin. 222.  
*Mytilus Nicobaricus* Chemn. 227.  
*Mytilus Ropan* Desh. 226.  
*Mytilus rugosus* Lin. 176.  
*Mytilus sinuatus* Dkr. 222.  
*Mytilus soleniformis* Orb. 225. 227.  
*Myurella pumilio* Smith. 73.  
*Myurella serotina* Hinds. 73.  
*Myurella torquata* Ad. et Rve. 73.  
*Natica cancellata* Chemn. 126.  
*Nassa acutidentata* Smith. 36.  
*Nassa balteata* Lischke. 34.  
*Nassa caelata* A. Ad. 35.  
*Nassa clandestina* A. Ad. 38.  
*Nassa Cumingii* A. Ad. 36.  
*Nassa dense-granata* A. Ad. 36.  
*Nassa dermestina* Gould. 37.  
*Nassa festiva* Powis. 37. 256.  
*Nassa fraterculus* Dkr. 37.  
*Nassa gemmulata* Lam. 35.  
*Nassa gemmulifera* A. Ad. 36.  
*Nassa Glans* Lin. 35.  
*Nassa gracilis* Pease 38.  
*Nassa Japonica* A. Ad. 36. 256.  
*Nassa lirata* Dkr. 37.  
*Nassa livescens* Phil. 35.  
*Nassa luctuosa* A. Ad. 36.  
*Nassa luteola* Smith. 37.  
*Nassa marginulata* Lam. 36.  
*Nassa micans* A. Ad. 38.  
*Nassa muricata* Q. et G. 37.  
*Nassa mutabilis* Lin. 34.  
*Nassa plebecula* Gould. 37.  
*Nassa Siquiorensis* A. Ad. 35.  
*Nassa speciosa* A. Ad. 10.  
*Nassa stigmatica* A. Ad. 36.  
*Nassa succincta* A. Ad. 37.  
*Nassa suturalis* Lam. 35.  
*Nassa tenuis* E. A. Smith. 36. 256.  
*Nassa Thersites* Brug. 35.  
*Nassa varicifera* A. Ad. 38.  
*Nassaria magnifica* Lischke. 38.  
*Natica Adamsiana* Dkr. 61.  
*Natica ala papilionis minor* Chemn. 60.  
*Natica aperta* Lovén. 61.  
*Natica articulata* Phil. 60.  
*Natica bicincta* Schrenck. 60.  
*Natica borealis* Gray. 61.  
*Natica canrena* ♂ Gmel. 60.  
*Natica clausa* Brod. et Sow. 60.  
*Natica concinna* Dkr. 60.  
*Natica didyma* Bolt. 61.  
*Natica Draparnaudii* Recl. 62.  
*Natica Gouldii* Phil. 61.  
*Natica incisa* Dkr. 62.  
*Natica janthostoma* Desh. 61.  
*Natica Javanica* Lam. 60.  
*Natica Lamarckiana* Recl. 61.  
*Natica maculosa* Lam. 60.  
*Natica pellis tigrina* Chemn. 60.  
*Natica pes elephantis* Chemn. 62.  
*Natica piriformis* Recl. 63.  
*Natica ponderosa* Phil. 62.  
*Natica Powisiana* Recl. 62.  
*Natica robusta* Dkr. 61.  
*Natica simiae* Desh. 62.  
*Natica simioides* Recl. 62.  
*Natica taeniata* Mke. 60.  
*Natica vesicalis* Phil. 61.  
*Naticina papilla* Gmel. 63.  
*Nautilus major* Mart. 2.  
*Nautilus Pompilius* Lin. 2.  
*Neaera adunca* Gould. 181.  
*Neaera cochlearis* Hinds. 194.  
*Neaera elegans* Hinds. 180.  
*Neaera fragilis* A. Ad. 181.  
*Neaera Gouldiana* Hinds. 180.  
*Neaera Hindsiana* A. Ad. 180.  
*Neaera iridescens* Hinds. 181.  
*Neaera Moluccana* Ad. et Rve. 180.

- Neaera nasuta* A. Ad. 180.  
*Neaera nitida* Ad. et Rve. 180.  
*Neaera nobilis* A. Ad. 180.  
*Neaera Philippinensis* Hinds. 180.  
*Neaera rugata* A. Ad. 180.  
*Neptunea antiqua* Lin. 14.  
*Neptunea arthritica* Val. 14.  
*Neptunea Cumingii* Crosse. 14.  
*Neptunea despecta* Lin. 14.  
*Neptunea fusco-lineata* Pease. 17.  
*Neptunea Kelletii* Forbes. 14.  
*Neptunea lurida* A. Ad. 14.  
*Neptunea pericochlion* Schrenck. 15.  
*Neptunea plicata* A. Ad. 14.  
*Nerita albicella* Lin. 126.  
*Nerita cancellata* Chemn. 126.  
*Nerita costata* Brocchi. 113.  
*Nerita Japonica* Dkr. 126.  
*Nerita mamilla* Lin. 62.  
*Nerita marmorata* Rve. 126.  
*Nerita papilla* Gmel. 63.  
*Nerita pellis tigrina* Chemn. 60.  
*Nerita pica* Gould. 126.  
*Nerita polita* Lin. 126.  
*Nerita venusta* Dkr. 126.  
*Neritina adspersa* Recl. 126.  
*Neritina pusilla* C. B. Ad. 136.  
*Neverita incisa* Dkr. 62.  
*Neverita Reiniana* Dkr. 62.  
*Neverita vesicalis* Phil. 61.  
*Niotha caelata* A. Ad. 35.  
*Niotha Cumingii* A. Ad. 36.  
*Niotha gemmulata* A. Ad. 35.  
*Niotha gemmulifera* A. Ad. 36.  
*Nipponia pulchella* A. Ad. 146.  
*Niso brunnea* Sow. 90.  
*Niso interrupta* Sow. 89.  
*Nubecula intermedia* Rve. 94.  
*Nucinella ovata* Jeff. 235.  
*Nucula amygdalea* Valenc. 239.  
*Nucula castrensis* Hinds. 238.  
*Nucula divaricata* Hinds. 238.  
*Nucula lanceolata* Sow. 239.  
*Nucula mirabilis* A. Ad. et Rve. 238.  
*Nucula paulula* A. Ad. 238.  
*Nucula pella* Sow. 238.  
*Nucula pygmaea* Münst. 239.  
*Obeliscus aciculatus* A. Ad. 76.  
*Obeliscus annulatus* A. Ad. 84.  
*Obeliscus balteatus* A. Ad. 74.  
*Obeliscus brunneus* A. Ad. 76.  
*Obeliscus buxeus* Gould. 76.  
*Obeliscus eburneus* A. Ad. 74.  
*Obeliscus elegans* A. Ad. 76.  
*Obeliscus hyalinus* Dkr. 75.  
*Obeliscus nitidulus* A. Ad. 75.  
*Obeliscus pulchellus* A. Ad. 74.  
*Obeliscus pusillus* A. Ad. 74.  
*Obeliscus solidulus* Dkr. 75.  
*Obeliscus striatulus* A. Ad. 76.  
*Obeliscus tenuisculptus* Lischke 75.  
*Obeliscus teres* A. Ad. 74.  
*Obeliscus trifasciatus* A. Ad. 75.  
*Obeliscus vitreus* A. Ad. 75.  
*Ocenebra fimbriata* A. Ad. 10.  
*Odostomia Achatinella* A. Ad. 82.  
*Odostomia arcuata* A. Ad. 83.  
*Odostomia cana* A. Ad. 82.  
*Odostomia costulata* Dkr. 84.  
*Odostomia elata* A. Ad. 82.  
*Odostomia elegans* A. Ad. 83.  
*Odostomia fasciata* Dkr. 83.  
*Odostomia fenestrata* Forbes. 84.  
*Odostomia goniosoma* A. Ad. 83.  
*Odostomia hyalina* A. Ad. 83.  
*Odostomia Japonica* A. Ad. 82.  
*Odostomia lactea* Dkr. 83.  
*Odostomia lirata* A. Ad. 83.  
*Odostomia nana* A. Ad. 82.  
*Odostomia neglecta* A. Ad. 82.  
*Odostomia nivea* A. Ad. 81.  
*Odostomia obesula* A. Ad. 82.  
*Odostomia oblonga* A. Ad. 82.  
*Odostomia ovoidea* A. Ad. 83.

- Odostomia producta* A. Ad. 83.  
*Odostomia pruinosa* A. Ad. 82.  
*Odostomia pupa* A. Ad. 82.  
*Odostomia pygmaea* A. Ad. 82.  
*Odostomia pyramis* A. Ad. 83.  
*Odostomia scalina* A. Ad. 83.  
*Odostomia spiralis* Mont. 84.  
*Odostomia spirata* A. Ad. 84.  
*Odostomia subangulata* A. Ad. 81.  
*Odostomia subdiaphana* A. Ad. 81.  
*Odostomia sulcata* A. Ad. 83.  
*Odostomia tenera* A. Ad. 83.  
*Odostomia ventricosa* A. Ad. 83.  
*Odostomia vitrea* A. Ad. 83.  
*Oliva carneola* Lam. 46.  
*Oliva conoidalis* Lam. 46.  
*Oliva consobrina* Lischke. 47.  
*Oliva dama* Mawe. 47.  
*Oliva elegans* Lam. 46.  
*Oliva exigua* Mörch. 46.  
*Oliva fabula* Marr. 47.  
*Oliva gracilis* Brod. et Sow. 47.  
*Oliva irisans* Lam. 46.  
*Oliva mustelina* Lam. 46.  
*Oliva picta* Rve. 46.  
*Oliva signata* Lischke. 47.  
*Oliva tessellata* Lam. 46.  
*Olivella anazora* Ducl. 46.  
*Olivella consobrina* Lischke. 47.  
*Olivella dama* Mawe. 47.  
*Olivella gracilis* Brod. et Sow. 47.  
*Olivella jaspidea* Gmel. 46.  
*Olivella signata* Lischke. 47.  
*Olivella spreta* Gould. 47.  
*Olivella tergina* Ducl. 47.  
*Olivella zanoeta* Ducl. 47.  
*Omphalius sordidus* Phil. 144.  
*Onoba annulata* Dkr. 120.  
*Onoba bella* A. Ad. 120.  
*Onoba egregia* A. Ad. 120.  
*Onoba elegantula* A. Ad. 120.  
*Onoba ferruginea* A. Ad. 120.  
*Onoba lucida* A. Ad. 120.  
*Onoba mirifica* A. Ad. 120.  
*Onoba mundula* A. Ad. 120.  
*Onoba patula* A. Ad. 120.  
*Onoba procera* A. Ad. 120.  
*Onoba spirata* A. Ad. 120.  
*Onoba sulcifera* A. Ad. 120.  
*Opalia exquisita* A. Ad. 68.  
*Operculatum laeve* Lin. 169.  
*Oscilla annulata* A. Ad. 84.  
*Oscilla circinata* A. Ad. 84.  
*Oscilla lirata* A. Ad. 83.  
*Oscilla sulcata* A. Ad. 83.  
*Ostrea arborea* Chemn. 250.  
*Ostrea auriculata* Sow. 249.  
*Ostrea cornu copiae* Chemn. 250.  
*Ostrea cucullata* Born. 250.  
*Ostrea dense lamellosa* Lischke. 249.  
*Ostrea edulis* L. 249.  
*Ostrea folium* Lin. 249.  
*Ostrea Forskålii* Chemn. 250.  
*Ostrea frons* Lin. 249.  
*Ostrea gigas* Thunb. 249.  
*Ostrea glaucina* Lam. 249.  
*Ostrea hippopus* Lam. 249.  
*Ostrea hyotis* Lin. 250.  
*Ostrea imbricata* Lam. 250.  
*Ostra Japonica* Gmel. 243.  
*Ostrea Laperousii* Schrenck. 249.  
*Ostrea Lima* Lin. 244.  
*Ostrea malleus albus* Chemn. 230.  
*Ostrea Nilssoni* Br. 249.  
*Ostrea oblitterata* Lin. 243.  
*Ostrea parasitica* Gmel. 250.  
*Ostrea perna* Lin. 230.  
*Ostrea Pleuronectes* Lin. 243.  
*Ostrea plica* Lin. 242.  
*Ostrea plicata* Chemn. 249.  
*Ostrea plicata* Dfr. 249.  
*Ostrea plicata* Nilsson. 249.  
*Ostrea plicatula* Gmel. 249.  
*Ostrea regula* Forskål. 231.



*Ostrea rivularis* Gould. 250.  
*Ostrea squamata* Gmel. 240.  
*Ostrea Talienwhanensis* Crosse. 249.  
*Ostrea vitrea* Gmel. 242.  
*Ovula hordacea* Lam. 102.  
*Ovula oviformis* Lam. 101.  
*Ovula triticea* Lam. 101.  
*Ovula volva* Lam. 102.  
*Ovulum formosum* Sow. 101.  
*Ovulum hordaceum* Sow. 102.  
*Ovulum Philippinarum* Sow. 102.  
*Ovulum triticeum* Sow. 101.  
*Oxystele Koeneni* Dkr. 142.  
*Oxystele tabularis* Krauss. 142.  
*Pachypoma rhodostoma* Lam. 130.  
*Pallium vitreum* Chemn. 242.  
*Panopaea fragilis* Gould. 176.  
*Panopaea generosa* Gould. 176.  
*Panopaea Japonica* A. Ad. 176.  
*Panopaea plicata* Mont. 176. 261.  
*Paphia striata* Chemn. 195.  
*Papilla seu rama felis* Chemn. 63.  
*Parapholas penita* Conr. 171.  
*Parapholas piriformis* Dkr. 171.  
*Parmaphorus corrugatus* Rve. 152.  
*Parthenia bellula* A. Ad. 85.  
*Parthenia coelata* A. Ad. 84.  
*Parthenia costellata* A. Ad. 85.  
*Parthenia costulata* Dkr. 84.  
*Parthenia diadema* A. Ad. 84.  
*Parthenia fenestrata* A. Ad. 84.  
*Parthenia foveolata* A. Ad. 84.  
*Parthenia litoralis* A. Ad. 85.  
*Parthenia Mariella* A. Ad. 84.  
*Parthenia monocycla* A. Ad. 84.  
*Parthenia mundula* A. Ad. 85.  
*Parthenia pagodula* A. Ad. 84.  
*Parthenia punctigera* A. Ad. 85.  
*Parthenia spirata* A. Ad. 84.  
*Patella aculeata* Gmel. 124.  
*Patella aeruginosa* Midd. 155.  
*Patella amussitata* Rve. 156.

*Patella argentata* Sow. 156.  
*Patella australis* Lam. 125.  
*Patella caeca* Müll. 155.  
*Patella candida* Couth. 155.  
*Patella cerea* Möll. 155.  
*Patella clypeaster* Lesson. 156.  
*Patella conulus* Dkr. 154.  
*Patella elegans* Phil. 155.  
*Patella exarata* Nuttall. 157.  
*Patella fissura* Lin. 152.  
*Patella fornicata aculeata* Chemn. 124.  
*Patella grano-striata* Rve. 155.  
*Patella grano-striata* Schrenck. 155.  
*Patella Heroldi* Dkr. 154.  
*Patella indica* Mart. 156.  
*Patella Lamanonii* Schrenck. 156.  
*Patella lanx* Rve. 155.  
*Patella lutea* Lin. 146.  
*Patella Luzonica* Rve. 156.  
*Patella macroschisma* Chemn. 150.  
*Patella Mazatlanica* Gray. 157.  
*Patella nigro-lineata* Rve. 155.  
*Patella noachina* Lin. 151.  
*Patella pallida* Gould. 156.  
*Patella patina* Midd. 154.  
*Patella pentagona* Born. 156.  
*Patella piperata* Gould. 156.  
*Patella pygmaea* Dkr. 154.  
*Patella rustica* Lin. 156.  
*Patella saccharina* Lin. 155.  
*Patella scapula* Mart. 168.  
*Patella stellaeformis* Rve. 156.  
*Patella testudinaria* Lin. 156.  
*Patella toreuma* Rve. 156.  
*Patella tricostata* Chemn. 125.  
*Patella verriculata* Rve. 154.  
*Patelloida stellaris* Q. et G. 155.  
*Pecten Antonii* Phil. 243.  
*Pecten asperulatus* Ad. et Rve. 243.  
*Pecten Brandtii* Schrenck. 242.  
*Pecten crassicostatus* Sow. 239.  
*Pecten excavatus* Anton. 243.

- Pecten inaequalis* Sow. 244.  
*Pecten irregularis* Sow. 240.  
*Pecten Islandicus* Müller. 242.  
*Pecten Jickelii* Dkr. 241.  
*Pecten laetus* Gould. 241.  
*Pecten laqueatus* Sow. 243.  
*Pecten limatula* Rve. 240.  
*Pecten lividus* Lam. 240.  
*Pecten mollitus* Rve. 263.  
*Pecten nobilis* Rve. 240.  
*Pecten plica* Lin. 242.  
*Pecten punctulatus* Dkr. 244.  
*Pecten quadriliratus* Lischke 240.  
*Pecten similis* Lask. 240.  
*Pecten Sinensis* Sow. 243.  
*Pecten spectabilis* Rve. 241.  
*Pecten squamatus* Gmel. 240.  
*Pecten subplicatus* Sow. 242.  
*Pecten Swiftii* Bernardi. 242.  
*Pecten Tissoti* Bernardi. 241.  
*Pecten trifidus* Dkr. 241.  
*Pecten ventricosus* Sow. 241.  
*Pecten vesiculosus* Dkr. 241.  
*Pecten vitreus* Chemn. 242.  
*Pecten Yessoënsis* Jay. 242.  
*Pectunculus albo-lineatus* Lischke.  
     236.  
*Pectunculus flammeus* Rve. 236.  
*Pectunculus fulguratus* Dkr. 236.  
*Pectunculus glycimeris* Lin. 237.  
*Pectunculus intermedius* Brod. 237.  
*Pectunculus rotundus* Dkr. 236.  
*Pectunculus vestitus* Dkr. 236.  
*Perna Linnaei* Pfr. 230.  
*Persicula grisea* Jous. 57.  
*Petricola Japonica* Dkr. 209.  
*Phasianella variegata* Lam. 127.  
*Philina Coreanica* A. Ad. 168.  
*Philina crenata* A. Ad. 168.  
*Philina Japonica* Lischke. 168.  
*Philina scalpta* A. Ad. 167.  
*Philina striolata* A. Ad. 168.  
*Pholas concamerata* Desh. 171.  
*Pholas crispata* Lin. 170.  
*Pholas fragilis* Sow. 170.  
*Pholas penita* Desh. 171.  
*Pholas pusilla* Lin. 171.  
*Pholas quadrizonalis* Spengl. 171.  
*Pholas striata* Lin. 171.  
*Phorus exutus* Rve. 123.  
*Phorus pallidulus* Rve. 123.  
*Phorus solarioides* Rve. 123.  
*Phos senticosus* Lin. 34.  
*Phos varicosus* Gould. 34.  
*Photinula quaesita* A. Ad. 142.  
*Photinula zonata* Wood. 142.  
*Phyllonotus acanthophorus* A. Ad. 7.  
*Phyllonotus coronatus* A. Ad. 7.  
*Phyllonotus unifasciatus* A. Ad. 7.  
*Phyllonotus Yoldii* Mörch. 255.  
*Pileopsis dilatata* Lam. 258.  
*Pilidium commodum* Midd. 124.  
*Piliscus probus* Lovén. 124.  
*Pinna bicolor* Chemn. 231.  
*Pinna Chemnitzii* Hanl. 231.  
*Pinna dolabrata* Lam. 231.  
*Pinna fimbriatula* Rve. 231.  
*Pinna Japonica* Rve. 231.  
*Pinna lingulata* Lin. 228.  
*Pinna succata* Lin. 231.  
*Pirula ficoides* Lam. 59.  
*Pirula reticulata* Lam. 59.  
*Placenta orbicularis* Retz. 248.  
*Placenta orbicularis* Woodw. 248.  
*Placuna placenta* Lam. 248.  
*Placunanomia macroschisma* Desh. 248.  
*Placunanomia umbonata* Gould. 248.  
*Planaxis pyramidalis* Gmel. 115.  
*Pleurotoma albicarinata* Sow. 21.  
*Pleurotoma consimilis* Smith. 22.  
*Pleurotoma contracta* Rve. 24.  
*Pleurotoma Coreanica* Ad. et Rve. 21.  
*Pleurotoma crassilabrum* Rve. 25.  
*Pleurotoma crispa* Kien. 20.

*Pleurotoma declivis* Martens. 21.  
*Pleurotoma difficilis* Smith. 21.  
*Pleurotoma erosa* Schrenck. 25.  
*Pleurotoma flavidula* Lam. 22.  
*Pleurotoma fragilis* Rve. 26.  
*Pleurotoma fusca* Homb. et Jacq. 21.  
*Pleurotoma fusoides* Rve. 24.  
*Pleurotoma gracilenta* Rve. 24.  
*Pleurotoma grandis* Gray. 20.  
*Pleurotoma Guarani* Orb. 27.  
*Pleurotoma hastula* Rve. 20.  
*Pleurotoma interrupta* Lam. 22.  
*Pleurotoma Kaderleyi* Lischke. 21.  
*Pleurotoma lactea* Rve. 26.  
*Pleurotoma lanceolata* Rve. 22.  
*Pleurotoma Lühdorfi* Lischke. 21.  
*Pleurotoma lymnaeaeformis* Rve. 26.  
*Pleurotoma marmorata* Lam. 20.  
*Pleurotoma Niponica* Smith. 21.  
*Pleurotoma obliquata* Rve. 23.  
*Pleurotoma octangulata* Dkr. 24.  
*Pleurotoma oxytropis* Sow. 21.  
*Pleurotoma patruelis* Smith 22.  
*Pleurotoma saturata* Rve. 26.  
*Pleurotoma Sinensis* Rve. 22.  
*Pleurotoma striata* Kien. 23.  
*Pleurotoma triporcata* Smith. 22.  
*Pleurotoma tuberculata* Gray. 20.  
*Pleurotoma unedo* Val. 21.  
*Pleurotoma variegata* Kien. 20.  
*Pleurotoma vertebrata* Smith. 21.  
*Pleurotomaria Beyrichii* Hilgendorf.  
 259.  
*Pleurotomaria concava* Desh. 260.  
*Pleurotomaria concava* Münst. 260.  
*Plicatula cuneata* Dkr. 246.  
*Plicatula horrida* Dkr. 247.  
*Plicatula imbricata* Koch et Dkr. 247.  
*Plicatula irregularis* Dkr. 247. 261.  
*Plicatula muricata* A. Ad. 247.  
*Plicatula rugosa* Dkr. 247. 261.  
*Plicatula simplex* Gould. 247.  
 Dunker, Moll. Jap. mar.

*Pollia Capensis* Dkr. 19.  
*Pollia contracta* Rve. 18.  
*Pollia Cumingiana* Dkr. 18.  
*Pollia lineolata* Dkr. 19.  
*Pollia marmorata* Rve. 19.  
*Pollia Menkeana* Dkr. 18.  
*Pollia Proteus* Rve. 18.  
*Pollia subrubiginosa* Smith. 19.  
*Polydonta chloromphalus* A. Ad. 138.  
*Polydonta maculata* Lin. 139.  
*Polydonta rota* Dkr. 138.  
*Polydonta Spengleri* Chemn. 139.  
*Polydonta squarrosa* Lam. 138.  
*Pomaulax Japonicus* Dkr. 130.  
*Porcellana guttata* Rumph. 99.  
*Porcellana salita* Rumph. 99.  
*Poromya nitida* Ad. et Rve. 181.  
*Poromya pulchella* Ad. et Rve. 185. 261.  
*Potamomya labiata* Hinds. 177.  
*Psammobia bipartita* Phil. 186.  
*Psammobia coerulescens* Lam. 186.  
*Psammobia corrugata* Desh. 187.  
*Psammobia decora* Hinds. 188.  
*Psammobia Galatea* Lam. 189.  
*Psammobia occidens* Chemn. 186.  
*Psammobia olivacea* Jay. 188.  
*Psammobia oriens* Desh. 186.  
*Psammobia ornata* Desh. 186.  
*Psammobia radiata* Desh. 187.  
*Psammobia rostrata* Desh. 187.  
*Psammobia violacea* Desh. 187.  
*Pterocera chiragra* Lin. 96.  
*Pterocera lambis* Lin. 96.  
*Pterocera millepeda* Lam. 96.  
*Pterocera millepeda* Lin. 96.  
*Pterocera radix bryoniae* Chemn. 96.  
*Pterocera truncata* Lam. 96.  
*Pteronotus Gouldii* A. Ad. 6.  
*Pteronotus Stimpsoni* A. Ad. 6.  
*Pullastra exarata* Phil 206.  
*Pullastra vernicosa* Gould. 206.  
*Puncticulis pulicarius* Swains. 92.  
 37

*Puncturella noachina* Lin. 151.  
*Purpura alveolata* Rve. 40.  
*Purpura analoga* Forb. 40.  
*Purpura atro-marginata* Blain. 39.  
*Purpura attenuata* Rve. 40.  
*Purpura bizonalis* Lam. 40.  
*Purpura Bronni* Dkr. 39.  
*Purpura cancellata* Kien. 39.  
*Purpura clavigera* Küst. 40.  
*Purpura costata* Sow. 113.  
*Purpura costularis* Blainv. 44.  
*Purpura crispata* Chemn. 40.  
*Purpura decemcostata* Midd. 40.  
*Purpura echinata* Blain. 39.  
*Purpura fimbriata* Lam. 40.  
*Purpura fiscella* Kien. 41.  
*Purpura foliata* Martyn. 7.  
*Purpura Freycineti* Desh. 40.  
*Purpura granulata* Ducl. 41.  
*Purpura haemastoma* Lin. 39.  
*Purpura Heyseana* Dkr. 40.  
*Purpura imbricata* Lam. 40.  
*Purpura Lapillus* Lin. 40.  
*Purpura luteostoma* Chemn. 39.  
*Purpura madreporarum* Sow. 44.  
*Purpura marginatra* Blainv. 39.  
*Purpura monodonta* Q. et G. 44.  
*Purpura morus* var. Kien. 41.  
*Purpura musiva* Kien. 41.  
*Purpura Rudolphi* Chemn. 39.  
*Purpura rustica* Lam. 39.  
*Purpura sertum* Lam. 40.  
*Purpura squamosa* Lam. 40.  
*Purpura tumulosa* Rve. 39.  
*Purpura undata* Lam. 39.  
*Pusia aemula* Smith. 53.  
*Pusia inermis* Rve. 53.  
*Pusiostoma mendicarium* A. Ad. 56.  
*Pusiostoma trifasciatum* A. Ad. 56.  
*Putilla lucida* A. Ad. 262.  
*Pyramidella gracilis* A. Ad. 78.  
*Pyramidella pulchella* Rve. 74.

*Pyramidella subulata* A. Ad. 78.  
*Pyrene flava* Brug. 55.  
*Pyrene discors* Gmel. 55.  
*Pyrene undata* Duclos. 55.  
*Pyrula bezoar* var. 42.  
*Pyrula de Burghiae* Rve. 43.  
*Pyrula Mawae* Rve. 42.  
*Pyrula papyracea* Lam. 45.  
*Pyrula rapa* Lam. 42.  
*Pyrula tuba* Lam. 15.  
*Radius Adamsii* Dkr. 102.  
*Radius Carpenteri* Dkr. 102.  
*Radius Philippinarum* Sow. 102.  
*Radius roseus* A. Ad. 102.  
*Radius textoris* Argenv. 102.  
*Radius volva* Lin. 102.  
*Raëta pellicula* Desh. 185.  
*Raëta pulchella* Ad. et Rve. 185. 261.  
*Raëta rostralis* Desh. 185. 261.  
*Ranella albivaricosa* Rve. 31.  
*Ranella Beckii* Kien. 31.  
*Ranella bufo* Chemn. 31.  
*Ranella granifera* Lam. 31.  
*Ranella lamellosa* Dkr. 32.  
*Ranella olivator* Meusch. 31.  
*Ranella perca* Perry. 32.  
*Ranella pulchra* Sow. 32.  
*Ranella rana* Lin. 31.  
*Ranella subgranosa* Beck. 31.  
*Ranella tuberculata* Brod. 31.  
*Rapa crassa* Mart. 42.  
*Rapa tenuis* Mart. 45.  
*Rapana bezoar* Lin. 42.  
*Rapana bulbosa* Sol. 42.  
*Rapana de Burghiae* Rve. 43.  
*Rapana foliacea* Schum. 42.  
*Rapana Japonica* Dkr. 43.  
*Rapana Lischkeana* Dkr. 43.  
*Rapana Mawae* Gray. 42.  
*Rapana Thomasiana* Crosse. 42.  
*Rhinomya rugata* A. Ad. 180.  
*Rhinomya Philippinensis* Hinds. 180.

*Rhizochilus de Burghiae* Rve. 43.  
*Rhynchonella lucida* Gould. 253.  
*Rhynchonella psittacea* Gmel. 253.  
*Ricinula acuminata* Rve. 56.  
*Ricinula albolabris* Blainv. 41.  
*Ricinula arachnoides* Lam. 41.  
*Ricinula aspera* Lam. 41.  
*Ricinula concinna* Rve. 18.  
*Ricinula fuscillum* Rve. 41.  
*Ricinula mendicaria* Rve. 56.  
*Ricinula ricinus* Lin. 41.  
*Ricinula siderea* Rve. 42.  
*Ricinula trifasciata* Rve. 56.  
*Ricinula tuberculata* Blainv. 4.  
*Ringicula arctata* Gould. 58.  
*Ringicula doliaris* Gould. 58.  
*Rissoa bella* A. Ad. 120.  
*Rissoa canaliculata* Schwarz. 117.  
*Rissoa miranda* A. Ad. 117.  
*Rissoa pulcherrima* Jeffer. 121.  
*Rissoa pupaeformis* A. Ad. 117.  
*Rissoa pupiformis* A. Ad. 77.  
*Rissoella fulgida* A. Ad. 117.  
*Rissoella hydrophana* A. Ad. 117.  
*Rissoella minima* A. Ad. 117.  
*Rissoella mundula* A. Ad. 117.  
*Rissoella omphalotropis* A. Ad. 116.  
*Rissoella spiralis* A. Ad. 117.  
*Rissoella turgidula* A. Ad. 116.  
*Rissoella vesicalis* A. Ad. 116.  
*Rissoella vitrina* A. Ad. 116.  
*Rissoina annulata* Dkr. 120.  
*Rissoina cancellata* Phil. 117.  
*Rissoina concinna* A. Ad. 118.  
*Rissoina costulata* Dkr. 118.  
*Rissoina miranda* A. Ad. 118.  
*Rissoina nitida* A. Ad. 118.  
*Rissoina Sagrayana* Orb. 118.  
*Rissoina striolata* A. Ad. 117.  
*Rostellaria Powisii* Petit. 97.  
*Rotella aucta* Sow. 134.  
*Rotella costata* Val. 134.

*Rotella gigantea* Kien. 134.  
*Rotella Javanica* Lam. 135.  
*Rotella lineolata* Lam. 135.  
*Rotella monilifera* Lam. 135.  
*Rotella rosea* Lam. 135.  
*Rotella superba* Gould. 134.  
*Roxania punctulata* A. Ad. 167.  
*Ruma simiae* Chemn. 62.  
*Rupellaria carditoides* Lam. 209.  
*Rupellaria exotica* Lam. 209.  
*Rupellaria insignis* Desh. 209.  
*Rupellaria Irus* Lin. 208.  
*Rupellaria macrophylla* Desh. 209.  
*Rupellaria monstrosa* Chemn. 208.  
*Rupellaria semipurpurea* Dkr. 208.  
*Sanguinolaria iridescens* Bens. 191.  
*Sanguinolaria Nuttallii* Conr. 188.  
*Sanguinolaria occidens* Blainv. 186.  
*Sao elliptica* A. Ad. 167.  
*Sao folliculus* A. Ad. 167.  
*Sao phiala* A. Ad. 167.  
*Sarepta speciosa* A. Ad. 239.  
*Saxicava arctica* Lin. 175.  
*Saxidomus arata* Gould. 208.  
*Saxidomus Nuttallii* Conr. 208.  
*Saxidomus purpuratus* Sow. 203.  
*Scala elegantula* A. Ad. 68.  
*Scala fimbriata* A. Ad. 68.  
*Scala irregularis* Sow. 68.  
*Scala liliputana* A. Ad. 68.  
*Scala optabilis* A. Ad. 68.  
*Scala praeclara* A. Ad. 68.  
*Scala rubrolineata* Sow. 67.  
*Scala soluta* A. Ad. 68.  
*Scala spiralis* A. Ad. 68.  
*Scala trabeculata* A. Ad. 68.  
*Scala turricula* Sow. 68.  
*Scalaria aculeata* Sow. 66.  
*Scalaria acuminata* Sow. 67.  
*Scalaria angusta* Dkr. 67.  
*Scalaria aurita* Sow. 67.  
*Scalaria bicarinata* Sow. 69.

- Scalaria crassilabris* Sow. 69.  
*Scalaria decussata* Sow. 69.  
*Scalaria elegantula* A. Ad. 68.  
*Scalaria Elenensis* Sow. 68.  
*Scalaria exquisita* A. Ad. 68.  
*Scalaria ferruginea* Mörch. 66.  
*Scalaria fimbriata* A. Ad. 68.  
*Scalaria hexagona* Sow. 68.  
*Scalaria hyalina* Hinds. 68.  
*Scalaria immaculata* Sow. 67.  
*Scalaria irregularis* Sow. 68.  
*Scalaria Japonica* Dkr. 67.  
*Scalaria laxata* Sow. 68.  
*Scalaria liliputana* A. Ad. 68.  
*Scalaria lineolata* Sow. 67.  
*Scalaria lyra* Sow. 67.  
*Scalaria magnifica* Sow. 69.  
*Scalaria muricata* Kien. 66.  
*Scalaria Nicobarica* Beck. 66.  
*Scalaria obliqua* Sow. 66.  
*Scalaria Ochotensis* Midd. 68.  
*Scalaria optabilis* A. Ad. 68.  
*Scalaria Pallasii* Kien. 66.  
*Scalaria praeclara* A. Ad. 68.  
*Scalaria pulcherrima* Sow. 67.  
*Scalaria replicata* Sow. 66.  
*Scalaria rubrolineata* Sow. 67.  
*Scalaria soluta* A. Ad. 68.  
*Scalaria spiralis* A. Ad. 68.  
*Scalaria sulcata* Sow. 69.  
*Scalaria suturalis* Hinds. 69.  
*Scalaria trabeculata* A. Ad. 68.  
*Scalaria turricula* Sow. 68.  
*Scalaria undulata* Sow. 69.  
*Scaliola arenosa* A. Ad. 121.  
*Scaliola bella* A. Ad. 121.  
*Scaliola glareosa* A. Ad. 121.  
*Scaliola gracilis* A. Ad. 121.  
*Scaphander Cumingii* A. Ad. 166.  
*Scaphander dilatatus* A. Ad. 166.  
*Scaphander elongatus* A. Ad. 166.  
*Scaphander Japonicus* A. Ad. 166.  
*Scaphander Sieboldii* A. Ad. 166.  
*Scaphander sulcatus* A. Ad. 166.  
*Scapharca ambigua* Rve. 234.  
*Scapharca inflata* Rve. 233. 261.  
*Scapharca Japonica* Rve. 234.  
*Scapharca Philippiana* Dkr. 235.  
*Scapharca Satowi* Dkr. 233.  
*Scapharca subcrenata* Lischke. 234.  
*Scapharca Troscheli* Dkr. 234.  
*Scissurella carinata* A. Ad. 147.  
*Scissurella miranda* A. Ad. 147.  
*Scissurella modesta* A. Ad. 147.  
*Scrobicularia adunca* Gould. 194.  
*Scutellina pulchella* Lischke. 155.  
*Scutus corrugatus* Rve. 152.  
*Seila cingulata* A. Ad. 91.  
*Seila dextroversa* Ad. et Rve. 91.  
*Semele Californica* A. Ad. 195.  
*Semele gratiosa* A. Ad. 194.  
*Semele Hanleyi* Angas. 195.  
*Semele Sinensis* A. Ad. 194.  
*Semele Zebuensis* Hanl. 194.  
*Separatista Blainvilleana* Pet. 44.  
*Separatista Chemnitzii* A. Ad. 44.  
*Sepiae* spec. indet. 1.  
*Sepiola Japonica* Orb. et Fér. 1.  
*Septifer bifurcatus* Conrd. 228.  
*Septifer bilocularis* Lin. 227.  
*Septifer crassus* Dkr. 227.  
*Septifer Herrmannseni* Dkr. 227.  
*Septifer virgatus* Wieg. 227.  
*Setia bifasciata* A. Ad. 121.  
*Setia candida* A. Ad. 121.  
*Setia tricineta* A. Ad. 121.  
*Sigaretus depressus* Phil. 63.  
*Sigaretus insculptus* Ad. et Rve. 63.  
*Sigaretus Japonicus* Lischke. 63.  
*Sigaretus Leachii* Blainv. 63.  
*Sigaretus undulatus* Lischke. 63.  
*Siliquaria constricta* Lam. 175.  
*Siliquarius Cumingii* Mörch. 122.  
*Sipho plicatus* A. Ad. 14.

- Siphonalia acuminata* A. Ad. 18.  
*Siphonalia cassidariaeformis* Rve. 16.  
*Siphonalia colus* A. Ad. 17.  
*Siphonalia commoda* A. Ad. 17.  
*Siphonalia concinna* A. Ad. 17.  
*Siphonalia conspersa* A. Ad. 17.  
*Siphonalia corrugata* A. Ad. 17.  
*Siphonalia filosa* A. Ad. 17.  
*Siphonalia fuscolineata* Pease. 17.  
*Siphonalia grisea* A. Ad. 17.  
*Siphonalia hinnulus* Ad. et Rve. 16.  
*Siphonalia ligata* A. Ad. 17.  
*Siphonalia longirostris* Dkr. 16.  
*Siphonalia modificata* Rve. 17.  
*Siphonalia munda* A. Ad. 18.  
*Siphonalia nodulosa* A. Ad. 18.  
*Siphonalia ornata* A. Ad. 16.  
*Siphonalia pyramis* A. Ad. 18.  
*Siphonalia signum* Rve. 15.  
*Siphonalia spadicea* Rve. 16.  
*Siphonalia trochulus* Rve. 16.  
*Siphonaria atra* Quoy. et Gaim. 169.  
*Siphonaria cochleariformis* Rve. 170.  
*Siphonaria Coreënsis* Ad. et Rve. 169.  
*Siphonaria sipho* Sow. 170.  
*Sistrum sidereum* A. Ad. 42.  
*Skenea cornuella* A. Ad. 132. 258.  
*Smaragdinella Sieboldi* A. Ad. 167.  
*Solarium dorsuosum* Hinds. 92.  
*Solarium formosum* Hinds. 92.  
*Solarium granulatum* Kien. 92.  
*Solarium perspectivum* Lin. 92.  
*Solarium quadriceps* Hinds. 92.  
*Solarium zonatum* Phil. 92.  
*Solemya pusilla* Gould. 261.  
*Solen constrictus* Lam. 175.  
*Solen corneus* Lam. 173.  
*Solen costatus* Say. 174.  
*Solen cultellus* Lin. 174.  
*Solen diphos* Lin. 187.  
*Solen diphos Chinensis* Chemn. 187.  
*Solen ex albido radiatus* Chemn. 190.  
*Solen Gouldii* Conr. 173.  
*Solen gracilis* Gould. 173.  
*Solen grandis* Dkr. 172.  
*Solen Krusensternii* Schrk. 173.  
*Solen linearis* Chemn. 172.  
*Solen minimus* Gmel. 175.  
*Solen minutus* Lin. 175.  
*Solen occidens* Chemn. 186.  
*Solen rostratus* Lam. 187.  
*Solen sicarius* Gould. 173.  
*Solen striatus* Gmel. 190.  
*Solen violaceus* Lam. 187.  
*Solenomya Japonica* Dkr. 220. 261.  
*Solenotellina atrata* Desh. 188.  
*Solenotellina Boeddinghausi* Lischke. 137.  
*Solenotellina Chinensis* Chemn. 187.  
*Solenotellina diphos* Lin. 187.  
*Solenotellina Japonica* Desh. 188.  
*Solenotellina moesta* Lischke. 188.  
*Solenotellina Nuttallii* Conr. 188.  
*Solenotellina olivacea* Jay. 188.  
*Solenotellina violacea* Lam. 187.  
*Soletellina Cumingiana* Desh. 187.  
*Soletellina radiata* Blainv. 187.  
*Soletellina truncata* Rve. 187.  
*Sphenia decurtata* A. Ad. 178.  
*Sphenia elliptica* A. Ad. 178.  
*Spirialis rostralis* Eyd. et Soul. 3.  
*Spisula Grayana* Schrenck. 184.  
*Spondylus armatus* Sow. 245.  
*Spondylus cruentus* Lischke. 246.  
*Spondylus imperialis* Chemn. 245.  
*Spondylus nudus* Chemn. 246.  
*Spondylus regius* Lin. 245.  
*Spondylus sanguineus* Dkr. 246.  
*Spondylus Sinensis* Sow. 245.  
*Spondylus spinosus* Sow. 245.  
*Stenotis laxata* A. Ad. 113.  
*Stiliola subulata* Orb. 2.  
*Stomatella articulata* A. Ad. 145.  
*Stomatella auricula* Lam. 146.

- Stomatella Japonica* A. Ad. 145.  
*Stomatella orbiculata* A. Ad. 145.  
*Stomatella planulata* Sow. 146.  
*Stomatella rubra* Lam. 146. ~  
*Stomatella splendidula* A. Ad. 145.  
*Stomatia australis* A. Ad. 146.  
*Stomatia obscurata* Lam. 146.  
*Stomatia phymotis* Helbl. 146.  
*Stomatia rubra* Lam. 146.  
*Stramonita haemastoma* H. et A. Ad. 39.  
*Stramonita hederacea* Schum. 40.  
*Strombus accinctus* Born. 95.  
*Strombus Bryonia* Gmel. 96.  
*Strombus chiragra* Lin. 96.  
*Strombus corrugatus* Ad. et Rve. 96. 262.  
*Strombus auris Dianae* Lin. 95.  
*Strombus floridus* Lam. 95.  
*Strombus flosculosus* Mart. 95.  
*Strombus guttatus* Mart. 95.  
*Strombus Isabella* Lam. 96.  
*Strombus Japonicus* Rve. 95.  
*Strombus lambis* Lin. 96.  
*Strombus latissimus* Lin. 95.  
*Strombus luhuanus* Lin. 96.  
*Strombus millepeda* Lin. 96.  
*Strombus pacificus* Swains. 95.  
*Strombus radix bryoniae* Chemn. 96.  
*Strombus rugosus* Sow. 96. 262.  
*Strombus succinctus* Lin. var. 95.  
*Strombus terebellum* Lin. 97.  
*Strombus urceus* Lin. 95.  
*Strombus vittatus* Lin. var. 95. 257.  
*Styliferina goniochila* A. Ad. 116.  
*Styliferina lepida* A. Ad. 116.  
*Styliferina orthochila* A. Ad. 116.  
*Stylopsis sulcata* A. Ad. 77.  
*Stylopsis typica* A. Ad. 77.  
*Styloptygma cereum* A. Ad. 77.  
*Styloptygma gibbum* A. Ad. 77.  
*Styloptygma larvula* A. Ad. 78.  
*Styloptygma lendix* A. Ad. 77.  
*Styloptygma pupiforme* A. Ad. 77.
- Styloptygma subuliforme* A. Ad. 78.  
*Styloptygma taeniatum* A. Ad. 77.  
*Sunetta excavata* Hanl. 201.  
*Surcula albicarinata* Sow. 21.  
*Surcula Kaderleyi* Lischke. 21.  
*Surcula tuberculata* Gray. 20.  
*Syrnola aciculata* A. Ad. 76.  
*Syrnola bizonalis* A. Ad. 76.  
*Syrnola brunnea* A. Ad. 76.  
*Syrnola buxea* Gould. 76.  
*Syrnola cinctella* A. Ad. 75.  
*Syrnola columella* A. Ad. 77.  
*Syrnola cylindrella* A. Ad. 77.  
*Syrnola daedala* A. Ad. 77.  
*Syrnola elegans* A. Ad. 76.  
*Syrnola gracillima* A. Ad. 75.  
*Syrnola lactea* A. Ad. 76.  
*Syrnola mera* A. Ad. 75.  
*Syrnola pistillum* A. Ad. 76.  
*Syrnola pupina* A. Ad. 76.  
*Syrnola pyramidalis* A. Ad. 76.  
*Syrnola serotina* A. Ad. 76.  
*Syrnola striatula* A. Ad. 76.  
*Syrnola subulina* A. Ad. 76.  
*Syrnola teretiuscula* A. Ad. 75.  
*Tapes amabilis* Phil. 206.  
*Tapes Bruguieri* Hanl. 208.  
*Tapes denticulatus* Sow. 207.  
*Tapes Deshayesii* Hanl. 206.  
*Tapes diversus* Sow. 208.  
*Tapes ducalis* Roem. 207.  
*Tapes euglyptus* Phil. 206.  
*Tapes exaratus* Phil. 206.  
*Tapes Greeffei* Dkr. 207.  
*Tapes inflatus* Desh. 207.  
*Tapes Japonicus* Desh. 207.  
*Tapes liratus* Phil. 206.  
*Tapes Philippinarum* A. Ad. et Rve. 207.  
*Tapes purpuratus* Sow. 208.  
*Tapes rimosa* Sow. 206.  
*Tapes Schnellianus* Dkr. 206.  
*Tapes semidecussatus* Desh. 207.



*Tapes semirugatus* Phil. 207.  
*Tapes sulcarius* Lam. 206.  
*Tapes textrix* Chemn. 206.  
*Tapes undulatus* Born. 206.  
*Tapes variegatus* Hanl. 207.  
*Tapes vernicosus* Gould. 206.  
*Tectura concinna* Lischke. 154.  
*Tectura digitalis* Eschsch. 154.  
*Tectura dorsuosa* Gould. 154.  
*Tectura Heroldi* Dkr. 154.  
*Tectura patina* Eschscholtz. 154.  
*Tectura Schrenckii* Lischke. 155.  
*Tectura testudinalis* Müll. 154.  
*Tectus pyramis* Born. 138.  
*Teinotis asinina* Lin. 149.  
*Teinostoma anomalum* H. et A. Ad. 136.  
*Teinostoma concentricum* A. Ad. 136.  
*Teinostoma lucidum* A. Ad. 136.  
*Teinostoma pusillum* H. et A. Ad. 136.  
*Teinostoma radiatum* A. Ad. 136.  
*Telasco luctuosa* H. et A. Ad. 36.  
*Tellimya Japonica* A. Ad. 219.  
*Tellina carnea* Phil. 191.  
*Tellina clathrata* Desh. 191.  
*Tellina compressissima* Rve. 191.  
*Tellina diaphana* Desh. 189.  
*Tellina divaricata* Chemn. 216.  
*Tellina edentula* Brod. et Sow. 192.  
*Tellina egregia* Desh. 189.  
*Tellina flexuosa* Mont. 218.  
*Tellina frigida* Hanl. 192.  
*Tellina Galatea* Lam. 189.  
*Tellina Gari* Lin. 186.  
*Tellina incongrua* Mart. 190.  
*Tellina inconspicua* Brod. et Sow. 190.  
*Tellina inquinata* Desh. 190.  
*Tellina iridella* Mart. 191.  
*Tellina iridescens* Benson. 191.  
*Tellina Japonica* Desh. 189 \*).

*Tellina Jedoënsis* Lischke. 190.  
*Tellina lata* Gmel. 192.  
*Tellina lenticularis* Sow. 192.  
*Tellina ligamentina* Desh. 189. 192.  
*Tellina lutea* Gray. 192.  
*Tellina minuta* Lischke. 191.  
*Tellina nasuta* Conr. 190.  
*Tellina nitidula* Dkr. 191.  
*Tellina nux* Hanl. 191.  
*Tellina ovalis* Sow. 190.  
*Tellina pallidula* Lischke. 191.  
*Tellina perna* Spengler. 189.  
*Tellina praetexta* Mart. 190.  
*Tellina pulcherrima* Sow. 189.  
*Tellina rhomboides* Q. et G. 191.  
*Tellina rostrata* Gmel. 189.  
*Tellina rutila* Dkr. 191.  
*Tellina secta* Conr. 189.  
*Tellina sericina* Jonas. 189.  
*Tellina solidula* Pulteney. 192.  
*Tellina tridentata* Ant. 190.  
*Tellina truncata* Jonas. 189.  
*Tellina venulosa* Schrenk. 192.  
*Tellina vulsella* Chemn. 189.  
*Tellinides ovalis* Sow. 190.  
*Tenagodus Cumingii* Mörch. 122.  
*Tenagodus lacteus* Lam. 122.  
*Terebellum punctatum* Klein. 97.  
*Terebellum subulatum* Lam. 97.  
*Terebra aciculata* Lam. 74.  
*Terebra albozonata* Smith. 73.  
*Terebra arguta* Gould. 74.  
*Terebra bifrons* Hinds. 72.  
*Terebra blanda* Desh. 74.  
*Terebra consobrina* Desh. 71.  
*Terebra Dillwyni* Desh. 74.  
*Terebra Dussumieri* Kien. 71.  
*Terebra evoluta* Desh. 71.  
*Terebra flammea* Lam. 71.

\*) Quae de *Tellina Japonica* p. 192 dixi, ad notam manu scriptam antea conceptam pertinent et falso interposita sunt, qua de causa delectantur.

- Terebra fulgurata* Phil. 74.  
*Terebra Gotoënsis* Smith. 73.  
*Terebra Jeffreysii* Smith. 73.  
*Terebra Lima* Desh. 72.  
*Terebra Lischkeana* Dkr. 71.  
*Terebra Loebbeckeana* Dkr. 72.  
*Terebra maculata* Lin. 70.  
*Terebra muscaria* Lam. 70.  
*Terebra pretiosa* Rve. 71.  
*Terebra serotina* Hinds. 73.  
*Terebra solida* Desh. 74.  
*Terebra strigilata* Lin. 71.  
*Terebra stylata* Hinds. 70. 262.  
*Terebra subtextilis* Smith. 73.  
*Terebra subulata* Lin. 71.  
*Terebra tantilla* Smith. 73.  
*Terebra textilis* Hinds. 73.  
*Terebra triseriata* Gray. 72.  
*Terebra tristis* Desh. 74.  
*Terebra torquata* Ad. et Rve. 73.  
*Terebra Verrauxii* Desh. 71.  
*Terebratella Coreanica* Ad. et Rve. 252.  
*Terebratella frontalis* Midd. 252.  
*Terebratella Mariae* A. Ad. 252.  
*Terebratella Spitzbergensis* Davids. 252.  
*Terebratula affinis* Calcara 251.  
*Terebratula angusta* A. Ad. et Rve. 251.  
*Terebratula Blanfordi* Dkr. 251.  
*Terebratula Coreanica* L. de Schrenck. 252.  
*Terebratula Davidsoni* A. Ad. 251.  
*Terebratula erythroleuca* Quoy. et Gaim. 253.  
*Terebratula frontalis* Midd. 252.  
*Terebratula Grayi* Davidson. 252.  
*Terebratula miniata* Gould. 252.  
*Terebratula minor* Phil. et Suess. 251.  
*Terebratula picta* Sow. 252.  
*Terebratula rubella* Sow. 252.  
*Terebratula sanguinea* Rve. 252.  
*Terebratula sanguinea* Sow. 253.  
*Terebratula vitrea* var. *minor* Phil. 251.  
*Terebratulina angusta* A. Ad. et Rve. 251.  
*Terebratulina caput serpentis* Lin. 251.  
*Terebratulina Japonica* Sow. 251.  
*Thalessa echinata* H. et A. Ad. 39.  
*Thatcheria mirabilis* Angas 15.  
*Thecodonta Sieboldii* A. Ad. 218.  
*Theora fragilis* A. Ad. 181.  
*Theora iridescens* Hinds. 181.  
*Theora lubrica* Gould. 181.  
*Theora nitida* Gould. 181.  
*Thylacodes ? imbricatus* Mörch. 122.  
*Tichogonia Kraussii* Küst. 227.  
*Tichogonia virgata* Wieg. 227.  
*Tichogonia Wiegmanni* Küst. 227.  
*Timoclea cardioides* Lam. 198.  
*Timoclea histrionica* Brod. et Sow. 198.  
*Tivella damaoides* Gray. 200.  
*Tivella radiata* Sow. 200.  
*Tonicia Brandtii* Midd. 158.  
*Tonicia Eschscholtzii* Midd. 158.  
*Tonicia Merckii* Midd. 158.  
*Tonicia Sitchensis* Midd. 158.  
*Tornatella strigosa* Lischke. 162.  
*Tornatina delicatula* A. Ad. 164.  
*Tornatina exilis* Dkr. 164.  
*Tornatina fusiformis* Ad. 165.  
*Tornatina pusilla* Pfr. 164.  
*Tornatina succincta* A. Ad. 164.  
*Tornatina truncata* Ad. 164. 165.  
*Tornatina voluta* Q. et G. 165.  
*Trapezium angulatum* Lam. 210.  
*Trapezium liratum* Rve. 210.  
*Trapezium rostratum* Lam. 210.  
*Trapezium vellicatum* Rve. 210.  
*Tresus Nuttallii* Conr. 184.  
*Trichotropis bicarinata* Brod. et Sow. 105.  
*Trichotropis Blainvilleana* Pet. 44.  
*Trichotropis borealis* Brod. et Sow. 105.  
*Trichotropis cedo nulli* A. Ad. 105.  
*Trichotropis inermis* Hinds. 105.

- Trichotropis insignis* Midd. 105.  
*Trichotropis quadricarinata* A. Ad. 106.  
*Trichotropis unicarinata* Sow. 105.  
*Tridacna squamosa* Lam. 215.  
*Triforis cingulata* Dkr. 109.  
*Triforis exilis* Dkr. 109.  
*Triforis fusca* Dkr. 109.  
*Triforis granulata* Ad. et Rve. 109.  
*Triforis tricineta* Dkr. 109.  
*Triforis violacea* Q. et G. 109.  
*Trigona damaoides* Gray. 200.  
*Trigonella Bonneau* Bern. 183.  
*Trigonella Crossei* Dkr. 183.  
*Trigonella lurida* Phil. 183.  
*Trigonella ornata* Gray. 182.  
*Trigonella Sachalinensis* Schrenck. 183.  
*Trigonella spectabilis* Lischke 182.  
*Trigonella straminea* Dkr. 183. 261.  
*Trigonella sulcataria* Desh. 182.  
*Trigonella veneriformis* Desh. 182.  
*Triumphalia Cumingii* Sow. 170.  
*Triptera columella* Rang. 2.  
*Tritia festiva* A. Ad. 37.  
*Triton clathratus* Lam. 30.  
*Triton Dunkeri* Lischke. 29.  
*Triton pilearis* Rve. 28.  
*Triton pyrum* Lam. 29.  
*Triton Sauliae* Rve. 27.  
*Triton succinctus* Lam. 28.  
*Triton variegatum* Lam. 27.  
*Tritonidea marmorata* Rve. 19.  
*Tritonidea subrubiginosa* Smith. 19.  
*Tritonium Adansoni* Dkr. 28. 256.  
*Tritonium Americanum* Orb. 28.  
*Tritonium aquatile* Rve. 28.  
*Tritonium arthriticum* Schrenck. 14.  
*Tritonium clandestinum* Chemn. 30.  
*Tritonium decipiens* Rve. 30.  
*Tritonium despectum* Müll. 14.  
*Tritonium dorsuosum* A. Ad. 29.  
*Tritonium Dunkeri* Lischke. 29.  
     Dunker, Moll. Jap. mar.  
*Tritonium Dunkeri* Schrenck. 19.  
*Tritonium exaratum* Rve. 29.  
*Tritonium fornicatum* Fabr. 14.  
*Tritonium glaciale* Müll. 33.  
*Tritonium labiosum* Wood. 29.  
*Tritonium lampas* Lin. 31.  
*Tritonium lirostoma* A. Ad. 28.  
*Tritonium Loebbeckei* Lischke. 29.  
*Tritonium lotorium* Lin. 29.  
*Tritonium marmoratum* Schrenck. 19.  
*Tritonium moritinctum* Rve. 30.  
*Tritonium nobile* Conr. 28.  
*Tritonium nodiferum* Lam. 27.  
*Tritonium nodiliratum* A. Ad. 28.  
*Tritonium Oregonense* Redf. 30.  
*Tritonium papillosum* A. Ad. 28.  
*Tritonium Parthenopes* Salis. 28. 256.  
*Tritonium pericochlion* Schrenck. 15.  
*Tritonium pileare* Lin. 28.  
*Tritonium ranelloides* Rve. 31.  
*Tritonium reticosum* A. Ad. 30.  
*Tritonium reticulare* Lin. 30.  
*Tritonium rutilum* Mke. 29.  
*Tritonium spectrum* Schrenck. 12.  
*Tritonium submuricatum* Schrenck. 255.  
*Tritonium succinctum* Lam. 28. 256.  
*Tritonium tringa* A. Ad. 29.  
*Tritonium Tritonis* Rumph. 27.  
*Tritonium viridulum* O. Fabr. 104.  
*Trochus acutangulus* Chemn. 137.  
*Trochus Adamsianus* Schrenck. 141.  
*Trochus altus* Phil. 137.  
*Trochus Alwinæ* Lischke. 140. 259.  
*Trochus argenteo-nitens* Lischke. 140. 259.  
*Trochus argyrostoma* Gmel. 143.  
*Trochus brunneus* Phil. 143.  
*Trochus Carpenteri* Dkr. 143.  
*Trochus Cecillei* Phil. 140.  
*Trochus cicer* Mke. 144.  
*Trochus cingulatus* Mke. 142.  
*Trochus columellaris* Phil. 129.

*Trochus consors* Lischke. 140.  
*Trochus distinguendus* Dkr. 143.  
*Trochus elatus* Lam. 137.  
*Trochus globularius* Schrenck. 144.  
*Trochus Guildfordiae* Gray. 129.  
*Trochus haematragus* Mke. 129.  
*Trochus hilaris* Lischke. 141.  
*Trochus instrictus* Gould. 141.  
*Trochus iridescens* Schrenck. 137. 258.  
*Trochus janthinus* Chemn. 169.  
*Trochus Japonicus* Dkr. 130.  
*Trochus Jessoënsis* Schrenck. 141.  
*Trochus labeo australis* Dillw. 139.  
*Trochus labio* Lin. 139.  
*Trochus maculatus* Lin. 139.  
*Trochus marmoratus* Lam. 137.  
*Trochus Menkeanus* Phil. 142.  
*Trochus modestus* Rve. 130.  
*Trochus neritoides* Gmel. 139.  
*Trochus neritoides* Phil. 139.  
*Trochus nigerrimus* Gmel. 143.  
*Trochus nigricolor* Dkr. 143.  
*Trochus Niloticus* Lin. 137.  
*Trochus Nordmanni* Schrenck. 144.  
*Trochus obeliseus* Gmel. 138.  
*Trochus Ochotensis* Midd. in lit. 259.  
*Trochus ornatus* Rve. 140.  
*Trochus pauperculus* Lischke. 140.  
*Trochus perspectivus* Lin. 92.  
*Trochus Pfeifferi* Phil. 144.  
*Trochus pyramis* Born. 138.  
*Trochus rota* Dkr. 138.  
*Trochus rusticus* Gmel. 143.  
*Trochus Smithii* Gray. 139.  
*Trochus sordidus* Phil. 144.  
*Trochus Spengleri* Chemn. 139.  
*Trochus squarrosus* Lam. 138.  
*Trochus subfuscescens* Schrenck. 144.  
*Trochus triumphator* Martin. 129.  
*Trochus turris* Phil. 137.  
*Trochus unicus* Dkr. 140.  
*Trochus vestiarius* Lin. 135.

*Trochus virgatus* Gmel. 138.  
*Trochus vitiliginus* Mke. 144.  
*Trochus zizyphinus* Lin. 259.  
*Trochus zonatus* Krauss. 142.  
*Trochus zonatus* Wood. 142.  
*Trophon Birileffi* Lischke. 10.  
*Trophon candelabrum* Rve. 11.  
*Trophon cinereus* Say. 10.  
*Trophon clathratus* Lin. 9.  
*Trophon concinnus* A. Ad. 11.  
*Trophon crassus* A. Ad. 10.  
*Trophon crispus* Gould. 11.  
*Trophon fimbriatulus* A. Ad. 8.  
*Trophon fimbriatus* Hinds. 9.  
*Trophon Hanleyi* Angas. 10.  
*Trophon incomptus* Gould. 10.  
*Trophon liratus* Couth. 10.  
*Trophon luculentus* Rve. 9.  
*Trophon Orpheus* Gould. 11.  
*Trophon pachyrahaphe* Smith. 10.  
*Trophon tantillus* A. Ad. 11.  
*Tubiola cornuella* A. Ad. 132.  
*Tubiola nivea* Chemn. 132.  
*Tubiola nivea* A. Ad. 132.  
*Turbinella polygona* Lam. 48.  
*Turbinella rhodostoma* Dkr. 49.  
*Turbo breviculus* Phil. 111.  
*Turbo Californicus* Troschel. 136.  
*Turbo Coreensis* Recl. 128.  
*Turbo granulatus* Gmel. 128.  
*Turbo granulosus* Kien. 128.  
*Turbo Japonicus* Rve. 127.  
*Turbo lugubris* Rve. 128.  
*Turbo marmoratus* Lin. 128.  
*Turbo murreus* Rve. 136.  
*Turbo niveus* Chemn. 132.  
*Turbo olearius* Lin. 128.  
*Turbo petholatus* Lin. 128.  
*Turbo principalis* Pall. 66.  
*Turbo pusio* Anton. 136.  
*Turbo Reevei* Phil. 258.  
*Turbo Sangarensis* Schrenck. 129.

- Turbo sanguineus* Lin. 128.  
*Turbo separatista* Chemn. 44.  
*Turbo variabilis* Rve 128. 258.  
*Turbonilla bicincta* A. Ad. 79.  
*Turbonilla cineta* A. Ad. 79.  
*Turbonilla commoda* A. Ad. 79.  
*Turbonilla debilis* A. Ad. 79.  
*Turbonilla eximia* A. Ad. 79.  
*Turbonilla fragilis* A. Ad. 79.  
*Turbonilla macilenta* A. Ad. 79.  
*Turbonilla metulina* A. Ad. 80.  
*Turbonilla modica* A. Ad. 80.  
*Turbonilla monocycla* A. Ad. 79.  
*Turbonilla multigyrata* Dkr. 79.  
*Turbonilla munda* A. Ad. 79.  
*Turbonilla nitida* A. Ad. 79.  
*Turbonilla perfecta* A. Ad. 79.  
*Turbonilla Philippiana* Dkr. 78.  
*Turbonilla Scaliola* A. Ad. 80.  
*Turbonilla sculptilis* A. Ad. 79.  
*Turbonilla speciosa* A. Ad. 79.  
*Turbonilla varicosa* Dkr. 78. 257.  
*Turbonilla venustula* A. Ad. 79.  
*Turbonilla Weinkauffi* Dkr. 84.  
*Turcica concinna* A. Ad. 141.  
*Turcica Coreensis* Pease. 141.  
*Turcica imperialis* A. Ad. 141.  
*Turcica instricta* Gould. 141.  
*Turcica monilifera* A. Ad. 141.  
*Turcica stellata* A. Ad. 141.  
*Turris Chinensis* Chemn. 107.  
*Turritella cerea* Rve. 121. 263.  
*Turritella erosa* Couth. 121.  
*Turritella polaris* Bek. 121.  
*Tympanotonus fluviatilis* Pot. et Mich. 110.  
*Typhis arcuatus* Hinds. 9.  
*Typhis Japonica* A. Ad. 9.  
*Typhis Montforti* A. Ad. 9.  
*Uber Draparnaudii* Recl. 62.  
*Uber mamilla* Lin. 62.  
*Uber Powisianum* Recl. 62.  
*Umbonella murrea* Rve. 136.  
*Umbonium Adamsi* Dkr. 135.  
*Umbonium anguliferum* Phil. 135.  
*Umbonium costatum* Val. 134.  
*Umbonium giganteum* Less. 134.  
*Umbonium moniliferum* Lam. 135.  
*Umbonium superbum* Gould. 134.  
*Umbonium Thomasi* Crosse. 135.  
*Umbonium vestiarius* Lin. 135.  
*Umbrella Chinensis* Chemn. 168. 169.  
*Umbrella Indica* Lam. 168. 169.  
*Umbrella ovalis* Carp. 169. 260.  
*Urosalpinx innotabilis* Smith. 8.  
*Utriculus Cécillei* Phil. 164.  
*Uvanilla Heimburgi* Dkr. 130.  
*Velutina cryptospira* Midd. 59.  
*Velutina pusio* A. Ad. 59.  
*Venerupis carditoides* Lam. 209.  
*Venerupis decussata* Phil. 193.  
*Venerupis exotica* Lam. 209.  
*Venerupis insignis* Desh. 209.  
*Venerupis Irus* Lam. 208.  
*Venerupis macrophylla* Desh. 209.  
*Venus aequilatera* Sow. 199.  
*Venus amabilis* Phil. 206.  
*Venus asperrima* Sow. 198.  
*Venus astardoides* Beck. 198.  
*Venus Bruguieri* Hanl. 208.  
*Venus calophylla* Phil. 198.  
*Venus cancellata* var. Chemn. 196.  
*Venus cardioides* Lam. 198.  
*Venus castrensis* Lin. 202.  
*Venus Chinensis* Chemn. 200. 205.  
*Venus corbis* Lam. 196.  
*Venus crebrisulca* Sow. 196.  
*Venus crenifera* Sow. 197.  
*Venus decussata* var. Japonica Dkr. 207.  
*Venus discors* Spengl. 202.  
*Venus dispar* Chemn. 202.  
*Venus divaricata* Chemn. 202.  
*Venus donacina* Chemn. 199.  
*Venus edentula* Lin. 216.

- Venus elegantina* Lam. 198.  
*Venus euglypta* Phil. 206.  
*Venus foliacea* Phil. 198.  
*Venus gemma* Totten. 197.  
*Venus granulata* Gmel. 197.  
*Venus histrio* Gmel. 204.  
*Venus histrionica* Brod. et Sow. 198.  
*Venus hyalina* Phil. 205.  
*Venus Indica* Hanl. 207.  
*Venus intersecta* Sow. 197. 198.  
*Venus Japonica* Gmel. 198.  
*Venus Jedoënsis* Lischke. 196.  
*Venus Jukesii* Desh. 196.  
*Venus Labuana* Ad. et Rve. 198.  
*Venus Lamarkii* Gray. 196.  
*Venus lamellaris* Schum. 196.  
*Venus lirata* Phil. 206.  
*Venus literata* Chemn. 197.  
*Venus lusoria Japonica* Chemn. 198.  
*Venus marica* Lin. 197.  
*Venus meretrix* Lin. 199.  
*Venus monstrosa* Chemn. 208.  
*Venus papyracea* Gray. 205.  
*Venus Petitii* Desh. 208.  
*Venus Philippinarum* A. Ad. 207.  
*Venus Portesiana* d'Orb. 197.  
*Venus prostrata* Lin. 303.  
*Venus resticulata* Sow. 196.  
*Venus reticulata* var. Lam. 196.  
*Venus reticulata* Lin. 196.  
*Venus rimosa* Phil. 206.  
*Venus Roemeri* Dkr. 197.  
*Venus scripta* Lin. 201.  
*Venus semicancellata* Koch. 199.  
*Venus squamosa* Lin. 197.  
*Venus striata* Chemn. 197.  
*Venus subrostrata* Rve. 196.  
*Venus sulcaria* Lam. 206.  
*Venus tiara* var. Sow. 198.  
*Venus toreuma* Gould. 196.  
*Venus Totteni* Dkr. 197.  
*Venus undulata* Born. 206.  
*Vermetus imbricatus* Dkr. 122.  
*Vermetus nodoso-rugosus* Lischke. 122.  
*Vermetus Planorbis* Dkr. 122.  
*Vertagus aluco* Lin. 107.  
*Vertagus attenuatus* Phil. 107.  
*Vertagus Chinensis* Chemn. 107.  
*Vertagus fasciatus* Brug. 107.  
*Vertagus Guinaicus* H. et A. Ad. 106.  
*Vertagus Kochii* Phil. 108.  
*Vertagus Pfefferi* Dkr. 108. 257.  
*Verticordia Japonica* A. Ad. 214.  
*Verticordia multicostata* A. Ad. 214.  
*Vola excavata* Anton. 243.  
*Vola inaequivalvis* Sow. 244.  
*Vola laqueata* Sow. 243.  
*Vola puncticulata* Dkr. 244.  
*Volsella flavida* Dkr. 223.  
*Volsella Fortunei* Dkr. 224.  
*Volsella Japonica* Dkr. 224.  
*Voluta cassidula* Rve. 50.  
*Voluta concinna* Brod. 50.  
*Voluta crenulata* Chemn. 53.  
*Voluta cruentata* Chemn. 52.  
*Voluta discors* Gmel. 55.  
*Voluta fulgura* Martini 49.  
*Voluta fulminata* Lam. 49.  
*Voluta Hamillei* Crosse. 50.  
*Voluta jaspidea* Gmel. 46.  
*Voluta lyriformis* Kien. 49.  
*Voluta megaspira* Sow. 49.  
*Voluta mendicaria* Lin. 56.  
*Voluta nucleus* Lam. 50.  
*Voluta Prevostiana* Crosse. 49.  
*Voluta pusilla* Schrenck. 50.  
*Voluta ruprestris* Gmel. 49.  
*Voluta scutulata* Chemn. 52.  
*Voluta tigrina* Schröt. 46.  
*Voluta vespertilio* Lin. 50.  
*Volutharpa ampullacea* Midd. 33.  
*Volutharpa Deshayesiana* Fischer 33.  
*Volutharpa Fischeriana* A. Ad. 33.

Volutharpa Linnaeana A. Ad. 33.  
Volutharpa Mörchiana Fischer. 33.  
Volutharpa Perryi Jay. 33.  
Volutomitra pusilla Schrenck. 50.  
Volva Adamsii Dkr. 102.  
Volva Carpenteri Dkr. 102.  
Volva rosea A. Ad. 102.  
Volvula attenuata A. Ad. 165.  
Volvula cylindrella A. Ad. 165.  
Volvula eburnea A. Ad. 165.  
Volvula mucronata Phil. 165.  
Volvula opalina A. Ad. 165.  
Volvula ovulina A. Ad. 165.  
Volvula radiola A. Ad. 165.  
Volvula rostrata A. Ad. 165.  
Volvula spectabilis A. Ad. 165.  
Vulsella lingulata Lin. 228.  
Vulsella minor Chemn. 228.  
Vulsella rugosa Lam. 228.  
Vulsella spongiarum Lam. 228.  
Waldheimia cranium A. Ad. 252.  
Waldheimia Grayi Davidson. 252.  
Waldheimia picta A. Ad. 252.  
Waldheimia picta Chemn. 252.

Waldheimia Raphaelis Dall. 251.  
Xenophora exuta Rve. 123.  
Xenophora pallidula Rve. 123.  
Xenophora solarioides Rve. 123.  
Yoldia amygdalea Valenc. 239.  
Yoldia arctica Brod. et Sow. 239.  
Yoldia Japonica Ad. et Rve. 239.  
Yoldia pygmaea Münst. 239.  
Zafra mitraeformis A. Ad. 26.  
Zaphra subvitrea Smith. 55.  
Zeidora calceolina A. Ad. 151.  
Zeidora reticulata A. Ad. 151.  
Zeuxis clandestina A. Ad. 38.  
Zeuxis micans A. Ad. 38.  
Zeuxis succincta H. et A. Ad. 37.  
Zeuxis varicifera A. Ad. 38.  
Zirphaea crispata Lin. 170.  
Zizyphinus consors Lischke. 140.  
Zizyphinus hilaris Lischke. 141.  
Zizyphinus Japonicus A. Ad. 141.  
Zizyphinus Jessoënsis Schrenck. 141.  
Zizyphinus jucundus Sow. 140. 259.  
Zizyphinus unicus Dkr. 140.








## Tabula I.

- Fig. 1. 2. *Rapana Lischkeana* Dkr. pag. 43.  
Fig. 3. 4. *Trophon luculentus* Reeve. pag. 9.  
Fig. 5. 6. 7. *Rapana de Burghiae* Reeve. pag. 43.  
Fig. 8. 9. 10. *Fusus pagoda* Lesson. pag. 13.  
Fig. 11. 12. *Trichotropis unicarinata* Sowerby. pag. 105.  
Fig. 13. 14. *Siphonalia longirostris* Dkr. pag. 16.
-

Tab. I.




Ex offic. lithogr. Theodori Fischer.





## Tabula II.

- Fig. 1. 2. *Separatista Chemnitzii* A. Adams. pag. 44.  
Fig. 3. *Murex rota* Sowerby var. pag. 5.  
Fig. 4. 5. *Conus pauperculus* Sowerby. pag. 94.  
Fig. 6. 7. *Mitra Hanleyana* Dkr. pag. 51.  
Fig. 8. 9. *Actaeon Dianae* A. Adams. pag. 160. 260.  
Fig. 10. 11. *Lyria cassidula* Reeve. pag. 50.  
Fig. 12. 13. *varietas ejusdem*.  
Fig. 14. 15. 16. *Hydatina inflata* Dkr. pag. 162.
-










### Tabula III.


- Fig. 1. 2. *Neptunea plicata* A. Adams. pag. 14.  
Fig. 3. 4. *Neptunea lurida* A. Adams. pag. 14.  
Fig. 5. 6. 7. 8. *Euthria viridula* Dkr. varr. pag. 19. 255.  
Fig. 9. 10. *Siphonalia signum* Reeve var. pag. 15.  
Fig. 11. 12. *Fusus lacteus* Dkr. pag. 12.
-

Tab. III.



Ex offic. lithogr. Theodori Fischer






## Tabula IV.

- Fig. 1. 2. *Murex pliciferus* Sowerby. pag. 4.  
Fig. 3. 4. *Amycla Burchardi* Dkr. pag. 55.  
Fig. 5. 6. 7. *Drillia subauriformis* Smith var. pag. 24.  
Fig. 8. 9. *Cerithium Kobelti* Dkr. pag. 106.  
Fig. 10. 11. *Murex foliatus* Martyn var. pag. 7.  
Fig. 12. 13. 14. *Vertagus Pfefferi* Dkr. pag. 108.  
Fig. 15. 16. *Neverita Reiniana* Dkr. pag. 62.
-

Tab. IV.



Ex offic lithogr. Theodori Fischer.








## Tabula V.

- Fig. 1. Dentalium Weinkauffi Dkr. pag. 153.  
Fig. 2. Dentalium Japonicum Dkr. pag. 153.  
Fig. 3. 4. Ranella bufo Chemn. var. pag. 31.  
Fig. 5. 6. Mitra Bronnii Dkr. pag. 52.  
Fig. 7. 8. Lampania aterrima Dkr. pag. 109.  
Fig. 9. 10. Mitra salmonea Sowerby var. pag. 256.  
Fig. 11. 12. Mitra Kraussii Dkr. pag. 53.  
Fig. 13. 14. 15. 16. Terebra Lischkeana Dkr. pag. 71.  
Fig. 17. 18. Terebra Loebeckeana Dkr. pag. 72.  
Fig. 19. 20. Terebra triseriata Gray. pag. 72.
-



Ex offic lithogr. Theodori Fischer.





## Tabula VI.

- Fig. 1. 2. *Calyptraea grandis* Middend. pag. 123.  
Fig. 3. 4. 5. *Umbonium Adamsi* Dkr. pag. 135.  
Fig. 6. 7. *Uvanilla Heimburgi* Dkr. pag. 130.  
Fig. 8. 9. 10. *Haliotis exigua* Dkr. pag. 148.  
Fig. 11. 12. 13. *Stomatia rubra* Lamarck var. pag. 146.  
Fig. 14. 15. *Lucapina Sieboldii* Reeve var. pag. 149.  
Fig. 16. 17. 18. 19. *Euchelus Smithi* Dkr. pag. 259.  
Fig. 20. 21. *Leptoconchus rostratus* A. Adams. pag. 45.  
Fig. 22. 23. *Monodonta neritoides* Philippi. pag. 140.  
Fig. 24. 25. *Cancellaria nodulifera* Sowerby. pag. 103.
-










## Tabula VII.

- Fig. 1. 2. 3. 4. *Trigonella Crossei* Dkr. varr. pag. 183.  
Fig. 5. 6. *Trigonella straminea* Dkr. pag. 183.  
Fig. 7. 8. 9. 10. *Donacilla picta* Dkr. varr. pag. 195.  
Fig. 11. 12. *Myodora triangularis* A. Adams. pag. 181.  
Fig. 13. *Lyonsia praetenuis* Dkr. pag. 180.  
Fig. 14. 15. 16. *Donax semigranosus* Dkr. pag. 193.  
Fig. 17. 18. 19. *Cryptomia elliptica* A. Adams. pag. 178.  
Fig. 20. 21. 22. *Theora lubrica* Gould. pag. 181.  
Fig. 23. *Ensiculus Philippii* Dkr. pag. 174.  
Fig. 24. *Ensiculus marmoratus* Dkr. pag. 174.  
Fig. 25. *Siliquaria constricta* Lamarek. pag. 175.  
Fig. 26. *Macha divaricata* Lischke. pag. 175.
-

Tab. VII.



Ex offic. lithogr. Theodori Fischer






## Tabula VIII.

- Fig. 1. 2. 3. *Cardilia semisulcata* Lamarck. pag. 213.  
Fig. 4. 5. 6. *Dosinia gibba* A. Adams. pag. 204.  
Fig. 7. 8. *Lucina edentula* Lin. testa junior. pag. 216.  
Fig. 9. 10. 11. *Lucina corrugata* Dkr. pag. 216.  
Fig. 12. 13. 14. *Dosinia orbiculata* Dkr. pag. 204.  
Fig. 15. 16. 17. *Tapes Grecoffi* Dkr. pag. 207.
-

Tab. VIII.



Ex offic lithogr. Theodori Fischer







## Tabula IX.


Fig. 1. 2. 3. *Scapharca Satowi* Dkr. pag. 233.

Fig. 4. 5. 6. *Petricola Japonica* Dkr. pag. 209.

Fig. 7. 8. 9. 10. 11. *Eucharis Gouldii* A. Adams. pag. 178.

---

Tab. IX.



Ex offic. lithogr. Theodori Fischer





## Tabula X.


Fig. 1. 2. *Avicula coturnix* Dkr. pag. 228.

Fig. 3. 4. 5. *Avicula brevisalata* Dkr. pag. 229.

Fig. 6. *Avicula Lovéni* Dkr. pag. 229.

Fig. 7. 8. *Avicula Martensii* Dkr. pag. 229.

---










## Tabula XI.

- Fig. 1. *Pecten vesiculosus* Dkr. pag. 241.  
Fig. 2. 15. *Pecten irregularis* Sowerby. pag. 240.  
Fig. 3. *Plicatula cuneata* Dkr. pag. 246.  
Fig. 4. *Plicatula muricata* A. Adams. pag. 247.  
Fig. 5. *Plicatula irregularis* Dkr. nomine *rugosae*. pag. 247. 261.  
Fig. 6. 7. *Plicatula horrida* Dkr. pag. 247.  
Fig. 8. 9. *Lima Japonica* Dkr. pag. 245.  
Fig. 10. 11. *Vola puncticulata* Dkr. pag. 244.  
Fig. 12. 13. *Pecten spectabilis* Reeve. pag. 241.  
Fig. 14. *Pecten squamatus* Gmelin. pag. 240.
-

Tab. XI.



Ex offic lithogr. Theodori Fischer.





## Tabula XII.

- Fig. 1. 2. 3. *Collonia purpurascens* Dkr. pag. 129.  
Fig. 4. 5. 6. *Oxystele Koeneni* Dkr. pag. 142.  
Fig. 7. 8. 9. *Collonia rubra* Dkr. pag. 128.  
Fig. 10. 11. *Rapana bezoar* Lin. juv. pag. 42.  
Fig. 12. 13. 14. *Capulus dilatatus* A. Adams. pag. 124. 258.  
Fig. 15. 16. *Fasciolaria glabra* Dkr. pag. 48.  
Fig. 17. 18. *Enida Japonica* A. Adams. pag. 144.
-



Ex offic. lithogr. Theodori Fischer








### Tabula XIII.

- Fig. 1. 2. *Radius Carpenteri* Dkr. pag. 102.  
Fig. 3. 4. *Radius Adamsii* Dkr. pag. 102.  
Fig. 5. 6. *Lunatia Adamsiana* Dkr. pag. 61.  
Fig. 7. 8. 9. *Cylichna semisulcata* Dkr. pag. 163.  
Fig. 10. 11. *Purpura Heyseana* Dkr. pag. 40.  
Fig. 12. 13. 14. *Lucina contraria* Dkr. pag. 215.  
Fig. 15. 16. 17. *Capulus badius* Dkr. pag. 124.  
Fig. 18. 19. 20. *Turbonilla multigrata* Dkr. pag. 79.  
Fig. 21. 22. 23. *Buccinulus fraterculus* Dkr. pag. 161.  
Fig. 24. 25. *Rapana Japonica* Dkr. pag. 43.  
Fig. 26. 27. *Rapana Lischkeana* Dkr. var. pag. 43.  
Fig. 28. *Pecten crassicostatus* Sowerby var. pag. 239.
-









## Tabula XIV.

- Fig. 1. 2. 8. 9. *Lithophaga Zitteliana* Dkr. pag. 226.  
Fig. 3. *Solenomya Japonica* Dkr. pag. 220.  
Fig. 4. 5. 6. *Terebratula Blanfordi* Dkr. pag. 251.  
Fig. 7. *Parapholas piriformis* Dkr. pag. 171.  
Fig. 10. 11. *Gastrochaena grandis* Deshayes. pag. 171.  
Fig. 12. 13. *Lepton subrotundum* Dkr. pag. 219.  
Fig. 14. 15. *Scapharca Troschelii* Dkr. pag. 234.  
Fig. 16. 17. *Arca navicularis* Bruguière. pag. 232.  
Fig. 18. 19. *Pectunculus fulguratus* Dkr. pag. 236.
-










## Tabula XV.

Fig. 1. 2. 3. *Cardium Bechei* Adams et Reeve. pag. 212.

Fig. 4. 5. 6. *Cardium Burchardi* Dkr. pag. 210.

---








## Tabula XVI.

- Fig. 1. 2. *Clavagella ramosa* Dkr. pag. 172.  
Fig. 3. 4. *Modiola Hanleyi* Dkr. pag. 223.  
Fig. 5. 6. *Limopsis Woodwardi* A. Adams. pag. 237.  
Fig. 7. 8. *Pectunculus vestitus* Dkr. pag. 236.  
Fig. 9. 10. *Pectunculus rotundus* Dkr. pag. 236.  
Fig. 11. *Solen Gouldii* Conrad. pag. 173.
-







# Novitates conchologicae.

## Abbildung und Beschreibung neuer Conchylien.

---

Supplement VII.

---

Index

### Molluscorum Maris Japonici

conscriptus et tabulis iconum XVI illustratus

A

**Guilielmo Dunker**

Phil. Dre, Mineralogiae et Geologiae in Universitate Literarum Marburgensi Professore Publico Ordinario etc.

---

**Kassel 1882.**

Verlag von Theodor Fischer.

Die Abnehmer der *Novitates conchologicae* haben den Vortheil, dass sie die in den Supplementen aufgenommenen Monographien bedeutend billiger erhalten, als der Ladenpreis der einzelnen Werke beträgt.

**Die Verlagshandlung.**

AGENCY OF SMITHSONIAN INSTITUTION.  
—O—  
WILLIAM WESLEY,  
BOOKSELLER AND PUBLISHER,  
23, ESSEX STREET, STRAND.  
LONDON.









